

از کارهای بخش پوست بیمارستان پهلوی

گزارش یاک هور د بیماری بهجهت

دکتر امیرپاشا محققی * دکتر ودوه سیدی *

بهجهت ۱ درسال ۱۹۳۷ اجتماع ضایعات آفت مانند دهان - زخم های دستگاه تناسلی را با ضایعات شدید چشمی که معمولاً منجر به کوری میشود شناخت و آنها را تحت عنوان یاک سندرم فرارداد. بیماری نادری است. در منتها دو برابر زن ها دیده میشود. معمولاً سن ابتلاء بین ۱۵ تا ۴۰ سالگی است.

شرح حال بیمار- یک زن ۲۰ ساله خانه دار در تاریخ ۱۶/۵/۴۲ به بخش پوست بیمارستان پهلوی مراجعه و بعلت ضایعات آفوتوز دهان و درم مفصل زانوی چپ بستری گردید از یکسال پیش مریض احساس درد و سوزش در دستگاه تناسلی خارجی نموده و در حدود دو ماه بعد از آن زخم هائی در دهان ظاهر شده است و دو ماه است که از درم مفصل زانوی چپ رنج میبرد. اظهار میدارد که دید چشم چپ کم شده است در مدت اقامت در بیمارستان چند روز بعد مریض چشم درد و فتووفویی پیدا کرد که برای امتحان و معاینه چشم نزد چشم پزشک رفت و تشخیص اوئیت (۱) داده شد در این موقع تشخیص بیماری بهجهت مسلم گردید. از آن به بعد هر چند روز یک مرتبه ضایعات شبیه آفت در روی زبان و مخاط دهان و کلوايجاد و باعث درد و سوزش میگردد.

هر چند یکبار در ناحیه دستگاه تناسلی خارجی جوش های کوچک و زخمهای سطحی ایجاد میشود. در امتحانات مکرر از نظر چشم پزشکی اوئیت، مرتبه دیگر هیالیت پوسیروز (۲) در معاینه دیگر شروع بطئی سیکلت چشم چپ در معاینه بعدی محو شدن اطراف پایی و کم شدن دید چشم چپ و کدورت و تیرگی گزارش داده شده است.

دو ماه بعد از بستری شدن ضایعات شبیه اوئیت نوئو در ساق پایهای مریض ظاهر گردید که در دنایک بوده و هر چند یکبار تکرار میشوند. مریض دو مرتبه به دل درد شدید در ناحیه ایسکاستر مبتلاشد. بیویسی از ضایعات پوستی بیمار بعمل آمد و اسکولاریت در درم و سطی و عمقی و از دیاد سلولهای آندوتیال عروق مشاهده گردید. امتحانات لا برآتواری بغیر از سدیمان تاسیون ۹۴ میلیمتر در ساعت و تعداد گلبول سفید ۱۰۶۰ بقیه در حد طبیعی بودند.

۱- دانشیار بخش پوست بیمارستان پهلوی ۲- رئیس درمانگاه بخش پوست بیمارستان پهلوی

Uveit

2- Hyalite Poussiereuse

بحث - علائم اصلی بیماری بهجت ضایعات آفوتوزدهان، زخم‌های تناسلی و عوارض چشمی است ضایعات دهان شیوه آفت بوده زخمی کوچک با حدود مشخص نسبتاً عمیق با سطح پوشیده از غشاء برنگ سفید مایل بخاکستری که هاله قرمزی در اطراف دارد، در بعضی موارد در محل خود سیکاتریس باقی می‌گذارد، محل آن بیشتر در مخاط لبها، گونه، روی زبان و گلو است.

ضایعات دستگاه تناسلی وزینکول و زخم‌های سطحی است که در مردها روی پوست بیضه، کلائد، مآودر موارد نادر داخل مجراست، در زنها روی اعضاء تناسلی خارجی و داخل مخاط آن است. در مرد و زن ممکن است در کشاله ران و ناحیه پرینه هم ظاهر شوند ضایعات چشمی، خراشهای روی کورنه، ورم ملتجمه، کراتیت، اوئیتیس (۱)، اپی سکلریت رتی نیتیس (۲)، ایری تیس (۳)، کروئیدی تیس (۴)، واپرید و سیکلیت که ممکن است منجر به کوری بشوند.^۲

ضایعات چشمی دوره‌ای و تدریجی هستند برگشت عوارض یکی از مشخصات ضایعات چشمی این بیماری است در حملات مکرر ممکن است ضایعات مختلفی ایجاد و شناخته شود بعد از ختم هر حمله اندکی دیدچشم کم می‌شود. سه علامت اصلی در بیمارما مشخص و کامل بود.

علاوه بر علائم اصلی یکمده علائم و عوارض اضافی بشرح زیر ممکن است همراه باشد:

- ۱- ضایعات پوستی- شیوه اریتم نوئویا اریتم پولی مورف که بیمارما دارد.
- ۲- ورم مفاصل- منفصل زانو بیشتر مبتلاست و بیمارما هم مبتلا بوده.

۳- ترمبوفلیت

۴- عوارض عصبی از قبیل سردرد، پارزی، آتاکسی، علائم پیرامیدال دو طرفی. کورت^۳ (۵) برای اولین بار امکان ابتلاء دستگاه مرکزی اعصاب را شرح داد و اظهار عقیده کرد که شروع بروز علائم عصبی ممکن است باعث مرگ زیاد و وز درس در بیماران گردد.

۵- کم شدن مقاومت در مقابل میکروبها که بصورت فودنکل و آبسه و سایر عوارض چرکی ظاهر می‌گردد.

۶- دردهای شدید اپیکاستر- که بیشتر منوط به آفت‌های کوچک انتهای مری هستند. بعلت سطحی بودن و بر طرف شدن سریع ضایعات تشخیص رادیوگرافی مشکل است^۴

اتیولوژی

۱- فرضیه ویرفسی- با توجه به علائم بیماری حدس علت ویروسی زده می‌شود ولی امتحانات لاب‌افواری و تلقیح نتیجه نداده است.

۲- آگرژیک دوره‌ای بودن و تجدید حملات و ضایعات شبیه اریتم فوئوواریتم پولی مورف و در چند مورد اثوز بیوفیلی مؤید این نظریه است.

۳- عامل عروقی ترمبوفلبیت و ترمبوز و هموراژی عروقرتین این فرضیه را مطرح می‌سکند.

مطالجه:

کل آمفینیکل در چند مورد مؤثر بوده است^۱ - با کورتیکوستروئید هانتیجه مبهم و نامعلوم است . کرم بیریدو کسین^۲ دندان پزشکی برای کوتاه کردن مدت ضایعات دهانی اغلب مؤثر است.

خلاصه:

بیماری بهجت در نزد زن ۲۰ ساله‌ای با تمام علائم اصلی و فرعی از قبیل درم مفصل، ضایعات اریتم نوترو، دردهای شدید اپیکاستر شرح داده شد.

REFERENCES

- 1- Behget , H. «Ueber du rezidivierende Aphtose durch ein virus verursachte Geschwüre an Mund , am Auge und an den Genitalien » Dermat . Wchnschr . 105 : 1152 1937
- 2- Pillsbury « Dermatology » 1960 p. 770 Saunders Comp. Philadelphia
- 3- Curth , H. O., Archi . Dermat . and syph . 1952 1.16 , p.761
- 4- Curth H.O. Archi Dermat.1956 4.73 p.401
- 5- Goldsmith . W.Novel «Recent Advances in Dermatology 1754 p: 410 J.A. Churchill Ltd. London

1-Curth

2- Pyridoxin