

موارد استعمال ایزوتوپها در درمان سرطان

نگارش : دکتر اکبر بنکدار پور(رادیولوژیست)

مقدمه

در ابتدا بوسیله دستگاه‌اتم شکن Cyclotron

ساخته شده‌اند . سپس در سال ۱۹۴۲ او لین راکتور اتمی در دانشگاه شیگاگو بکار افتد و تولید مقادیر زیاد ایزوتوپ را امکان پذیر ساخت . در سال ۱۹۴۶ طبق تصمیم کمیته انرژی اتمی امریکا محصولات راکتور اتمی اول بیرون از مردم عرض کرد . این اقدام موجب استفاده عموم قرار گرفت از آن موقع اطباء و مخصوصا رادیولوژیستها که سابقه ۵ سال تجربه در استعمال مواد رادیواکتیو را داشتند ایزوتوپ هارا در تشخیص و درمان امراض و مخصوصا مداوای سرطانها بکار بردن . رشته‌های از طب را که با ایزوتوپها سرو کار دارد بنام طب اتمی یا نوکلئر (Atomic or Nuclear Medicine) مینامند .

ما در اینجا از موارد استعمال ترکیبات اتمی در تشخیص امراض و یا درمان بیماری‌های خوش خیم مانند هیپر تیروئیدیسم بحثی نمیکنیم و فقط بطور اختصار موارد استعمال ایزوتوپها را در درمان سرطان‌های مختلف ذکر مینمائیم .

فرق استعمال ترکیبات اتمی در درمان سرطان .

ایزوتوپها عناصری هستند که دارای نمره اتمی همانند واوزان اتمی مختلف میباشند . چنانکه اکسیژن دارای سه ایزو- توب است . نمره اتمی آنها ۸ و ۱۶ و ۱۸ اتمی آنها بترتیب ۱۶ - ۱۷ و ۱۸ میباشد . مس دارای دو ایزو- توب است که نمره اتمی آنها ۲۹ و ۱۰ وزن اتمیشان ۶۳ و ۶۵ است .

ایزو- توبهای یک عنصر دارای تعداد پرتو- نهای مساوی و نوترون‌های مختلف میباشند . تاکنون در حدود سیصد ایزو- توب ثابت و تقریبا هشت‌صد ایزو- توب مصنوعی رادیواکتیو شناخته شده‌اند . ایزو- توبهای یک عنصر از نظر فیزیکی متفاوت‌اند ولی خواص شیمیائی آنها همانند است .

ایزو- بارها عناصری هستند که دارای نمره اتمی مختلف و وزن اتمی مساوی میباشند . این عناصر از نظر شیمیائی باهم اختلاف دارند ولی وزن اتمی آنها همانند است . مثلا آرگون دارای نمره اتمی ۱۸ و وزن اتمی ۴۰ - پتاسیم دارای نمره اتمی ۱۹ و وزن اتمی ۴۰ و کلسیم دارای نمره اتمی ۴۰ میباشند و اینها ایزو- بار همیگر هستند .

ایزو- توبهای مصنوعی دارای خاصیت رادیواکتیویته میباشند . این عناصر

- مواد اتمی به سه طرز در درمان سرطانها بکار میروند .
- ۱ - متراکم ساختن ایزوتوب در عنصری یا نسوج مورد نظر ، پس از خورانیدن یا تزریق آن
 - ۲ - وارد کردن مستقیم ایزوتوب در قسمت مطلوبه بدن .
 - ۳ - استعمال ایزوتوبها برای پرتو درمانی خارجی .
- ۱- متراکم ساختن ایزوتوب در عضو یا نسوج مورد نظر پس از خورانیدن و یا تزریق آن .
- نمونه بازایین طریقه درمانی استعمال ید رادیوآکتیو در معالجه بیماری بازدو است که از موضوع گفتار ما خارج است. لیکن ید رادیوآکتیو برای درمان سرطان های تیروئید در تحت شرایط خاصی بکار برده میشود که بعدا ذکر خواهد شد. همچنین فسفر رادیوآکتیو (۳۲) را برای تداوی پارهای از بیماریهای خونی مانند هیپرگلوبولی و لوسمی ها استعمال مینمایند .
- ۲ - وارد کردن مستقیم ایزوتوب در قسمت مطلوبه بدن .
- ایزوتوبهارا بچهار طریق میتوان در بدن وارد ساخت و از خاصیت رادیو آکتیویته آن برای درمان سرطانها استفاده نمودهذیلا این چهار طرز درمانی مختصر اکتفا میشود .
- الف - کاشتن بصورت جامد در نسوج بدن . مانند استعمال سوزنهای کبالت استعمال ایزوتوبها را در درمان کانسر اینک که بطور اختصار طرق مختلفه
- کبالت وسی زیوم ۱۳۴ Cs را بصورت بمبکبالت و بمبسی زیوم در درمان سرطان ها استعمال مینمایند چون راجع به بمب کبالت در مقاله دیگری بحث شده است در اینجا بهمین مختصر اکتفا میشود .
- کبالت وسی زیوم ۱۳۴ Cs را بصورت بمبکبالت و بمبسی زیوم در درمان سرطان ها استعمال مینمایند چون راجع به بمب کبالت در مقاله دیگری بحث شده است در اینجا بهمین مختصر اکتفا میشود .
- الف - کاشتن بصورت جامد در نسوج بدن . مانند استعمال سوزنهای کبالت

جذب یا عدم جذب یدرادیوآکتیو تعیین نمی‌نماید ولی بهترین وسیله موجود است که میتوان با کمک آن در این مورد حساس مقرون بحقیقت زد. در این موقع برای اینکه ید رادیوآکتیو در تومور جذب شود باید تیروئید سالم غیرتومورال را از کار انداخت و برای منظور اخیر قسمت سالم تیروئید را با عمل جراحی بر میدارند و یا اینکه با یک رادیوآکتیو آنرا از کار میاندازند. این عمل را از (Thyroid ablation) میگویند. مقدار ید رادیو آکتیو که لازمت است تا غده تیروئید را از کار بیاندازد در حدود ۸۰ میلی کوری است. دو سه هفته پس از تیروئید کتونی و یا ۶ هفته پس از اینکه تیروئید را با ۱۳۱ I از کار انداختیم باید یک دوز آزمایشی ید رادیو آکتیو را بوسیله تومور اندازه بگیریم. اگر این آزمایش نتیجه‌های رضایت بخش بود (جذب یک باید بیش از ۲٪ درصد دوز آزمایشی در هر گرم تومور باشد) میتوان دوز درمانی را به بیمار داد.

اگر نتیجه آزمایش از نسبت فوق خیلی کمتر بود باید بوسیله استعمال تیوراسل (Thiouracil) تیروتروپین (Thyrotropin) و یا یک دوره میکسدم قدرت جذب یک را بوسیله تومور بالابرده و سپس دوز درمانی را به بیمار داد که معمولاً در حدود ۱۵ میلی کوری میباشد.

ها شرح دادیم بمناسبت نیست بیماریهای خاصی را که با ایزوتوپها درمان میشوند یک یک ولی بطور خلاصه مورد بحث قرار دهیم.

قبل از وارد شدن با اصل مطلب لازمست متذکر شوم چون طب اتمی شعبه فوق العاده جوانی از طبراتشکیل میدهد هنوز موارد استعمال قاطعی بجز چند مورد پیدا نکرده است و امید میرود در آتیه نزدیکی این دانش نورس مرا حل تکامل را بسیاری و عالم پزشکی بتواند کار انداختن تیروئید (Thyroid ablation) از نیروی اتمی برای مبارزه با بیماریها بعنوان حربه قاطعی استفاده نماید.

درمان سرطان تیروئید بوسیله یدرادیو آکتیو

معالجه اساسی سرطان تیروئید عبارت از تیروئید کتونی کامل است. در بعضی از سرطانهای غیر قابل عمل تیروئید میتوان از یدرادیوآکتیو استفاده نمود. بطور کلی آن دسته از تومورهای تیروئید که دیفرانسیه هستند و فولیکول های آنها از ماده کولوئیدی پر شده‌اند بیشتر از تومورهای آنا بلاستیک ید رادیوآکتیو را در خود جمع مینمایند. بنا بر این قدم اول در درمان سرطانهای غیر قابل عمل (یعنی آنهایی که نتوان تیروئید کتونی کامل برایشان انجام داد) عبارت از یک بیوسی است که نوع بافت شناسی تومور را مشخص نماید. زیرا در حال حاضر گو اینکه بافت شناسی تومور بطور قطع قابلیت سرطان را برای

میلی کوری برای هریک میلیون کلبول فرمز تجویز مینمایند . ما در دانشگاه تمپل فیلادلفیا تقریباً ۵ میلی کوری برای یک مرد معمولی و ۳ میلی کوری برای یک زن عادی استعمال مینمودیم و بر حسب چاقی یا لاغری بیمار یک یا دو میلی کوری از این مقدار کم یا بدان اضافه میکردیم . همه بیماران ما دارو را از راه خود راکی استعمال مینمودند ولی اگر از راه تزریق داخل وریدی بکار برده شود باید یک چهارم از مقدار آن کاسته گردد . بیماران را برای درمان سمتوماتیک قبل از تجویز فسفر فصل میکنند سپس همه ماهه معاینه میشنوند و در صورتیکه نتیجه مطلوبه حاصل نگردد دوز فوق را پس از ۳ ماه تجدید مینمایند . بهترین راهنمای مقدار هماتو-کریت بیمار میباشد . باید سعی کرد هماتوکریت خیلی از ۵۰٪ بالاتر نرود . نکته خیلی مهم اینستکه برای تکرار دوز درمانی هرگز نباید منتظر بروز عوارض عروقی یا مفرزی پولی سیتیمی شد بلکه بمحض بالا رفتن هماتوکریت باید فسفر رادیو آکتیو را مجدداً تجویز کرد .

درمان لوسمی های مزمن لتفوئید

بوسیله فسفر رادیوآکتیو

رهبر طرفداران استعمال P_{۳۲} asgood برای درمان لوسمی های مزمن میباشد . با وجودیکه بنده پیرو مکتب مخالف وی هستم از نظر اهمیت موضوع عقیده asgood را در اینجا تشریح مینمایم . قبل از وارد شدن با اصل مطلب خاطر

پس از ۲ تا ۳ ماه در صورتیکه تومور کاملاً از بین نرفته باشد مقدار مزبور را تکرار میکنیم و آنقدر ادامه میدهیم تا اثری از تومور باقی نماند . بدیهی است که امتحان خون و حال عمومی بیمار باید اجازه تکرار درمان را بدهد - سپس بیمار را هر یکسال یا ۱۸ ماه یکدفعه بوسیله دوز آزمایشی امتحان میکنیم تا بازگشت مرض در صورت وقوع کشف گردد .

در خانمه باید متذکر شوم که تومور های آنالپاستیکرا شایسته است بوسیله رادیو تراپی (باکمک عمل جراحی یا بدون آن) درمان نمود و باید I_{۱۲۱} را در درمان اینگونه سلطانها بکار برد .

درمان هیپرلیپولی بوسیله فسفر رادیو آکتیو

این بیماری حد فاصل بین امراض خوش خیم و بیماریهای سلطانی خون میباشد . امروزه درمان پولی سیتیمی بوسیله فسفر رادیو آکتیو P_{۳۲} تعییم کامل یافته است و اینجانب مدافعان جدی آن میباشم . در درمان مرض میتوان رادیو تراپی - مواد شیمیائی مانند گاز موتارد و فسفر رادیوآکتیو بکار برد و اخیراً P_{۳۲} جانشین متدهای دیگر شده است . در هر مرکز طبی فرمول مخصوص برای تعیین دوز درمانی بکار میبرند . بعضی صد میکرو کوری برای هر کیلو گرم وزن بدن (یعنی ۷ میلی کوری برای یک آدم طبیعی ۷ کیلو گرمی) استعمال میکنند ویرخی یک دهم

پویس شکافی داده و بعداً مثانه را باز خوبست.

۲ - در طریقه دوم محلول ایزوتوپ را در کیسه های مخصوصی که در مثانه قرار داده میشود تزریق مینمایند و اخیرا آنرا در خود مثانه بطور مستقیم وارد میسازند. سرdestه داشمندانی که این طرز درمانی را بکار برده‌اند Smithers رادیو تراپیست انکلیسی میباشد. در آغاز داشمند نامبرده سدیم رادیوآکتیو ^{24}Na را بکار برد. وسیله برم رادیوآکتیو ^{82}Br را در یک مرحله برای درمان استعمال نمود. پس از آن برم را در سه نوبت بفواصل یک‌هفته استعمال کرد. بعدها محلول برم رادیوآکتیو را در کیسه مخصوصی تزریق نمود و مدت درمان چهار روز بطول میانجامید. اخیرا Smithers محلول کولوئیدی طلای رادیو آکتیورا مستقیما در مثانه تزریق مینماید.

نکته مهم اینستکه فقط عدد معددی از بیماران مبتلا به سرطان مثانه برای درمان داخل حفره‌ای بوسیله محلولهای ایزوتوپ مناسب میباشد. زیرا تنها سرطانهای درجه اول مثانه را که از مخاط نگذشته‌اند و بعضیه جدار مثانه نرسیده‌اند ممکنست چنین درمان نمود. در لندن فقط هشت درصد از بیماران در این مرحله مراجعه مینمایند ولی متاسفانه در ایران نسبت درصد سرطان های درجه اول مثانه خیلی کمتر از میزان فوق میباشد.

۳ - در این نوع درمان ایزوتوپ را که

میکنند. برای هرگرم ازوزن تومور ۵۰۱ میلی کوری طلای رادیوآکتیو مستقیما داخل پروستات تزریق مینمایند. در اینجا نیز طلارا در محلول ۷۰ درصد ئورکان (Urokon) حل میکنند و معمولاً ۱۲ سانتیمتر مکعب از محلول کولوئیدی طلا استعمال میگردد. گوینکه این نوع درمان سرطان پروستات بتازگی ابداع شده است لیکن تنایجی را که فلکس در بیماران خود گرفته است بالنسبة رضایت بخش میباشد و امید میرود با تکمیل نقایص آن در سالهای آینده این متد درمانی در همه جا مورد استقبال قرار گیرد. درمان سرطان مثانه بوسیله ایزوتوپها از راه داخل حفره‌ای

ایزوتوپها را بسه طرز برای درمان سرطان مثانه استعمال مینمایند.

۱ - در طریقه اول که بوسیله هریس Friedman Low-Beer استعمال شده است یک سوزن قوی کبالت را در داخل حفره مثانه وارد میسازند. برای این منظور لوله های لاستیکی مخصوصی را که شبیه به لوله Fowly Catheter میباشد بکار میبرند. این نوع درمان شبیه مداوای سرطان کولرحم بوسیله رادیوم باکمک اپلیکاتور های مربوطه میباشد. دوز درمانی را که به تومور باید داده شود بخوبی میتوان محاسبه نمود و نتیجه آن نیز در سرطان‌های درجه اول مثانه خیلی

از دانتر است و استعمال آن نیز آن آسان بوده خطرات طلای رادیوآکتیو را برای طبیب و مریض ندارد .

درمان سرطانها بوسیله کاشتن مواد رادیو آکتیو در تومور

کبات و طلای رادیوآکتیوب را این منظور بالسیبه زیاد استعمال میشوند . اخیرا (Henschke) در نیویورک ایریدیوم رادیو آکتیو I_{192} را نیز که بصورت دانه هائی در نوار های نایلونی نگهداری میشوند بکار میبرد و در سایر شهرهای امریکا هم طرفدارانی پیدا کرده است .

مواد دیگری مانند تانتالوم Ta_{182} سیزیوم Cs_{137} و غیره نیز استعمال میشوند . ازین این مواد سوزنهای کبات بعقدار زیاد بکار میرود و اینجانب معتقدم بعلت ارزانی و بعضی مزایای دیگر بهتر است در ایران تعمیم یابند سوزنهای کبات خیلی شبیه سوزنهای رادیوم هستند ولی امتیاز درمانی بیشتری دارند . مثلا کبات دارای دو گاما فوتون با انرژیهای KV_{1170} و KV_{1330} میباشد در صورتیکه سوزنهای رادیوم دارای KV_{12} گاما فوتون با انرژیهای خیلی مختلف (از KV_{184} تا KV_{2198}) میباشند که از نظر فنی تولید مشکلاتی برای درمان صحیح مینماید . روی همین اصل انرژی متوسط کبات با فیلتر تغییر نمی یابد ، در صورتیکه انرژی متوسط رادیوم با فیلترهای مختلف متفاوت است . انرژی متوسط کبات برابر

تصورت دانه های ریز grain یا سیمهای قابل انعطاف Wire در آورده اند در مثانه میکارند . معمولاً طلای رادیو آکتیو و تانتالوم را بدین منظور بکار میبرند . باید دانست که سرطان مثانه را ممکنست بوسیله پرتو درمانی خارجی با بعثت کبات یا بمب سیزیوم درمان نمود ولی موضوع از بحث کنونی مسا خارج است . همچنین معالجه جراحی کانسر مثانه مورد بحث نیست و در این باره بمقالات و کتب مربوطه باید مراجعت شود .

تزریق محلولهای کولوئیدی ایزوتوپها در درمان سرطانهای جنب و صفاق

داروئیکه بدین منظور استعمال میشود طلای رادیوآکتیو کولوئیدی است . معمولاً ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلی کوری از محلول آنرا پس از بزل مایع پلور بالاست تزریق مینمایند . باید این دارو توام با چند صد سانتیمتر مکعب سرم فیزیولوژیک در جنب صفاق تزریق گردد . نتیجه درمان در متاستاز های سرطان تخدمان که در حفره صفاق ایجاد شده باشند بالسیه خوبست در سرطانهای پلور نیز گاهی نتایج مفیدی گرفته میشود . اینجانب نسبت بدرمان فوق خیلی خوش بین نیست و معتقدم که برای تزریق داخل حفره صفاق و جنب شاید گاز موتارد بهتر باشد . البته نهاد نظر اینکه نتیجه درمانی بهتری گرفته میشود بلکه بعلت آنکه داروی اخیر خیلی