

نامه‌نگاران  
دانشکده پرستیزی  
پیش‌تخریزی

دکتر محمدحسن باغی	دکتر محمدحسن ارباب
دکتر محمدعلی ملکی	دکتر ناصر انصاری
دکتر حسن پیردادی	دکتر محمد بهشتی
دکتر ابوالقاسم محمدآبادی	دکتر حسین سهراب
	دیرداخی - دکتر محمد بهشتی
	رئیس پیش‌تخریزی - دکتر جهانشاه صالح

شماره چهارم

دیماه ۱۳۹۴

سال دوازدهم

از کارهای بخش پوست بیمارستان رازی

دکهور د پیماری گاپوزی<sup>(۱)</sup>

دکتر هاردروسیان

دکتر محمد علمی ملکی

دستیار بخش پوست بیمارستان رازی

استاد و رئیس بخش پوست بیمارستان رازی

نظر باینکه این بیماری نادر است و در صورتی که دیده شود اشکال مختلفه دارد

و تشخیص آن باسانی همیشه میسر نیست لذا لازم دانستیم قبل از شرح حال بیمار

مختصری از چگونگی بروز وسیر این بیماری را بادآوری کنیم.

کاپوزی<sup>(۲)</sup> در سال ۱۸۷۲ بیماری نادری را که علت اصلی آن هنوز مسلم

نشده باسم کوما - ایدیوپاتیکوم - پیگماتوتوزوم<sup>(۳)</sup> نامید این بیماری از دسته

همانودرمی های بد خیم میباشد<sup>(۴)</sup> و پیش‌بینی آن خطرناک است. این بیماری

مخصوصاً در مردان ۴۰ - ۷۰ ساله دیده میشود. شروع آن از اندامها مخصوصاً

۱ - maladie de Kaposi

۲ - Kaposi

۳ - sarcoma idiopathicum pigmentosum

۴ - hématodermies malignes

دست و پا و تقریباً همیشه قرینه است. ضایعات آن از صفحات اریتماتو انژیوماتوز (۱) تشکیل گردیده بشکل لکه‌ها است که منحصراً ارتراح دارد اطراف لکه‌ها نامنظم و محدود و دارای برآمدگی‌های بشکل پاپول (۲) و یا ندول (۳) میباشدرنک آنها از قزمز تند تاقرمز مایل به آبی تغییر میکند اطراف این ضایعات هاله آبی مایل به سبز شبیه به خونرددگی دیده میشود. این توهرها گاهی سفت و گاهی نرم است و در مدت سیر بیماری مقاومت آنها تغییر میکند گاهی ممکن است بکلی شل و دارای آموج دروغین باشد (۴) ندولها معمولاً کروی و مسطح هستند و گاه ممکن است پایه دار (۵) باشد حجم آنها ممکن است باندازه گرد و یا بزرگتر باشد و اگر عده آنها زیاد باشد ممکن است یکدیگر وصل شوند (در پا و دست) و گاهی قرحة‌ای میگردد.

محل آنها معمولاً در دست و پا است که در نتیجه زیادی ندوایها و درم سخت شکل اندامها را تغییر میدهند در بعضی اوقات پوست سفت و چسبنده شده تولید یک نوع پاکی درمی (۶) و هیپر کراتوز (۷) مینماید.

علاوه بر دست و پا ممکن است در نقاط دیگر بدن نیز دیده شود مانند قسمت قدامی زانو، ران، آلت تناسلی، گوش وغیره.

این بیماری گاهی بی درد و در بعضی اوقات دارای دردهای فوق العاده شدید است (مانند بیمارما) که بیمار نمیتواند آنرا تحمل کند.

بدیهی است درد و درم، حرکات دست و راه رفتن بیمار را مشکل میکند.

### شرح حال بیمار

۱ - ۱۴ ساله اهل تبریز رعیت بواسطه درد و درم پشت دستها و منحصوصاً دست راست که توأم با سیانوز و پاپولهای کوچک در دنا کی است در ۸/۳/۳۳ در بخش پوست بیمارستان رازی بستری میگردد تاریخ بروز این بیماری را کاملاً نمیتواند بیان نماید ولی دردونارا حتی از سه‌ماه قبل از مراجعه شروع شده است. بیمار در ابتدا

۱ - plaques erythematо-angiомateuses

۲ - papules      ۳ - nodules      ۴ - pseudo fluctuation


۵ - pédiculée      ۶ - pachydermie      ۷ - hyperkeratose




شکل ۱ - س - ۱ عوارض در دو دست



شکل ۲ - س - ۱ - ضایعات باندولها



شکل ۳ - س - ۱ - ضایعات بزرگتر



شکل ۴ - ضایعات استخوانی دودست

در پشت دست راست خود لکه قهوه‌ای مایل به بنهش باندازه یک دو رویالی مشاهده می‌کند که با خارش شدیده راه بوده است. این لکه کم کم وسیع تر گشته تمام پشت دست راست و سطح داخلی ساعد را در همین دست فرا گرفته سپس دامنه ضایعات بدست چپ و پاهای بیمار بخصوص پای راست و ساق همین پا کشیده می‌شود تا بالاخره در طول اقامت بیمار در بیمارستان هردو گوش وی نیز مبتلا می‌گردد.

لکه‌ها بهم پیوسته بوده و روی آنها برآمدگی‌های سفت پاپولی و ندولی مشاهده می‌شود. اطرافشان قرمز مایل به بنهش بوده اندازه آنها از یک ماش تا ناخود بزرگ تغییر می‌کند.

این ضایعات روی یک زمینه خیزدار (۱) والاستیک بخوبی بیمار برآمده حض می‌سازد بنحویکه افگشتان دست بیمار بواسطه تورم زیاد سفت و دوکی شکل شده نتیجه این سفتی و تورم در درد نسبتاً شدید است که بیمار پیوسته از آن شکایت می‌کند بطوریکه دستهای خود را نمی‌تواند حرکت بدهد. ( بشکلهای ضمیمه مراجعه شود )

ضایعات در نقاط دیگر بدن نیز پیشرفت نموده مخصوصاً در قسمت شانه راست که تو مری باندازه نارنگی وجود آورده است. قوام آن نرم بوده شبیه لیپوم می‌باشد. حالت عومنی بیمار خوب است. بیمار متأهل و دارای زن و سه فرزند سالم می‌باشد نکته قابل ذکر در سابقه وی هم و پیزی بالنسبه زیادی است که در چندین سال قبل هر راه باسرفه و تب عارض وی گشته است ولی جزئیات این عارضه را بخاطر ندارد. سیمای بیمار گلگون ولی خطوط درهم آن در درجه اول علیقی را بیان مینماید که در نظر اول بخوبی جلب توجه می‌کند.

دستگاه قلب و عروق سالم و فشار خون ۸-۱۲ و تعداد قریعات نبض ۸۲ در دقیقه است. درجه حرارت بیمار در این مدت طبیعی و بالاخره در دستگاههای دیگر بدن نیز ضایعه‌ای ملاحظه نمی‌شود. آزمایش‌هایی که بعمل آمده بقرار زیر است: واسر من منفی و آزمایش کامل ادرار طبیعی می‌باشد، سدیمه‌انتاسیون در تاریخ

۳۳/۳/۹ بیست میلی متر در ساعت اول نشان میدهد، سیلان و انعقاد بتر تیپ پنج دقیقه و شش دقیقه میباشد. فرمول خون در همین تاریخ بدین قرار است:

گویچه سرخ ۴/۰۰۰/۰۰۰/۴ گویچه سفید ۶/۰۰۰/۶ سگمانته ۶۴ آوزینوفیل ۸ منو نو کلئر ۹ منو سیت ۹ وبالاخره تعداد لغفه سیت ها ۱۰ میباشد. کوتی راکسیون منفی در رادیو گرافی که از قلب و ریتين و مفصل شانه راست بعمل آمده ضایعه ای نشان نمیدهد ولی رادیو گرافی استخوانهای کف دست و انگشتان آنار دکالسیفیکاسیون را مخصوصاً در ناحیه فالاظهار نشان میدهد (شکل) بهمین چهت سایه آنها لکه لکه بنظر میرسد بعلاوه مفصل بین کارپ و متا کارپ - ما نیز محو و تار و علاج آرتیت در آنها مشاهده میشود بالاخره نتیجه بیوپسی که از ضایعات زگیلی بیمار بعمل آمده چنین میباشد:

دراپیدرم و طبقه ژرمیناتیف و مالپیگی چیزی دیده نمیشود.

طبقه گرانولوز خیلی نموده است و همراه با هیپر کراتوز میباشد و در کوریون (۱) دو نوع تغییر دیده میشود یکی ارتراح سلولی که از سلولهای منو نو کلئروهیستیوسیت تشکیل شده - بعلاوه رشته های کولاژن نیز دیده میشود؛ دیگری ارتراح عروقی که مخصوصاً از جنس شرائین میباشد.