

شرح حال و درمان یک بیمار همبالی بکزان

دکتر قوام پور

و

دکتر بیونش ور

دستیار بخش واگیر

رئیس بخش وابسته دانشکده پزشکی
در بیمارستان پهلوی

بتول فرزند محمد شاه حسینی ۱۷ ساله در تاریخ ۳۳/۱/۱۰ بعلت کلید شدن دهان و سفتی عضلات بدن و اندامها به بیمارستان پهلوی بخش عفو نی ۲ مراجعه و بستری گردید.

بیست روز قبل از این تاریخ موقعیکه بیمار زیر کرسی خوابیده بوده بواسطه ایجاد حمله صرع پای راست او در آتش منقل افتاده و سوخته است. برای معالجه سوختگی پا به وسائل و داروهای خانگی کثیف متوجه میشوند. پانزده روز پس از سوختگی پا بیمار احساس ناراحتی و سفتی در عضلات خود نموده دهانش کلید میشود و تپ عارض میگردد. در همین حال دست و پا و شکم و گردن نیز سفت و منقبض شده گاه بگاه انقباض عضلات شدت میباشد، با این حال چهار روز در منزل مانده و برای او معالجات معمولی زناه کرده اند و چون بهبودی نیافته به بیمارستان مراجعه نموده است.

در سابقه شخصی و خانوادگی بیمار نکته قابل توجه وجود حملات صرع است که از زمان کودکی شروع شده بگفته بیمار هر ماه یکی دو بار تکرار میشده است.

در معاینه که هنگام ورود بیمار به بیمارستان بعمل آمد علام زیر جلب نظر مینمود :

تریسهوس شدید بطوریکه حتی مایعات را نمیشد وارد دهان او کرد، انقباض شدید و سختی عضلات اعضای فوقانی و تحتانی و گردن و شکم بیمار، این سفتی عضلات بر اثر تحریکات خارجی (صدا و نور و غیره) بیشتر شده بشکل کریزهای کلونیک و

تونیک در میآمد و رویه رفتہ بیمار وضع اوپیستوتونوس (۱) داشت. قیافه بیمار بطور مخصوصی درهم کشیده و یکنواخت و بدون احساسات بود و با صطلاح تبسم کلاسیک ساردوینک (۲) نشان میداد.

دستگاه قلب و عروق ضایعه نداشت، فشار خون $11/5$ بود، دستگاه تنفس بدون عارضه مرضی بود فقط هنگام تشدید حملات انقباضی تنگ نفس عارض بیمار میگشت زبان را بعلم تریسموس نمیشد مشاهده کرد، یبوست و اولیگوری (۳) بعلم بیماری عفونی و عدم جذب غذا و مایعات وجود داشت.

تب در بدو ورود ۳۹/۵ و نبض ۱۴۰ در دقیقه بود.

باعلائم فوق: تریسموس، تب شدید، نبض تندر، انقباضات عضلانی توأم با کریزهای مشخص و بعلاوه مشاهده سوختگی پای راست که در ناحیه سطح با و انگشتان پای راست واقع بود و حالت التهاب و عفونت در آن مشاهده میشد تشخیص بیماری کزا محرزو باعترضه دیگری قابل اشتباه نبود. لهذا بلا فاصله شروع بدرمان گردید. بدین ترتیب که همان روز اول ۱۵۰/۰۰۰ واحد سرم آنتی تباکیک - ۶۰/۰۰۰ واحد داخل عضله - ۶۰/۰۰۰ واحد زیرجلد، و ۱۰/۰۰۰ واحد در اطراف زخم سوختگی و ۲۰/۰۰۰ واحد مخلوط با ۲۰۰/۰۰۰ سرم فیزیولوژیک قطره قطره داخل رگ تزریق گردید. پانسمان و ضد عفونی دقیق زخم سوختگی نیز بعمل آمد. بیمار در اطاقیکه با آویختن پرده سیاه تاریک شده بود در محیط ساکت و آرامی ستری گردید. برای تسکین آشیانات و انقباضات عضلانی شدید دستور تدقیه کلال، هر دو ساعت یک گرم (۱۲ گرم در ۲۴ ساعت) داده شد. شربت تری بر موره رسه ساعت یک‌قاشق سوپخواری، تزریق کلریدرات در مرغین روزی ۲٪ گرم در دو مرتبه و تزریق ۰/۲۰ گرم گاردناں سدیک هنگام شب دستور داده شد.

برای رفع عفونت و التهاب زخم سوختگی که مبدأ و محل ورود با سیل نیکلایر

۱- opisthotonus

۲-rire sardonique

۳- oligurie

بوده است دستور تزریق $۸۰۰/۰۰۰$ واحد پنی سیلین و نیم گرم استرپتو میسین در روز داده شد. برای جلوگیری از بی آب شدن بیمار (۱) وضمناً جهت تغذیه او دستور تزریق روزی ۲ لیتر سرم گلوکزه ایزو تونیک داخل ورید داده شد و برای تکمیل تغذیه روزی دو مرتبه هر دفعه ۱۵۰ گرم شیر و یک زرده تخم مرغ بوسیله تتفیه وارد بدن میگردید. ویتامین ث و مقویات قلب تجویز گردید.

همان روز اول ورود به بیمارستان و مقارن با زرق سرم مقدار دو ساعتی متر مکعب آناتو کسین کراز نیز زیر جلد تزریق گشت. از روز سوم مقدار پنی سیلین به $۴/۰۰۰$ واحد در روز تقلیل داده شد. تتفیه کرال به مقدار ده گرم در ۲۴ ساعت ادامه داده شد.

روز سوم ورود به بیمارستان کریزهای انقباضی بیمار بنتحو قابل ملاحظه تخفیف یافت، تریسه وس بسیار کم شد، قیافه بیمار بازتر گشته در خارج از حملات تشنجی سفتی عضلات اعضا فوکانی و تحتانی و عضلات شکم نیز کمتر شده بود. پاسماں و ضد عفو نیز خمسو ختگی ادامه داشت. از روز ششم مرفین فقط روزی یک ساعتی گرم تزریق میگشت.

در تاریخ ۲۳/۱/۱۶ هنگام معاینه شکم، بر جستگی کروی شکلی در قسمت تحتانی شکم جلب نظر نمود. در ملامه و دق بر جستگی مثانه (۲) کامل امشخص بود. پس از سؤال از بیمار معلوم شد که از روز قبل ادرار نکرده است پس از سند از مثانه مقدار زیادی ادرار خارج گشت.

حال عمومی و انقباضات عضلانی بهمین ترتیب رو به بود بود. تب از روز نهم بستری شدن قطع گردید نهض آرام تر شد. تغذیه پس از سه روز اول از راه دهان انجام گرفت و از آن بعد فقط روزی نیم لیتر سرم گلوکزه برای کمک به تغذیه و رهید راهه (۳) شدن بیمار داخل ورید تزریق میگشت. تزریق آناتو کسین روزهای پنجم و نهم بستری شدن به ترتیب به مقدار ۴ و ۶ ساعتی متر مکعب

تکرار گشت، از روز ششم تریسموس بکلی ازین رفت بطوریکه تنفسیه از راه دهان کاملاً امکان پذیر گشت و بهمین دلیل تزریق سرم گلو گزه قطع گردید، دست و پای بیمار کاملاً طبیعی و بدون انقباض غیر عادی بود فقط انقباض عضلات شکم هنوز مختصری باقی بود. قیافه بیمار نیز هنوز خطوط و چین های غیر طبیعی نشان میداد. از ابتدای هفته سوم بستری شدن تزریق مرفین قطع و بجای آن روزی سه قرص لومینال پنج ساعتی گرمی دستور داده شد.

تنقیه کلرال روزی ۶ گرم و شربت تری بر مور هر چهار ساعت یک قاشق ادامه داده شد.

در معاينة روز های بعد حال عمومی و وضع سفتی عضلات بیمار مرتبأ رو به بیهود بود. در معاينة که در تاریخ ۲۳/۲/۲ بعمل آمد فقط مختصری سفتی عضلات در جدار شکم مشاهده شد. زخم سوختگی پای بیمار التیام یافته فقط مختصری در ناحیه انگشتان پای راست باقی بود که آنهم در حال التیام بود. بیمار در تاریخ ۲۳/۲/۵ با حالت عمومی خوب و درحالیکه انقباضات غیر طبیعی عفونت بدن بکلی ازین رفته وزخم ها التیام کامل یافته بود مرخص گردید.

باید متذکر گردید که بیمار دو مرتبه در تاریخ ۲۳/۱/۳۰ و ۲۳/۲/۳ دچار حملات صرع گردید.

نتیجه:

۱- وجود حملات صرع در سابقه بیمار که در جریان یکی از این حملات بیمار دچار سوختگی پا شده و باسیل کرده از راه زخم سوختگی وارد بدن گشته است. این امرهم از لحاظ اتیولوژی و ایجاد زخمی که راه ورود میکرب به بدن است و هم از لحاظ تشخیص افتراقی که ممکن است گاهی بواسطه اشتباه و غفلت بین حملات صرع و حملات انقباضی بیماری کرده مطرح شود و خطری که در نتیجه اشتباه در تشخیص و عدم زرق سرم و آنا تو کسین بیمار را تهدید میکند حائز اهمیت است لیکن با اندکی دقت این دو عارضه بخوبی از یکدیگر تمیز داده میشود.

۲- بهبودی کامل حال بیمار با اینکه بیماری شکل سخت و خطرناکی را در این بیمار نشان میداد و از طرفی بهیچوجه امکان نداشت دوره نهفتگی مرض را تعیین و حساب کرد معدلک بر اثر معالجه صحیح و مناسب بیمار شفای کامل پیدا کرد.

۳- طرز ساده و عملی معالجه که در هر نقطه و شهرستانی میتوان بدان عمل نمود: اساس درمان عبارتست از سرو آناتو کسینو تراپی (۱) بدین ترتیب که روز اول لااقل ۱۵۰/۰۰۰ واحد سرم ضد تنازع در یک وحله بایستی تزریق نمود و کافی است نصف این مقدار داخل عضله و بقیه را زیر جلد و مقداری هم در اطراف زخم و محل عفونت اولیه زرق نمود. تزریق داخل نخاعی لزومی ندارد تزریق داخل رگ نیز اغلب لازم نیست. مقدار سرم را تا ۴۰۰/۰۰۰ واحد میتوان تزریق کرد که بسته بشدت علائم بیماری است. تکرار زرق سرم در روزهای بعد لازم نیست. در همان روز اول که به تزریق سرم مبادرت میشود بایستی دو ساعتیه تر مکعب آناتو کسین کراز و بعداً نیز بفوایصل چهار الی پنج روز ۴/۴ و ۶/۶ زیر جلد تزریق شود تاعلاوه بر خنثی شدن اثر سرم کراز که در نتیجه زرق سرم (آناتو تو کسین) حاصل میشود یک مصوّنت و مقاومت مثبت و آکتیو نیز در حین معالجه و برای آینده بیمار در بدن ایجاد شود.

علاوه بر زرق سرم و آناتو کسین که اساس معالجه کراز را تشکیل میدهد بایستی جهته تسکین و رفع تشنجهای شدید انقباض عضلات متولّ بدارو های منوم و ضد تشنجه از قبیل گاردنال (تزریقی و خوراکی) و برمورها و کلرال (از راه تنفسی و خوراکی) شدو حتی در موارد کریزهای سخت به زرق مرفین مبادرت گردد. برای تغذیه و رئیدراته کردن بیهوده ای تزریق سرم گلو کزه و فیزو لوزیک داخل رگ و در صورت امکان دادن مایعات فراوان از راه دهان و تنفسی های مواد غذائی لازم است بعمل آید. ویتامین ث و مقویات قلب نباید فراموش شود. تجویز آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد عفونت برای معالجه زخم اولیه و پیش گیری از عفونت های بعدی لازم است. از زخم اولیه که محل و روی میکرب

بیماری بوده است بایستی کمال مواظبت و دقت بعمل آید و مرتبأ ضد عفونی و پانسمان بشود. بیمار بایستی در محل تاریک و آرام و بدون سروصدابسته باشد پس از رفع تریسه وس بایستی هرچه زودتر بتغذیه کامل از راه دهان اقدام نمود. بایستی دقت کرد که عمل دفع ادرار و اجابت مزاج بطور طبیعی انجام گیرد.

ع - نکته که در این بیمار جلب توجه نمود احتیاس ادراری بود که روز ششم بسته شدن ایجاد گردید در حالیکه احتیاس ادرار در مرضای دچار به کزار خیلی بندرت مشاهده میشود.