


نکاتی پنجم در هورد خوارض دوره سوم سیفیلیس

نگارش

دکتر محمد صدری و دکتر اهیر پاشا محققی

استاد کرسی بیماریهای پوست و آمیزشی رئیس درمانگاه بخش پوست و آمیزشی عوارض دوره سوم سیفیلیس پوستی را همه میشناسند عوارضی هستند اولسر و توبر کولوز . اولسر و گموز و سیرسینه (۱) ولی اگر بناشود اهمیت زیادی به جواب آزمایش خون داده شود بسا اتفاق میافتد جواب آزمایش خون در این بیماران منفی است علیهند اعشار فوک همیشه مشکوک تلقی میشود ولی اگر به بافت برداری متوجه شویم غالباً تشخیص عوارض سیفیلیسی محجز میگردد .

از میان عده بسیاری بیمار که وضعیت فوق را داشتند شرح حال دونفر را ذیلاً متذکر میشویم :



ع فرزندم ۲۵ ساله اهل اردبیل رعیت در تاریخ ۳۹/۱/۲۸ بعلت زخم‌هایی که از ده سال قبل در بدن داشته به بیمارستان مراجعه و بستری شد در طی اینمدت ناخیه شکم و پشت وسینه و سطح قدامی ران پای راست روی زانوها و دستها تدریجاً گرفتار زخم‌های محدود ، متفرق «سیرسینه» که از محیط پیشرفت میکرد گردید ضایعات اولسر و کرتوز (۲) بدون خارش و در دولی دارای چرك بود . این عوارض باستخوانها سراحت نکرده بود .

از لحاظ عمومی در بدن نقصی مشاهده نمیشد حالت عمومی بیمار خوب بود . پدر بیمار بعلت نامعلومی فوت کرده مادرش سالم دو برادر و سه خواهر بظاهر سالم دارد سابقه سیفیلیس ارثی و اکتسابی را نشان نمیداد از نظر بالینی منظره عوارض کاملاً تشخیص سیفیلیس سیرسینه دوره سوم را بیان میکرد . در تاریخ ۱۴/۱/۳۰ واسرمن شد و منفی بود در ۱۴/۱/۳۰ بیوپسی گردید تشخیص عوارض سیفیلیسی

دوره سوم داده شد تا یک دوره درمان ارسنیک و بیسموت در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۰۰ در حالی که واسر من منفی بود و ضایعات رو بیهودی گذاشته فقط مختصری از این زخمهای مزمن باقی بود پس از چند روز استراحت دوره دوم درمان شروع شد پس از آن تمام این دوره باز هم واسر من شدو منفی بود ولی ضایعات رو بیهودی کامل رفت و بیمار در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۰۰ فقط سیکاتریس زخمه را به مراد خود برداشت.

۲- ف. عفرزند حسن ۲۰ ساله اهل همدان رعیت در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۰۰ بجهت وجود زخمهای متعدد در بدن که از یکسال پیش مبتلا شده بود بستری گردید. زخمهای در ناحیه کپل طرف چپ و قدم سینه و گردن و پشت وجود داشته کمی بر جستگی موجود و دارای چرک بدون درد و خارش با اطراف محدود برخی از این زخمهای خوب شده فقط سیکاتریس از خود باقی گذاشته بود و بعضی از اطراف در حال پیشرفت بود. پدر و مادر بیمار سالم و دو خواهر بظاهر سالم دارد. سابقه سیفیلیس ارثی و اکتسابی رایج نمی‌گردید در بدن هم ظاهر انقضای موجود نبود. ظاهر عوارض تشخیص سیفیلید اول سرو گوموز دوره سوم بود.

در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۰۰ واسر من مریض منفی و بافت برداری در ۲۰ مرداد ۱۳۰۰ سیفیلیس دوره سوم را نشان داد و اسر من مایع نخاع هم منفی بود پس از یک دوره درمان با ارسنیک و بیسموت ضایعات بکلی ازین رفت در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۰۰ در حالیکه واسر من بیهار منفی وزخمهای بکلی خوب شده و سیکاتریس باقی بود مرخص شد.

منظور از بیان این دو شرح نتیجه‌ای بود که ماهمه روزه درین بیماران بستری بخش پوست بیمارستان پهلوی می‌گیریم در بسیاری از موارد بیماری با حالت عمومی خوب که سالها گرفتار زخمهای وسیع با خواص مذکوره در فوق می‌باشد مراجعته می‌نماید همانطوری که متذکر شدیم گاهی خود بخود در حال بیهودی بطيئی و زمانی در راه پیشرفت از محیط زخم هستند و اسر من بیماران را میتوان گفت در اکثر موارد منفی است این زخمهای بیشتر اوقات شبیه به زخمهای سلی و قارچی است فقط با مختصر تفاوت کلینیکی از اینکه ضمناً «سیر سینه» (۲) می‌باشد ما را بتشخیص هدایت می‌کنند البته بیوپسی در تمام موارد تشخیص را مسجل مینماید ولی ما عملاً عادت داریم که بمحض برخورد با این نوع بیماران فوراً شروع بدرمان سیفیلیس کرده و نتیجه همیشه خوب

است اغلب این زخمهای سیفیلید دوره سوم ارثی است که بنحو بطری بسیر تکاملی خود ادامه میدهد. در اقل موارد این ضایعات پوستی با سایر علائم سیفیلیس ارثی کم و بیش توأم است ولی غالباً از سایر علائم و نقص ساختمانی برای تشخیص عوارض دوره سوم سیفیلیس نمیتوان کمک خواست. ناگفته نماند که این نوع بیماران که مبتلا به سیفیلیس ارثی هستند و علائم نقص ساختمانی دارند ممکنست بعوارض سلی پوستی هم دچار شوند که از حیث ظاهر طبیب را در تشخیص مردد نگاهدارد در این موارد حقیقتاً سل بر روی زمینه سفیلیسی پیوندشده است و آنرا «هیبرید سیفیلو توبر کولوز»^(۱) و یا «اسکرو فولات دوورول»^(۲) می‌نامند.

نکته جالب توجه وجود این نوع ضایعات فوق العاده لجوج و وسیع با واسمن منفی است در اینجا است که ارزش واسمن تاحدی منتفي شده و حتی گاهی بعضی از مبتداً را منحرف می‌کند زیرا توجیه این امر مشکل می‌شود که چطور در موقع بروز شانکر سفیلیسی باندازه دهشاهی ممکنست واسمن بیمار کاملاً مثبت شود دولی بیماری که سالها است مبتلا بزخمهای وسیع و متعدد و متفرق می‌باشد و اسرمنش منفی است؛ جواب این موضوع ذیلاییان می‌شود:

آنچه برای وشیمیک: چنان‌که میدانیم واکنش‌های واسمن، کان، مانیکه، هشت نماینده یکسلسله عملیات همو لیزوفلو کولا سیون^(۳) است که از طریق غیر مستقیم بوجود مواد غیر لازم خون که ناشی از وجود هیکرب می‌باشد پی پرده می‌شود بعبارت دیگر واکنش‌های واسمن مبین وجود یک‌قدر از گلبولین و لیپوئید‌های مغز استخوان و مراکز خونساز در خون و بالنتیجه موجود عدم تعادل خونی می‌باشد این عدم تعادل بر اثر برخورد سرم بیمار مشکوک آتشی زن. سرم همو لیتیک و هماسی گوسفنده و کمپلمان بصورت عدم وجود همو لیز تظاهر می‌کند که ما بواسمن مثبت تعبیر می‌کنیم علیهذا اینطور بیان می‌شود که وجود ترپونم در بدن باعث آزادشدن مقداری مواد جدید شیمیائی در خون شده ایجاد عدم تعادل کلوئیدال مینماید و بطور غیر مستقیم ما از این عدم تعادل پی بواسمن مثبت می‌بریم. شکری نیست در بعضی از بیماریهای دیگر مثل بعضی اشکال حاد مalaria و اسرمن بیمار مثبت می‌شود و پس از درمان تدریجاً منفی می‌گردد همچنین

۱—Hybride syphylotuberculeuse

۲—Scrofulate de verole

۳—floculation

در مورد جذام گاهی و اسرمن مثبت دیده میشود در بعضی از اشکال شدید محملک و در موارد مخصوصی از سل و اسرمن ممکنست موقتاً مثبت شود زیرا چنانکه میدانیم غلاف چربی دور باسیل کنخ را فرا گرفته اگر مقدار زیادی در خون آزاد شود لیپوئید های آن میتواند این عمل را ایجاد کند. در بیماریهای اسپیروکتی و تریپانزومیاز بنسبت های متفاوتی و اسرمن مثبت میشود. در تومورهای سرطانی بعلت خراب شدن نسوج بدن و همچنین در نفریت‌ها و دیابت ویرقان. و بالاخره مسمومیت بافلزات سنگین مانند سرب و اسرمن خون بیماران مثبت میشود. در جمیع موارد فوق اگر در خون بمقدار کافی از لیپوئیدها و گلبولین بطور آزاد بوجود آید بنسبت وجود و مقدار این مواد و اسرمن بیمار بنسبتی مثبت خواهد شد.

علیهذا از ذکر مقدمه فوق تیجه میشود که ترپونم در مواردی که بمقدار زیاد در بدن وجود داشته باشد یعنی در دوره ویرولانس میکرب دفعاتاً مقداری از گلبولین و لیپوئید های مراکن خونساز بدن در خون آزاد شده و اسرمن بیمار مثبت میشود ولی تدریجاً که از مدت وحدت بیماری کاسته میشود اولاً بدن کم کم مصونیت نسبی مخصوصی نسبت بترپونم پیدا میکند ثانیاً مطابق بعضی از نظریه ها ترپونم بصورت اولترافیلتر (۱) در میآید که دیگر آن قدرت و توانائی را ندارد تا بتواند آنقدر ضایعات عمیق در مراکن خونساز بوجود آورند علیهذا در دوره سوم سیفیلیس بخصوص نوع ارثی نباید انتظار داشت که و اسرمن خیلی مثبت شود چنانچه در دوره های پاراسیفیلیس و سیفیلیس اعصاب هم همیشه و اسرمن مثبت مشاهده نمیشود در صورتی که در دوره دوم سیفیلیس که ویرولانس ترپونم زیاد و بیمار در او لین برخورد و تماس با میکرب قرار دارد تقریباً همیشه اوقات و اسرمن خون مثبت میشود و اگر هم موردی پیدا شود که منفی باشد آن مورد بستگی بوضع جسمانی بیمار دارد.

بدین طریق ارزش و اکنش و اسرمن برای سیفیلیس ارثی نسبی و فقط چشم و رزیده طبیب است که میتواند در ضایعات مشکوک پوست هادی تشخیص باشد.