

يك مورد ديگر كزاز شفا يافته نوزاد

نكارتس

د كتر پرويز خليلی

از اردبيل

عطف بمقاله شماره ۳ سال هشتم نامه دانشکده پزشکی تحت عنوان «يك مورد كزاز نوزاد شفا يافته» از نظر اهميت موضوع شرح حال نوزادی را كه از میان صدها قربانی جهالت ماماهاى بی سواد، جانی سلامت برده است بسمع همكاران خود ميرساند: احمد فرزند ب پسر بچه ایست كه روز دهم تولد بعلت تشنجات پیاپی و عدم توانائی مكیدن مورد معاینه قرار میگردد، كودك از روز نهم بطور وضوح این علائم را داشته است در آنروز همكار دیگریكه او را می بیند انگان مر كوریل و مقدار فوق العاده كم لومینال تجویز مینماید.

در سابقه خانوادگی و شخصی بیمار نکته قابل توجه وجود ندارد جز آنكه مادر طفل در هفت سال پیش دختر بچه ای زائیده و تا زایمان اخیر بعلت نامعلومی آبستن نشده است.

در معاینه طفل تنها چیزیکه جلب نظر میکرد تب ۳۹ و قیافه مخصوص (خننده شیطانی) بود كه مرا بفكر تتانوس انداخت همینكه خواستم گلوی بیمار را بینم علاوه بر آنكه تریسوس مانع آن شد تحريك نیز سبب پیدایش تشنجات تپيك كزاز گردید باری با اعلام پیش بینی بسیار وخیم مرض معالجه شروع شد: روز اول: سی هزار واحد سرم تجویز شد كه ۲ هزار فراهم گردید و در داخل عضله و زیر جلد با يك عدد کریستیسلین تزریق شد و باندازه دوسانتی گرم لومینال در ۲۴ ساعت خورانده شد.

روز دوم: تب ۳۸ حالت عمومی نسبتا بهتر تریسوس باقی است ولی آنچه كه بدهان بیمار میریزند فرو میبرد. باز ۳ هزار واحد سرم دستور داده شد متأسفانه در تمام شهر فقط ۱ هزار واحد پیدا شد لومینال و پنی سیلین همچنان ادامه داشت. روز سوم: از بیمار بی خبر بودم.

روز چهارم: تب ۳۶ در ۵۰ تشنج وجود ندارد و یا نامحسوس است قیافه طفل طبیعی، تریسموس اندکی نرم شده و پستان گرفتن میسر است.
 باز تجویز سرم شد بدبختانه حتی در بهداری شهر نیز برای نمونه یکعدد پیدا نشد و بالطبع سروتراپی خاتمه یافت و تنها به لومینال اکتفا شد.
 اکنون پسر بیچه نامبرده یازده ماهه بوده و باین آسانی از چنگال مرض وحشتناکی چون گزارا جان بدر برده است!

بحث

- ۱- شروع بیماری دیررس یعنی ۹ روز بوده است.
- ۲- مقدار سرم مصرف شده در مقابل آنچه که معمولست ناچیز بوده است (اتفاقاً ما نظایر این قبیل بهبودی را در مورد بزرگسالان با مقدار کم سرم در این نواحی زیاد می بینیم که بعلت گرانی سرم تجویز مقدار زیاد آن برای مردم فقیر میسر نمیشود.)
- ۳- پنی سیلین در دو روز متوالی با آنکه عملاً در روی بیماری تأثیر ندارد تجویز شده است.
- ۴- لومینال خیلی زیاد نبوده و در عمل هم بعلت تربیت خانوادگی ایجاد سکون و آرامش فراهم نبود.

نتیجه:

- ۱- گزاراهای با دوره نهفتگی طولانی بهبودی می یابند.
- ۲- در نوزادان نیز مانند بزرگسالان نوع خوش خیم بیماری وجود دارد.
- ۳- بنظر می رسد در مورد گزاراهای شفا یافته خوش خیم بودن عامل بهبودی است نه سرم زیاد و یا داروهای دیگر.

در این مورد نیز باید به این نکته توجه داشت که در نوزادان به دلیل ضعف سیستم ایمنی، تشخیص بیماریها دشوارتر است و گاهی اوقات درمانهای تجربی با موفقیت همراه می شود. بنابراین، در مواجهه با موارد مشابه، باید با احتیاط و با مشورت پزشک متخصص، اقدامات درمانی را انجام داد.