

از کارهای بخش داخلی بیمارستان رازی

بیماری که در آن جمن پزشگی بیمارستان رازی معرفی شده است

پک هور د درمان کامل التهاب سلی صفاق

با P.A.S نوام با احتقان پنهان و بیرون

نگارش :

فریبرز و هومنی

کار ورز بخش داخلی بیمارستان رازی

ف دختر محمود حج. ۲۵ ساله از اهالی تبریز در تاریخ ۳۰/۸/۱ با بزرگی فوق العاده شکم و درد و تب در بخش داخلی بستره شد.

۱- آزمایش‌های بالینی شکم فوق العاده بزرگ و برآمده حاوی مقدار زیادی آسیت، پوست شکم فوق العاده صاف و کشیده ناف مثل انگشت دستکش برآمده ولی جریان ورید طرفی جدار شکم وجود ندارد طحال و کبد محسوس نیستند.

بیمار چند روزی بیوست و بعد اسهال میگیرد منحنی تب نوسانی، شب در حدود ۴۰-۳۹ توأم با عرق مفرط صبح در حدود ۳۷ درجه. در سایر دستگاه‌های بدن اختلال عمیقی وجود ندارد. صداهای قلب آسوده توأم با تاکیکاری، فشار خون ماکزیما و مینیما ۷ است ادرار بیمار کم میباشد.

۲- امتحانات آزمایشگاهی مقدار اوره خون ۰۴ سانتی گرم در لیتر، تعداد گلبولهای سفید ۸ هزار سدیما تاسیون خون پس از یک ساعت ۰۴ میلیمتر مقنن دار آلبومین آسیت ۲۸ گرم سیتو با کتریولوزی آن در هر میدان میکرو سکپی بتفاوت از یک الی ۵ لنفو سیت و در حدود یک پلی نوکلئر دیده میشود. ریوالتا مثبت است.

۳- تشخیص با بودن آسیتی که قادر جریان وریدی طرفی روی جدار شکم و محسوس نبودن طحال و سرعت سدیما تو سیون خون منحنی تب و آزمایش سیتو با کتریولوزی مایع آسیت ما را متوجه پریتو نیت سلی نمود ولی برای تشخیص قطعی آن متأسفانه چون دسترسی به کبای نبود میسر نگردید.

۴- کارهای انجام یافته در تاریخ ۱۹/۸/۳۰ مقدار ۳ لیتر مایع از صفاق پونکسیون

شد که ریوالتای آن مثبت و آلبومین آن در حدود ۲۸ گرم در لیتر بود از تاریخ ۳۰/۸/۲۲ تزریق داخل صفاقی P.A.S ابتدا دو روز یکمرتبه و بعد یکروز در میان توأم با نیم‌گرم استرپتو میسین روزانه بعمل آمد.

تزریق P.A.S تا تاریخ ۴/۹/۳۰ یعنی مدت ۳۴ روز ادامه داشت ولی استرپتو میسین در اواسط درمان قطع گردید.

۵- خلاصه مجموعاً ۴ لیتر مایع آسیت که ۳ لیتر آن در تاریخ ۲۹ آبان از صفاق بیمار کشیده شده و مجموعاً ۲۰ آمپول P.A.S کریستالیزه که هر آمپول محتوی ۲ گرم P.A.S بود (مجموعاً ۸ گرم) از تاریخ ۲۲ آبان تا ۴ دی مستقیماً داخل صفاق و ۸ گرم استرپتو میسین از تاریخ ۲۲ آبان تا ۷ آذر داخل عضله تزریق گردید.

۶- در تیجه درمان با تزریق P.A.S و استرپتو میسین توانستیم نوسان تبدابهم زنیم باین ترتیب تبی که در اوایل آبان بین ۴۰ و ۳۷/۵ نوسان داشت در اوایل دیماه بین ۳۷ و سه عشر و ۳۷ نوسان نمود و در تاریخ ۲۱ دیماه بیمار مرخص گردید در حالیکه اسیت شکم او بکلی از بین رفته و درد شکم کاملاً تسکین یافته و بیمار از هر لحاظ راضی بود فقط کمی رنگ پریده و کم خون‌بنظر میرسید که با تقویت داروئی و غذائی مرتفع خواهد شد.

فرضیه لازم

معمولاً ملح سدیک اسید پارا آمینو سالیسیلیک که در آمپولهای ۲ گرمی بصورت بلورهای کریستالیزه وجود دارد بکار می‌برند برای تزریق آن باید ۲ سانتی‌متر مکعب از مایع اسیت را با آن مخلوط نموده مستقیماً داخل صفاق تزریق کنند در صورتی که اسیت بمقدار کافی نباشد و یا اصولاً وجود نداشته باشد باید مدتی بعد از آن تاتب باقی است تزریق داخل صفاقی P.A.S را ادامه دهنده‌منتهی بجای مایع اسیت S.P.A.R را با ۲۰ سانتی‌کوب سرم فیزیولوژی مخلوط نمایند.

دونکته اساسی و مهم را پیوسته در نظر داشته باشند اولاً بلافاصله بعد از درست کردن محلول P.A.S آنرا مصرف نمایند زیرا محلول پاس زود خراب می‌شود نانیاً هر گز پاسهایی که بصورت محلول در بازار وجود دارد استعمال نکنند زیرا مؤثر نخواهد بود چون در بخش نسبت به بیمار دیگری امتحان شدو نتیجه نبخشید.