

## مقایسه عوارض و پیامد در روش توراکوتومی خلفی جانبی استاندارد با روش توراکوتومی با حفظ عضلات لاتیسموس دورسی و سراتوس قدامی

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۷/۰۷/۲۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰

### چکیده

زمینه و هدف: توراکوتومی استاندارد به علت بریده شدن عضلات بزرگ جدار قفسه سینه سبب ایجاد درد و اختلال در مکانیسم تنفسی می‌شود. برای احتراز از این مسئله توراکوتومی خلفی-جانبی با حفظ عضلات پیشنهاد شده است. این مطالعه برای مقایسه توراکوتومی خلفی جانبی با حفظ عضلات سراتوس قدامی و لاتیسموس دورسی با روش توراکوتومی استاندارد طراحی شد. روش برسی: در این کارآزمایی بالینی بیمارانی که کاندید توراکوتومی الکتیو بودند به طور تصادفی بهدو گروه مساوی توراکوتومی با حفظ عضلات (روش جدید) و توراکوتومی استاندارد (شاهد) تقسیم شدند و متغیرها شامل مدت زمان لازم برای باز کردن و بستن قفسه سینه-درد-میزان مصرف نارکوتیک-پیدایش سروما و مدت زمان بستره و نیز محدوده حرکات شانه (فلکسیون-اکستنسیون-ابداسیون و روتاسیون داخلی) و عملکرد ریوی (FVC، FEV1 و VC)، قبل و هفت روز پس از عمل اندازه گیری شدند. یافته‌ها: ۶۰ بیمار (۴۲ مرد) وارد مطالعه شدند که تفاوت معنی داری بین توزیع سنی و جنسی بیماران در دو گروه وجود نداشت ( $p=0.05$ ). متوسط زمان باز کردن قفسه سینه در گروه روش جدید از گروه شاهد بالاتر بود ( $p=0.01$ ). در مقابل مدت زمان بستن محل عمل کمتر بود ( $p=0.01$ ). همچنین FVC پس از عمل و محدوده حرکات شانه در گروه روش جدید از گروه شاهد بالاتر و درد گروه روش جدید کمتر بود ( $p<0.05$ ) در حالی که بین دو گروه توراکوتومی با مصرف داروهای نارکوتیک و مدت زمان بستره در بیمارستان وجود نداشت ( $p>0.05$ ). در گروه توراکوتومی با حفظ عضلات در ۱۳٪ بیماران (چهار بیمار) پس از عمل سروما پدید آمد. توجه گیری: روش توراکوتومی با حفظ عضلات می‌تواند به عنوان یک جایگزین مناسب برای توراکوتومی استاندارد در موارد الکتیو استفاده شود.

کلمات کلیدی: توراکوتومی حفظ عضلات، توراکوتومی استاندارد، عوارض، عملکرد.

علی اصغر علوی<sup>\*</sup>

سید مهدی جلالی<sup>۱</sup>

علی حاجی میینی<sup>۱</sup>

حمیرا پیروی سرشكه<sup>۲</sup>

۱- گروه جراحی توراکس

۲- گروه جراحی

۳- کارشناس پرستاری

بیمارستان ولی عصر، مجتمع بیمارستانی امام  
خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

\* نویسنده مسئول: تهران، انتهای بلوار کشاورز، مجتمع  
بیمارستانی امام خمینی، گروه جراحی توراکس  
تلفن: ۰۱۹۲۳۸۶

email: aliasgharalavim@gmail.com

### مقدمه

افزایش بروز آتلکتاژی ریه به دلیل مصرف زیاد داروهای ضد درد می‌شوند.<sup>۱</sup> توراکوتومی با حفظ عضلات به عنوان جایگزینی برای روش استاندارد توراکوتومی خلفی جانبی مطرح شده است.<sup>۲</sup> در این روش به جای بریدن عضلات از بلند کردن عضلات به صورت فلاپ استفاده می‌شود.<sup>۳</sup> اگرچه برتری این روش نسبت به روش استاندارد در مواردی نظری کاهش درد پس از عمل و نتایج زیبایی به خوبی نشان داده شده است<sup>۴</sup> ولی در مواردی نظری تاثیر بر حجم‌های ریوی و بهبود حرکات شانه اختلاف نظر وجود دارد<sup>۵</sup> و هنوز داده‌های کافی برای حمایت از این روش و کاربرد روتین آن به جای توراکوتومی خلفی جانبی استاندارد وجود ندارد. در این مطالعه ما قصد داریم این دو روش را از نظر عوامل متعدد مقایسه کیم.

توراکوتومی خلفی جانبی Posterolateral thoracotomy به دلیل ایجاد فضای مناسب برای در معرض قرار دادن احتشای درون قفسه سینه به عنوان برش استاندارد در اعمال جراحی قفسه سینه محسوب می‌شود. از مزایای دیگر این روش سادگی انجام آن است که موجب می‌شود زمان کوتاهی برای ورود به فضای پلور مورد نیاز باشد.<sup>۱</sup> علیرغم مزایای ذکر شده برای انجام تراکوتومی خلفی جانبی باید عضلات بزرگ قفسه سینه یعنی لاتیسموس دورسی و سراتوس قدامی جدا شوند که این مساله می‌تواند باعث افزایش درد پس از عمل و محدودیت حرکت شانه و اندام فوکانی شود.<sup>۲</sup> علاوه بر این بیماران خصوصاً افراد مسن معمولاً دچار کاهش عملکرد ریوی و

## روش بررسی

دو الی سه سانتی متر جدا شد. همچنین در برخی موارد نیاز به جدا کردن ناکامل عضله تراپیوس بود. در گروه دیگر توراکوتومی خلفی جانبی استاندارد تمام لاتیسموس دورسی و لبه تحتانی سراتوس قدامی جدا شد.<sup>۲</sup>

اندازه گیری متغیرها: متغیرهایی که در این مطالعه مد نظر قرار گرفتند عبارت بودند از مدت زمان لازم برای باز کردن و بستن قفسه سینه، درد، میزان مصرف نارکوتیک، محدوده حرکات شانه، عملکرد ریوی، پیدایش سروم و مدت زمان بسترهای نارکوتیک مورد استفاده در این مطالعه پذین داخل عضلانی بود که در ۲۴ ساعت پس از عمل به بیمار تزریق می شد.<sup>۳</sup> حجم های تنفسی اندازه گیری شده عبارت بودند از ظرفیت حیاتی (VC)، ظرفیت حیاتی با بازدم پر فشار (FVC) و حجم بازدمی پر فشار در ثانیه اول (FEV1) که با استفاده از اسپیرومتر قبل از عمل و هفت روز پس از عمل توسط یک تکنسین اندازه گیری شدند. VC (مجموع حجم های ذخیره دمی و حجم جاری و حجم ذخیره بازدمی) برابر حداقل مقدار هوایی بود که بیمار پس از پر کردن ریه های به میزان حداقل با بازدم کاملاً عمیق از ریه های بیرون می داد. برای اندازه گیری FVC از بیمار خواسته می شد که نفس بسیار عمیق بکشد و سپس با حداقل قدرت اقدام به دم سریع و کامل بنماید. VC و FEV1 براساس سن، قد و جنس بیمار تعديل شدند.<sup>۷</sup> حرکات فعل شانه به شیوه زیر قبیل از عمل و هفت روز پس از عمل توسط یک معاینه کننده اندازه گیری شدند:<sup>۲</sup> ۱- برای انجام فلکسیون از بیمار خواسته شد که در حالی که آرنج به میزان ۹۰° خم است بازوی سمت عمل را از جلو بالا بیاورد. میزان فلکسیون بین صفر تا ۱۸۰ درجه در نظر گرفته شد. ۲- برای انجام اکستانسیون از بیمار خواسته شد که در حالی که آرنج به میزان ۹۰° خم است بازوی سمت عمل را عقب ببرد. میزان اکستانسیون بین صفر تا ۶۰ درجه در نظر گرفته شد. ۳- برای انجام ابادکسیون بیمار در حالی که آرنج کاملاً در حالت اکستانسیون قرار داشت بازوی سمت عمل را از تنه دور می کرد. میزان ابادکسیون بین صفر تا ۱۸۰ درجه در نظر گرفته شد. ۴- روتاسیون داخلی با درخواست اینکه بیمار در حالی که شسته به سمت بالا قرار دارند با دست سمت عمل پشت را لمس کند بررسی شد. میزان آن بین صفر تا ۹۰ درجه در نظر گرفته شد. برای اندازه گیری درد از Visual Analogue Scale (VAS) با معیار ۱۰۰ میلی متری استفاده شد به این ترتیب که فاصله هر نقطه ای که بیمار

این کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال ۱۳۸۴ در بیمارستان ولیعصر (عج)، مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران انجام شد. علاوه بر تایید مطالعه توسط کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران به بیماران پیش از انجام مطالعه در خصوص مطالعه توضیح داده شده و از آنها رضایت نامه کتبی گرفته شد. بیمارانی که به دلیل بیماری های ریوی - گوارشی و یا توده های قفسه سینه کاندید انجام توراکوتومی الکتیو بودند به مطالعه وارد شدند و با استفاده از جدول اعداد تصادفی به دو گروه توراکوتومی با حفظ عضلات لاتیسموس دورسی و سراتوس قدامی (روش جدید) و توراکوتومی خلفی جانبی استاندارد (شاهد) تقسیم شدند. بیماران کاندید توراکوتومی اورژانس از مطالعه کنار گذاشته شدند.

روش جراحی: پس از بیهوشی عمومی در گروه توراکوتومی با حفظ عضلات برشی به صورت خلفی فوقانی از خط زیر بغلی قدامی تا دو انگشت زیر نوک استخوان کتف (بین اسکاپولا و ستون فقرات) داده شد. سپس با استفاده از الکترو کوتور فلاپ های پوستی از لبه های عضله لاتیسموس دورسی بلند شدند تا مثلث Auscultatory (فضای محدود بین لبه تحتانی عضله تراپیوس - عضله لاتیسموس دورسی و لبه داخلی استخوان کتف) و حاشیه خلفی لاتیسموس دورسی ظاهر شوند. سپس تشریح این فضا به سمت بالا و پایین انجام شد. برای جا به جا کردن سراتوس قدامی کمک جراح لاتیسموس دورسی را به قدام و دور از قفسه سینه حرکت داد تا سراتوس از لاتیسموس دورسی و جدار قفسه سینه جدا شود. پس از انتخاب فضای بین دندنه های مناسب برشی در لبه قدامی دندنه تحتانی آن فضا داده شد و برای باز کردن بیشتر فضا و افزایش دید فضای توراکس از دو رتراکتور استفاده شد. پس از انجام جراحی مورد نظر مجدداً دندنه های پاراکوستال به یکدیگر نزدیک شدند. برای تخلیه فضای زیر جلدی و جلوگیری از پیدایش سرومای سرومای از ساکشن بسته استفاده شد. این درن در روز چهارم پس از عمل یا دیرتر زمانی که ترشح درن به کمتر از ۵۰۰ml/۲۴h رسید خارج می شد. بلوک اعصاب بین دندنه های بالا و پایین فضای برش با استفاده از لیدوکائین ۰.۲٪ صورت گرفت. در بعضی از بیماران برای ایجاد فضای بزرگتر و افزایش دید فضای داخل قفسه سینه مبدأ خلفی میانی عضله لاتیسموس دورسی به اندازه

قفشه‌سینه در گروه روش جدید به طور معنی‌داری از گروه شاهد بالاتر بود ( $19/79 \pm 1/66$  دقیقه در مقابل  $16/20 \pm 1/49$  دقیقه و  $p=0/001$ , Independent samples T-test). در مقابل مدت زمان بستن محل عمل در گروه روش جدید به طور معنی‌داری کمتر بود ( $19/93 \pm 1/49$  و  $p=0/001$ , Independent samples T-test) مقابل  $15/86 \pm 1/66$  دقیقه). متوسط درد پس از عمل در گروه روش

به عنوان شدت درد نشان می‌داد از مبدأ اندازه‌گیری می‌شد.<sup>۲</sup> درد پس از عمل در روزهای اول و هفتم پس از عمل اندازه‌گیری شد. در این مطالعه مقادیر بر اساس انحراف معیار $\pm$  میانگین گزارش شده‌اند. برای آنالیز داده‌ها از Independent samples t-test و  $\chi^2$  انجام شد. مقادیر  $p < 0/05$  از نظر آماری معنی‌دار تلقی شد.

## یافته‌ها

بر اساس معیارهای ورود و خروج ۶۰ بیمار (۴۲ مرد) به مطالعه وارد شدند که در هر گروه ۳۰ بیمار قرار گرفت. میانگین سنی بیماران در گروه‌های روش جدید و شاهد به ترتیب  $42/6 \pm 18/52$  و  $40/33 \pm 18/47$  سال بود که از نظر آماری تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت ( $p=0/740$ , Independent samples T-test). همچنین تفاوت معنی‌داری بین توزیع جنسی بیماران در دو گروه وجود نداشت ( $\chi^2 = 0/573$ ,  $p=0/573$ ) و به ترتیب ۲۲ و ۲۰ مرد در گروه‌های روش جدید و شاهد قرار گرفتند. جدول ۱ علل و پاتولوژی بیماران شرکت کننده در مطالعه را نشان می‌دهد. متوسط زمان باز کردن

جدول-۱: علل و پاتولوژی بیماران شرکت کننده در مطالعه

شاهد	روش جدید	علت توراکوتومی
۱۸/۶۰	۱۶/۵۳/۳	خوش خیم
۱۲/۴۰	۱۲/۰/۴۰	بدخیم
۰	۲/۰/۶/۷	نامشخص
۱۲/۴۰	۱۴/۰/۴۶/۶	مشکلات ریوی
۰	۲/۰/۶/۷	مشکلات گوارشی
۱۴/۴۶/۶	۱۲/۰/۴۰	توده
۴/۱۳/۴	۲/۰/۶/۷	سایر موارد

جدول-۲: مقایسه دو گروه از نظر عملکرد ریوی- محدوده حرکات شانه- میزان نارکوتیک مصرفی و درد مقادیر به صورت انحراف معیار $\pm$  میانگین بیان شده‌اند.

p*	شاهد	روش جدید	متغیر
		حجم‌های ریوی (لیتر)	
۰/۰۴۹	۲/۲۸۳±۰/۴۳۲	۲/۶۸۲±۰/۵۶۷	قبل از عمل
	۲/۱۲۷±۰/۴۴۵	۲/۴۶۷±۰/۶۹۰	هفت روز پس از عمل
۰/۰۱۰	۱/۸۲۷±۰/۴۷۷	۲/۲۴۰±۰/۶۲۵	قبل از عمل
	۱/۷۱۵±۰/۴۶۶	۱/۹۶۰±۰/۶۶۱	هفت روز پس از عمل
۰/۲۰۸	۱/۵۸۳±۰/۴۳۷	۰/۵۷۳±۱/۹۲۰	قبل از عمل
	۱/۷۵۲±۰/۰۳۰	۱/۷۹۷±۰/۵۶۲	هفت روز پس از عمل
		حرکات شانه (درجه)	
<۰/۰۰۱	۱۵۸/۵۷±۲۵/۹۸	۱۵۷/۱۴±۲۵/۵۵	قبل از عمل
	۱۲۲/۸۶±۳۳/۶۱	۱۴۸/۵۷±۳۱/۳۴	هفت روز پس از عمل
<۰/۰۰۱	۷۳/۵۷±۱۴/۹۹	۸۰/۷۱±۱۳/۲۸	قبل از عمل
	۵۳/۹۳±۱۱/۸۰	۷۷/۱۴±۱۴/۳۷	هفت روز پس از عمل
<۰/۰۰۱	۱۵۹/۲۹±۲۶/۷۴	۱۶۸/۵۷±۱۶۲/۱۴	قبل از عمل
	۱۱۹/۲۹±۱۸/۱۷	۱۶۲/۱۴±۱۶/۳۷	هفت روز پس از عمل
۰/۰۱۳	۶۷/۱۴±۱۶/۳۷	۷۷/۵۰±۱۲/۳۶	قبل از عمل
	۵۰/۰۰±۱۳/۴۰	۷۰/۳۶±۱۳/۳۷	هفت روز پس از عمل
۰/۰۶۸	۹/۳۰±۴/۱۷	۶/۵۳±۳/۷۹	نارکوتیک مصرفی (میلی گرم)
۰/۰۷۵	۶/۷۳±۱/۲۲	۶/۶±۱/۱۸	مدت زمان بستری (روز)
<۰/۰۰۱	۸۹/۷۳±۵/۶۱	۷۶/۸۰±۶/۱۷	درد
	۵۳/۳۳±۱۰/۰۳	۳۴/۸۷±۱۱/۰۱	هفت روز پس از عمل

\* Independent samples T-test    VC= Vital Capacity    FVC= Functional Vital Capacity    FEV1= Forced Expiratory Volume in first second

نشان داده‌اند. در مطالعه Akcali<sup>۳</sup> مشابه دو گزارش دیگر<sup>۹,۱۰</sup> بهبود حجم‌های تنفسی را نشان نداد در صورتی که در مطالعه Ponn<sup>۱۱</sup> مشابه مطالعه ما بهبود FVC را گزارش کرد. همین‌طور Lemmer در مطالعه‌ای بهبود ذخیره ریوی پس از عمل در روش توراکوتومی با حفظ عضلات را گزارش کرد.<sup>۱۲</sup> مطالعه ما همانند مطالعات قبلی بهبود حركات شانه را در روش حفظ عضلات را نشان داد.<sup>۹,۱۰</sup> هر چند از این نظر بین نتایج مطالعات انجام شده تفاوت وجود دارد.<sup>۹,۱۰</sup> ولی بهنظر می‌رسد که بیشتر مطالعات از بهبود حركات شانه حمایت کرده‌اند.<sup>۹</sup> ضمن اینکه بهنظر می‌رسد حفظ عضلات سراتوس قدامی و لاتیسموس دورسی به بازگشت سریع‌تر عملکرد شانه کمک خواهد کرد.<sup>۱۳</sup> بر اساس مطالعات گذشته به‌خوبی مشخص شده است که کاهش درد پس از عمل یک مزیت عمدۀ روش توراکوتومی با حفظ عضلات است.<sup>۹,۱۰</sup> با این حال در بعضی از مطالعات تفاوت معنی‌داری بین مصرف نارکوتیک در دو گروه وجود نداشته است.<sup>۸,۱۲</sup> در مطالعه ما نیز درد پس از عمل به‌طور معنی‌داری در گروه روش جدید کمتر بود ولی بین دو گروه تفاوت معنی‌داری گروه از نظر مصرف داروهای نارکوتیک وجود نداشت. دلیل این پدیده را می‌توان این گونه توجیه کرد که قسمت اعظم درد ناشی از توراکوتومی به‌علت برش عضلات نیست بلکه رتراسکیون دندنه‌ها مسبب آن است.<sup>۱۴,۱۵,۱۶</sup> از نظر مدت زمان بستری در مطالعه حاضر تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت که از این نظر مطالعه ما به مطالعه Akcali شباهت دارد.<sup>۳</sup> همچنین میزان پیدایش سروما در عمل حفظ عضلات بین ۲٪ تا ۲۳٪ متغیر می‌باشد<sup>۲</sup> که در مطالعه ما نیز در ۱۳٪ بیماران گروه حفظ عضلات سروما پدید آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که روش توراکوتومی با حفظ عضلات می‌تواند به‌عنوان یک جایگزین مناسب برای توراکوتومی استاندارد در موارد الکتیو مورد استفاده قرار بگیرد. چرا که علیرغم فضای مناسبی که برای در معرض قرار دادن فضای درون توراکس فراهم می‌آورد افزایش مدت زمان باز کردن در این روش آن را برای کاربرد در موارد اورژانس نامطلوب می‌سازد. از طرف دیگر علیرغم اینکه هنوز در مورد برتری توراکوتومی با حفظ عضلات در خصوص مسایلی نظری بهبود در محدوده حركات شانه و عملکرد ریوی اختلاف نظر وجود دارد ولی کاهش درد پس از عمل این روش را به‌عنوان یک گزینه مناسب برای اعمال جراحی توراکس مطرح می‌کند.

جدید کمتر بود. (Independent samples T-test) جدید کمتر بود. (Independent samples T-test) حجم‌های ریوی پس از عمل و محدوده حركات شانه در گروه روش جدید به‌طور معنی‌داری از گروه شاهد بالاتر بودند در حالی که بین دو گروه تفاوت معنی‌داری از نظر مصرف داروهای نارکوتیک و مدت زمان بستری در بیمارستان وجود نداشت (جدول ۲). در گروه توراکوتومی با حفظ عضلات در ۱۳٪ بیماران (چهار بیمار) پس از عمل سروما پدید آمد.

## بحث

نتایج این مطالعه نشان داد که توراکوتومی با روش حفظ عضلات با بهبود FVC و بهبود دامنه، فلکسیون، اکستنسیون و ابداکسیون و روتاسیون داخلی شانه و همچنین کاهش درد پس از عمل همراه است در حالی که تاثیری بر FEV1 و مصرف نارکوتیک پس از عمل و مدت زمان بستری ندارد. مدت زمان باز کردن قفسه‌سینه در گروه شاهد طولانی‌تر بود در حالی که در گروه روش جدید زمان کمتری برای بستن قفسه‌سینه صرف شد. ضمن اینکه سروما به‌عنوان عارضه پس از عمل در ۱۳٪ بیماران گروه شاهد به‌وجود آمد. در مطالعاتی که پیش از این انجام شده‌اند نتایج متفاوتی در خصوص مدت زمان عمل به‌دست آمده است. در حالی که بعضی از مطالعات از کوتاه‌تر بودن ۲ زمان عمل در توراکوتومی با حفظ عضلات حمایت کرده‌اند<sup>۲</sup> مطالعات دیگر نشان دادند که در زمان عمل تفاوتی وجود ندارد<sup>۹</sup> یا در توراکوتومی با حفظ عضلات طولانی‌تر است.<sup>۱۰</sup> از آنجایی که اعمال جراحی متفاوتی در این مطالعه وارد شدند ما تنها زمان باز کردن و بستن قفسه‌سینه را در دو گروه مقایسه کردیم و به بررسی زمان کل عمل نپرداختیم. نتایج ما نشان داد که اگرچه مدت زمان باز کردن توراکس در گروه روش جدید طولانی‌تر است در مقابل زمان بستن در این گروه کمتر است. این مساله منطقی است زیرا در زمان باز کردن توراکس در گروه روش جدید فلاپ‌های زیر پوستی می‌شود در حالی که این زمان در هنگام بستن توراکس بدليل اینکه نیازی به نزدیک کردن لبه‌های عضلات به یکدیگر نیست کاهش می‌یابد.<sup>۲</sup> لاتیسموس دورسی و سراتوس قدامی عضلات فرعی تنفسی هستند که در دم و بازدم عمیق و سرفه نقش دارند.<sup>۴</sup> بنابراین منطقی به‌نظر می‌رسد که در روش حفظ عضلات شاهد بهبود حجم‌های ریوی باشیم. با این حال مطالعات مختلف در این خصوص نتایج متفاوتی را

## References

- Kim D, Park S. Feasibility of latissimus dorsi and serratus anterior muscle-sparing vertical thoracotomy in general thoracic surgery. *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2004;3(3):456-9.
- Akçalı Y, Demir H, Tezcan B. The effect of standard posterolateral versus muscle-sparing thoracotomy on multiple parameters. *Ann Thorac Surg* 2003;76(4):1050-4.
- Ashour M. Modified muscle sparing posterolateral thoracotomy. *Thorax* 1990;45(12):935-8.
- Karwande SV, Pruitt JC. A muscle-saving posterolateral thoracotomy incision. *Chest* 1989;96(6):1426-7.
- Karwande SV, Rowles JR. Simplified muscle-sparing thoracotomy for patent ductus arteriosus ligation in neonates. *Ann Thorac Surg* 1992;54(1):164-5.
- Akçalı Y, Demir H, Tezcan B. A technique facilitating muscle-sparing thoracotomy. *Asian Cardiovasc Thorac Ann* 2002;10(2):194-5.
- Nomori H, Horio H, Fuyuno G, Kobayashi R. Non-serratus-sparing antero-axillary thoracotomy with disconnection of anterior rib cartilage. Improvement in postoperative pulmonary function and pain in comparison to posterolateral thoracotomy. *Chest* 1997;111(3):572-6.
- Landreneau RJ, Pigula F, Luketich JD, Keenan RJ, Bartley S, Fetterman LS, et al. Acute and chronic morbidity differences between muscle-sparing and standard lateral thoracotomies. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1996;112(5):1346-50.
- Hazelrigg SR, Landreneau RJ, Boley TM, Priesmeyer M, Schmaltz RA, Nawarawong W, et al. The effect of muscle-sparing versus standard posterolateral thoracotomy on pulmonary function, muscle strength, and postoperative pain. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1991;101(3):394-400.
- ugı K, Nawata S, Kaneda Y, Nawata K, Ueda K, Esato K. Disadvantages of muscle-sparing thoracotomy in patients with lung cancer. *World J Surg* 1996;20(5):551-5.
- Ponn RB, Ferneini A, D'Agostino RS, Toole AL, Stern H. Comparison of late pulmonary function after posterolateral and muscle-sparing thoracotomy. *Ann Thorac Surg* 1992;53(4):675-9.
- Lemmer JH Jr, Gomez MN, Symreng T, Ross AF, Rossi NP. Limited lateral thoracotomy. Improved postoperative pulmonary function. *Arch Surg* 1990;125(7):873-7.
- Hennington MH, Ulicny KS Jr, Dettarbeck FC. Vertical muscle-sparing thoracotomy. *Ann Thorac Surg* 1994;57(3):759-61.
- Soucy P, Bass J, Evans M. The muscle-sparing thoracotomy in infants and children. *J Pediatr Surg* 1991;26(11):1323-5.
- Athanasiadi K, Kakaris S, Theakos N, Skottis I. Muscle-sparing versus posterolateral thoracotomy: a prospective study. *Eur J Cardiothorac Surg* 2007;31(3):496-9.
- Khan IH, McManus KG, McCraith A, McGuigan JA. Muscle sparing thoracotomy: a biomechanical analysis confirms preservation of muscle strength but no improvement in wound discomfort. *Eur J Cardiothorac Surg* 2000;18(6):656-61.
- Akçalı Y, Demir H, Tezcan B. The effect of standard posterolateral versus muscle-sparing thoracotomy on multiple parameters. *Ann Thorac Surg* 2003;76(4):1050-4.
- Bernard A, Brondel L, Arnal E, Favre JP. Evaluation of respiratory muscle strength by randomized controlled trial comparing thoracoscopy, transaxillary thoracotomy, and posterolateral thoracotomy for lung biopsy. *Eur J Cardiothorac Surg* 2006;29(4):596-600.

## Comparison of complications and functional results of standard posterolateral thoracotomy with muscle sparing thoracotomy

Alavi A.<sup>1\*</sup>  
Jalali S.M.<sup>2</sup>  
Hajmobi A.<sup>1</sup>  
Peiravy Sereshke H.<sup>3</sup>

1- Department of Thoracic Surgery  
2- Department of Surgery  
3- Operation room

Valie-asr Hospital, Tehran  
University of Medical Sciences

### Abstract

Received: October 12, 2008 Accepted: November 10, 2008

**Background:** Standard thoracotomy necessitates division of thoracic large muscles leading to pain and impaired respiratory movements; muscle sparing postero-lateral thoracotomy has been suggested as an alternative to reduce the aforementioned effect. The aim of this study was to compare muscle saving posterolateral thoracotomy with standard thoracotomy.

**Methods:** This study was a clinical trial. All patients who were candidates for elective thoracotomy were included and divided into two groups of muscle saving thoracotomy and standard thoracotomy randomly. Required time for opening and closing the chest, amount of prescribed narcotics, shoulder movements (flexion, extension, abduction and internal rotation), pulmonary function (FVC, FEV1, VC), development of seroma, and duration of hospitalization were assessed. Shoulder movements and pulmonary function were measured immediately before operation and 7 days later while pain measured in 1<sup>st</sup> and 7<sup>th</sup> post-operative days.

**Results:** 60 patients (42 males) entered the study and there were no significant differences regarding age and sex distribution between two groups ( $p>0.05$ ). Mean duration of opening the chest in muscle saving thoracotomy was significantly longer than standard procedure while the duration of closing the chest wall was significantly shorter in muscle saving thoracotomy ( $p<0.05$ ). FVC and range of motion of the shoulder were higher and post-operative pain was lesser in muscle saving thoracotomy than standard thoracotomy ( $p<0.05$ ). There were no significant differences regarding prescribed narcotics and duration of hospital stay ( $p>0.05$ ). Seroma developed in 13% (n=4) of muscle saving group.

**Conclusion:** Muscle saving thoracotomy can be used as an appropriate alternative for standard postero-lateral thoracotomy in elective thoracic operations.

**Keywords:** Thoracotomy, standard, complication, function.

\* Corresponding author: Dept. of Thoracic Surgery, Imam Khomeini Hospital Complex, Keshavarz Blvd., Tehran, IRAN  
Tel: +98-21-61192386  
email: aliasgharalavim@gmail.com