

مقایسه فراوانی کمبود روی سرم در خانم‌های حامله و غیر حامله

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۰۳/۳۱

جکڑہ

زمینه و هدف: عنصر روی یکی از المان‌های ضروری رشد و سلامتی در انسان است. بسیاری از شواهد نشان می‌دهند که کمبود روی یکی از مشکلات اساسی در جوامع پیشرفته و در حال رشد می‌باشد بهدلیل در معرض خطر بودن و خطرات بیشتر کمبود روی، این مطالعه جهت تعیین میزان روی سرم در زنان باردار ایرانی در سه ماهه بارداری و مقایسه این یافته‌ها با افراد شاهد سالم انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعه تعداد ۶۷۵ خانم حامله سالم در سه تریمیستر بارداری با ۱۴۵ خانم غیر حامله سالم به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد و آزمایش خون ناشتا جهت بررسی میزان روی سرم در مرکز آزمایشگاهی واحدی از نمونه‌ها گرفته و با روش اسپکتروفتومتری (Enzymatic) بررسی گردید. **یافته‌ها:** کمبود روی در ۱۶٪ زنان باردار دیده شد، هیچ یک از زنان غیر باردار چار کمبود روی نبودند. اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه وجود داشت ($P < 0.001$). کمبود روی ارتباطی با سن مادر، تریمیستر بارداری، مصرف آهن، تعداد زایمان و BMI نداشت اما هموگلوبین با کمبود روی در ارتباط بود و سطح کمبود روی در هموگلوبین کمتر از ۱۲ به وضوح بیشتر بود ($OR = 2.41$, $CI = 1.36-4.26$). **نتیجه‌گیری:** با توجه به نتایج مطالعه حاضر، در سطح هموگلوبین کمتر از ۱۲ علی‌رغم مصرف مکمل آهن، کمبود روی بیشتر مشاهده شد. در این موارد به نظر می‌رسد مصرف مکمل آهن و روی جهت رساندن هموگلوبین به سطح نرمال موثرتر عمل نماید. همچنین با انجام مطالعات گستره‌تر و با اندازه‌گیری روی سرم و Hb، در دوران بارداری در صورت نیاز مکمل‌های آهن و روی تجویز شود.

كلمات كلية: كمبود روی سرم، روی، بارداری، هموگلوبین، سن حاملگی.

است. غلظت‌های بالای روی در شبکیه چشم (274mg/gr) و مایع پرورستان $300-500\text{mg/lit}$ مشاهده می‌شود دفع روی عمدتاً از طریق لوله روده‌ای - معده‌ای و دفع مدفع 3mg/day - 5mg/day بسته به دریافت روی و بهمیزان کمتر از طریق ادرار و پوست 7mg/day - 5mg/day می‌باشد و همچنین روی از طریق مایع منی، خون قاعده‌گی و رشد ناخن و مو از دست می‌رود.^{۱۰} مکان مشخصی جهت ذخیره روی در بدن وجود ندارد، بنابراین وجود آن در رژیم غذایی روزانه مورد احتیاج است و فقط 20% روی موجود در مواد غذایی جذب می‌شود چون فیبرها و اسید فیتیک موجود در غذا، با روی یک کمپلکس غیر قابل حل تشکیل می‌دهند که بدن نمی‌تواند آن را جذب کند، بنابراین کمبود روی بیشتر در مناطقی اتفاق می‌افتد که رژیم غذایی حاوی مقدار زیادی نان و برنج باشد (مثل ایران و کشورهای میتوانهای).^۱ سطح

روی (Zn) یک عنصر اساسی و مهم می‌باشد که دارای اعمال مختلف گسترهای در بدن بوده و در ترکیبات آنزیم‌های مختلف وجود دارد، نقش مهمی در تغییمات سلولی جهت سنتز پروتئین و DNA، فعال کردن انسولین، متابولیسم تخمدان و بیضه، اعمال کبدی، تکامل رفتاری و یادگیری، بهبود زخم‌ها، شرکت در حمایت بدن از مسمومیت با فلزات سنگین مانند سرب، تنظیم حس چشایی و تطابق بینایی دارد همچنین در متابولیسم پروتئین، کربوهیدرات، چربی و ایجاد انرژی نقش دارد. روی در تمام بافت‌ها و مایعات بدن یافت می‌شود، محتوای کل روی بدن حدود دو گرم می‌باشد که ۶۰٪ آن در ماهیچه‌های اسکلتی و ۳۰٪ در توده استخوانی ($100-200\text{mg/gr}$) یافت می‌شود. غلظت روی در توده ماهیچه‌ای بدن حدود 30mg/gr می‌باشد.

مقدمة

* صدیقه بربنا، فدیه حق اللہی

بنفسه گلستان، منصورة نوروزی

پریچهر حناجی، مامک شریعت

عبدالفتاح صراف نژاد، شیرین نیرومنش

۱- گروه زنان و زایمان، ۲- کارشناس پژوهش
مرکز تحقیقات بهداشت بازرسی ولیعصر

۳- گروه آمار و ایامونیولوژی دانشکده بهداشت

۴- کارشناس امور دانشجویی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۵- پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا

۶- گروه بهداشت مادر و کودک، مرکز تحقیقات
جنین- مادر- نوزاد، ۷- گروه ایامونیولوژی، ۸-
گروه زنان و زایمان، بیمارستان میرزا کوچک خاچ

دانشگاه علوم پزشکی تهران

* نویسنده مستول: هنaran، بلوار کشاورز، بیمارستان اما
خمنی، بیمارستان ولیعصر، مرکز تحقیقات بهداشت
بازرسی ولیعصر، کد پستی ۱۴۱۹۴ تلفن: ۰۹۳۹۳۲۰

mail: Fedyeh.hagh@yahoo.com

پوستی، ریزش مو، اسهال، خستگی، تأخیر در ترمیم زخم‌ها و کاهش میزان رشد و تکاملی باشد. جهت ارزیابی وضعیت روی بدن، سطح روی سرم، نشانگر مفیدی است، محدوده طبیعی روی سرم در افراد بزرگسال $10/7-15/3$ میکرومول در لیتر ($10\text{--}15\text{ }\mu\text{g/dl}$) است. در دسی‌لیتر ($100\text{--}150\text{ }\mu\text{g/dl}$) می‌باشد.^{۱۲} ولی در چندین مطالعه انجام شده کمبود روی خفیف تا متوسط $50\text{--}85\text{ }\mu\text{g/dl}$ میکرومول در دسی‌لیتر در نظر گرفته شد.^{۱۳}

^{۱۴} با توجه به اهمیت کمبود ریز مغذی‌ها، گروه کترل بیماری‌های غیر واگیر سازمان بهداشت جهانی یکی از اهداف عمدۀ خود را مداخله هم‌زمان برای کاهش کمبود ریز مغذی‌ها قرار داده و برای محدود ساختن کمبود ریز مغذی‌های اصلی (ید، آهن، روی) تا سال ۲۰۱۰ برنامه‌ریزی کرده است.^{۱۵} لذا با توجه به وجود فیتات در رژیم غذایی روزانه ایرانیان و اینکه مکمل‌های آهن به صورت روتین برای خانم‌های حامله حتی بدون وجود آنمی استفاده می‌شود، آهن اضافی با روی به صورت رقابتی عمل کرده و جذب روی را مختل می‌کند.^{۱۶} و مطالعات انجام شده قبلی که بر روی مصرف رژیم غذایی روزانه (۲۴ ساعت گذشته) در $400\text{--}4000\text{ }\mu\text{g/dl}$ خانم حامله انجام شد، وضعیت دریافت روی روزانه از حد مجاز تعیین شده بسیار کمتر بود.^{۱۷} لذا با توجه به این مسئله بر آن شدیم که میزان روی سرم در خون خانم‌های حامله تهران برسی و میزان کمبود روی مشخص گردد و پروتکل درمانی به صورت دریافت مکمل روی روزانه روی و یا تصحیح الگوی غذایی در این افراد استفاده گردد تا عوارض این کمبود کترول و درمان شود. بدین طریق هزینه درمان کاهش می‌یابد. بنابراین پیشگیری و تشخیص زودرس کاهش روی در خانم‌های حامله یک مسئله ضروری می‌باشد.

روش بررسی

در این مطالعه Cross-sectional (مقطعی- توصیفی تحلیلی) 675 خانم حامله سالم (بدون عوارض خاص دوران حاملگی) بررسی شدند. تعداد این خانم‌ها در تریم‌سترهای اول، دوم و سوم به ترتیب 163 ، 228 و 284 مورد بود که در درمانگاه‌های پره ناتال بیمارستان امام خمینی، آرش و میرزا کوچکخان جمع‌آوری شدند. 145 خانم غیرحمله سالم به عنوان گروه کترول (عدم وجود بیماری زمینه‌ای) مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان‌های فوق بودند که پس از توضیح هدف درمانی و اخذ رضایت از نمونه‌ها مصاحبه و پر کردن فرم پرسشنامه، در صورت عدم وجود بیماری‌های زمینه‌ای قبلی

زیاد کادمیوم، وجود فسفات‌ها در غذاهای آماده نیز می‌تواند باعث کاهش روی سرم خون شود.^۱ مواردی که با جذب روی تداخل می‌کنند شامل مصرف رژیم غلات دارای فیتات زیاد، مصرف مکمل آهن یا وجود بیماری‌های معده‌ای - رودهای و مواردی مثل سیگار کشیدن و استرس‌های مزمن ممکن است غلظت روی پلاسمما را تغییر دهد.^۱ در ضمن مطالعات نشان می‌دهد که مصرف $350\text{ }\mu\text{g/dl}$ اسیدفولیک در روز موجب کاهش جذب روی می‌شود.^۲ اهمیت عنصر روی در بارداری به علت نقش آن در سنتز پروتئین و در نتیجه رشد و تکامل مناسب جنین و نوزاد است.^۳ در حاملگی انتقال روی کافی به جنین به غلظت روی سرم مادر بستگی دارد. برخی از مطالعات در انسان و حیوانات نشان می‌دهند که کمبود روی مادر ممکن است سبب اختلال رشد داخل رحمی، ناهنجاری یا مرگ جنین، آنومالی‌های مادرزادی، وزن کم برای سن حاملگی در زمان تولد و زایمان زودرس شود و یا مشکلاتی مانند هیپرتانسیون ناشی از حاملگی، پره اکلامپسی، خونریزی قبل از زایمان، عفونت‌ها و زایمان طولانی برای مادر ایجاد کند.^{۴-۸} همچنین نتیجه یک مطالعه نشان داد نوزادانی که با کمبود روی در خون بدناف متولد می‌شوند در آینده کاهش رشد و تکامل عصبی، حرکتی و افزایش سایر عوارض را نشان می‌دهند.^۹ همچنین بررسی‌های انجام شده در کشورهای مختلف نشان می‌دهند به طور متوسط دریافت روی در حال توسعه $5-11\text{ mg/dl}$ در روز و در کشورهایی مثل آمریکا و اروپا $8-14\text{ mg/dl}$ می‌باشد که با توجه به افزایش نیاز مادر به روی در طی حاملگی (15 mg/dl در روز)، 82 تا 100 mg/dl درصد زنان باردار در سراسر دنیا احتمالاً روی کافی دریافت نمی‌کنند و درصد زیادی از آنها مبتلا به کمبود روی هستند.^{۱۰} مطالعه‌ای در زاهدان برای بررسی شیوع کمبود روی در زنان باردار در سال 1381 شیوع کمبود روی را 49% نشان داد.^{۱۱} مطالعه مشابهی در اصفهان در سال 1380 شیوع کمبود روی را 100% برآورد کرده است.^{۱۲} در سال 1991 Sandstead، ضمن تأکید بر اهمیت روی در سلامت، اعلام کرد که در کشورهایی از جمله ایران، مصر، ترکیه، چین، یوگسلاوی و کانادا به علت مصرف کم گوشتش قرمز و مصرف بالای فیبر علائم کمبود روی بیشتر مشاهده می‌گردد.^{۱۳} علائم شیمیایی همراه کمبود روی، کاهش سطح پلاسمای روی کمتر از $70\text{ }\mu\text{g/dl}$ می‌باشد. علامت بالینی کمبود روی صدمه رسیدن به حس چشایی، عکس العمل ضعیف سیستم ایمنی، مشکلات

کمتر از ۲۰ سال (جوان‌تر بودن) در مادران باردار، تعداد زایمان، فرزند هم کمتر می‌باشد و از نظر آزمون آماری این اختلاف معنی‌دار شده است ($p < 0.001$). با توجه به گروه‌بندی سطح روی سرم در سه گروه (کمبود شدید، خفیف-متوسط و نرمال) (بر اساس منابع^{۱۱}^{۱۲}^{۱۳}) کمبود شدید روی (کمتر از ۶۰ میکروگرم در دسی‌لیتر)، خفیف و متوسط در طیف (۶۰-۷۰ میکروگرم در دسی‌لیتر) و سطح روی ۷۱-۱۵۰ میکروگرم در دسی‌لیتر سطح سرمی نرمال در نظر گرفته شد. در 87% مادران باردار (۵۹ مورد) کمبود روی سرم در حد شدید و در 74% مادران باردار (۵۰ مورد) در حد ۶۰-۷۰ میکروگرم در دسی‌لیتر (کمبود خفیف تا متوسط) مشاهده شد و در مجموع در 567% مادران باردار کمبود روی در 10.9% (۱۰ مورد) و در 83.9% (۹۰ مورد) سطح سرمی نرمال روی گزارش گردید. در زنان غیر باردار کمبود روی سرم وجود نداشت (0%). که از نظر کمبود روی سرم اختلاف آماری معنی‌داری بین زنان باردار و غیر باردار مشاهده گردید ($p < 0.001$). همچنین کمبود روی سرم در سه تریمیستر (سه ماهه بارداری) به ترتیب 12% ، 27% و 40% هفت‌تایی در مادران باردار بررسی گردید که در سه ماهه اول 32% نفر (19.6%)، سه ماهه دوم 40% نفر (17.6%) و در سه ماهه سوم 37% نفر (13%) کمبود روی سرم مشاهده گردید، از نظر آماری ارتباط معنی‌داری بین تریمیستر بارداری و کمبود روی سرم وجود نداشت ($p = 0.14$). نتایج مطالعه نشان داد که میانگین روحی سرم در زنان غیرباردار 14.79 ± 8.51 و در زنان باردار در سه تریمیستر بارداری به ترتیب 11.0 ± 8.51 و 9.1 ± 3.33 دارند ($p < 0.05$).

(معده‌ای- روده‌ای، کبدی) وارد مطالعه شدند و توسط یک پرسشگر کارآزموده و آموزش‌دیده، موارد در پرسشنامه، سوال شده و در آن درج گردید که جهت بررسی روی سرمی از تک‌تک نمونه‌ها $3ml$ خون گرفته شد و سپس نمونه خون جهت تهیه سرم سریعاً به آزمایشگاه بیمارستان فرستاده شد و سرم آن تهیه گردید. سرم‌های تهیه شده در دمای $20^{\circ}C$ - نگهداری شد و پس از ارسال به آزمایشگاه نور با روش اسپکتروفوتومتری (Enzymatic) روی سرمی اندازه‌گیری شد. دقت و حساسیت این روش با روش جذب اتمی در اندازه‌گیری روی سرم برابر می‌کند (99% همخوانی دارد).^{۱۴} شرایط خروج از مطالعه شامل بیماری معده‌ای- روده‌ای، آکرودرماتیت آنتروپاتیکا، بیماری کلیوی، سیگاری بودن، حاملگی بیش از یک قلو، الکلی بودن، اعتیاد به مواد مخدر، افراد دچار سوختگی‌های شدید و پس از عمل جراحی (در طی حاملگی یا مطالعه)، استفاده از قرص‌های ضد بارداری در طی سه ماه گذشته و مصرف مکمل‌های روی بود. اطلاعات در نرم‌افزار SPSS ویراست ۱۱ ثبت شد. در تحلیل داده‌ها از آزمون t و رگرسیون تک‌متغیره لجستیک برای بررسی ارتباط صفات کیفی، آزمون t - مستقل و آنالیز واریانس یک‌طرفه برای مقایسه میانگین صفات کمی بر حسب صفت کیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون چندگانه لجستیک برای بررسی تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر میزان کمبود روی استفاده شد. شاخص نسبت برتری (Odds Ratio) و حدود اطمینان 95% آن در حالت خام و تعدیل شده محاسبه گردید. $p < 0.05$ معنی‌دار تلقی شد.

یافته‌ها

تعداد 675 خانم باردار سالم در سه تریمیستر بارداری بدون عوارض خاص دوران بارداری و تعداد 145 خانم غیرباردار به عنوان گروه کنترل بدون وجود بیماری زمینه‌ای مراجعه‌کننده به درمانگاه پره ناتال و زنان بیمارستان امام خمینی، میرزا کوچک، آرش وارد مطالعه شدند. افراد تحت مطالعه اکثریت تحصیلات دوره دبیرستان و دیپلم داشتند (41.7%). در نمونه‌های بررسی شده دو گروه (زنان باردار و غیر باردار) میانگین BMI، هموگلوبین، هماتوکریت همگن بودند و از نظر آماری اختلاف معنی‌داری نداشتند ولی دو گروه مورد بررسی از نظر متغیرهای سن، تعداد بارداری، تعداد فرزند اختلاف آماری معنی‌داری داشتند ($p < 0.001$). لذا با توجه به توزیع سنی بیشتر،

جدول-۱: مقایسه متغیرهای کمی در دو گروه زنان باردار و غیر باردار

متغیر نمونه‌ها	باردار		غیر باردار	
	p*	میانگین [±]	میانگین [±]	انحراف معیار
سن (سال)	< 0.001	26.9 ± 5.2	33.5 ± 5.6	
تعداد بارداری	0.1	2.15 ± 6.11	3 ± 20.1	
تعداد زایمان	< 0.001	0.764 ± 0.88	2.77 ± 1.69	
سطع	0.81	0.29 ± 0.73	0.3 ± 0.63	
تعداد فرزند	< 0.001	0.55 ± 0.84	2.64 ± 1.64	
هموگلوبین	0.98	12.45 ± 1.39	12.45 ± 1.45	
هماتوکریت	0.91	37.79 ± 8.09	37.71 ± 2.85	
روی سرم (µg/dl)	< 0.001	91.75 ± 25.28	110.85 ± 14.79	
BMI	0.17	25.80 ± 4.51	26.39 ± 5	

* Anova test $p < 0.05$ معنی‌دار است

۱۷٪ در $Hb > 13$ (p<0.003). تاثیر متغیرهای مستقل بر درصد فراوانی کمبود روى، توسط رگرسیون یکمتغیره لجستیک بررسی شد (جدول ۲). نتایج نشان داد که از بین متغیرها، میزان هموگلوبین و سطح تحصیلات رابطه معنی داری با کمبود روى نشان دادند پس در مدل نهایی هموگلوبین و سطح تحصیلات به عنوان متغیرهای مستقلی که بر روی کمبود روى تاثیر دارند وارد مدل می شوند به طوری که زنان بارداری که در $Hb < 12$ داشتند نسبت به افرادی که در گروه نرمال هموگلوبین (۱۲-۱۳ µg/dl) قرار داشتند، ۲/۶۱ برابر بیشتر دچار کمبود روی بودند (Adjusted OR=۲/۶۱ و 95% CI: ۱/۵۲-۴/۵). همچنین

$91/90 \pm 21/42$ میکروگرم در دسی لیتر می باشد که از نظر آماری اختلاف معنی داری در بین دو گروه زنان باردار و غیر باردار مشاهده شد (p<0.001). نتیجه مقایسه چندگانه بین فراوانی اختلاف موجود را عمدتاً بین زنان غیر باردار با زنان باردار در هر یک از تریمستر بارداری نشان داد. در عین حال همبستگی بین سطح روى سرم و سن مادر به طور کلی و به تفکیک سن بارداری معنی دار نشد. آزمون آماری ۷٪ در نشان دادن رابطه هموگلوبین و کمبود روى بیان داشت به طور معنی داری کمبود روى در هموگلوبین کمتر از ۱۲، بیشتر از دو گروه دیگر می باشد. (۰.۲۲٪ در مقابل ۱۰٪ گروه هموگلوبین ۱۲-۱۳ و

جدول ۲: نتایج رگرسیون لجستیک (univariate and multivariate Logistic Regression) در ارتباط با کمبود روى

متغیرها	(n=۵۶۵)				
	کمبود روى (n=۱۰۹)	سطح نرمال روى (n=۵۲۳)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	Unadjusted OR
سن	۱۰۵/۱۶/۷	۵۲۳/۸۳/۳	۱۰۹/۱۰۹	۳۹/۹۲/۹	۲/۶
≥۳۵	۳۳/۷/۱				*1
<۳۵					-
تحصیلات					
بی سواد	۵/۱۲/۸	۳۴/۸۷/۲	۵/۴۴	۰/۶۶۸-۱۰/۴۷۰	۰/۷۸۹-۸/۵۶۹
ابتداي	۱۱/۱۱/۷	۸۳/۸۸/۳	۲/۳۵۴	۰/۷۱۹-۷/۷۱۲	۰/۲۰(۰/۶۵۰-۷/۴۷)
راهنمایي	۳۲/۲۳/۴	۱۰۵/۷۶/۶	۵/۴۷۹	۱/۸۵۸-۱۶/۱۵۶	۰/۱۴(۱/۷۷-۱۵/۴۰)
دبيرستان و دپلم	۵۵/۱۷/۳	۲۶۴/۸۲/۷	۳/۷۴۶	۱/۳۱۴-۱۰/۶۷۶	۰/۶۵۰(۱/۲۷-۱۰/۵۵)
دانشگاهي	۴/۵/۳	۷۲/۹۴/۷	*1	-	-
هموگلوبين					
HB < 12	۲۴/۱۰/۴	۲۰۷/۸۹/۶	۲/۴۷	۱/۴۵-۴/۲۲	۰/۶۱(۱/۵۲-۴/۵)
۱۲ ≤ HB ≤ ۱۳	۴۸/۲۲/۳	۱۶۷/۷۷/۷	-	-	-
HB > 13	۲۹/۱۷/۰	۱۴۱/۸۲/۹	۰/۹۹-۳/۱۷	۰/۹۹-۳/۱۷	۱/۹۳(۱/۰۷-۳/۴۹)
سدهماه					
سدهماهه اول	۳۲/۱۹/۶	۱۳۱/۸۰/۴	*1	-	-
سدهماهه دوم	۴۰/۱۱/۶	۱۸۷/۸۲/۴	۰/۵۲۳-۱/۴۶۷	۰/۸۸۵(۰/۵۰۳-۱/۵۵۸)	۰/۸۸۵(۰/۵۰۳-۱/۵۵۸)
سدهماهه سوم	۳۷/۱۳	۲۴۷/۸۷	۰/۶۱۳	۰/۵۷۱(۰/۳۲۴-۱/۰۰۷)	۰/۵۷۱(۰/۳۲۴-۱/۰۰۷)
صرف آهن در طول بارداری					
بلی	۶۸/۱۴/۷	۳۹۶/۸۵/۳	*1	-	-
خیر	۲۲/۱۵/۹	۱۱۶/۸۴/۱	۰/۶۵۴-۱/۸۶۴	۰/۶۵۴-۱/۸۶۴	۰/۴۹۴-۱/۸۴۰
صرف فولیک اسید در طول بارداری					
بلی	۷۸/۱۵/۱	۴۴۰/۸۴/۹	*1	-	-
خیر	۱۲/۱۴/۵	۲۱/۸۵/۵	۰/۹۵۳	۰/۹۵۳	۰/۴۹۴-۱/۸۴۰
BMI (Kg/m²)					
≤ ۱۹/۹۰	۶/۱۰/۷	۵۰/۸۹/۳	*1	۰/۷۶-۴/۶۷	۰/۷۶-۴/۶۷
۲۰-۲۴/۹۹	۴۵/۱۸/۴	۱۹۹/۸۱/۶	۱/۸۸	۰/۸۴-۳/۹۹	۰/۸۴-۳/۹۹
۲۵-۲۹/۹۹	۴۰/۱۶/۳	۲۰۶/۸۳/۷	۱/۶۰	۰/۴۸-۳/۶۰	۰/۴۸-۳/۶۰
≥ ۳۰	۱۴/۱۳	۹۴/۸۷	۱/۳۲	-	-
تعداد بارداری					
۱	۵۲/۱۶/۸	۲۵۸/۸۳/۲	*1	۰/۶۲-۱/۶۰	۰/۶۲-۱/۶۰
۲	۳۴/۱۶/۸	۱۶۸/۸۳/۲	۰/۹۹	۰/۴۹-۱/۴۲	۰/۴۹-۱/۴۲
≥ ۳	۲۳/۱۴/۳	۱۳۸/۸۵/۷	۰/۸۳	-	-

گروه رفرانس - OR are adjusted for hb , education and trimester. *1 -

گزارش شد.^{۲۴} مطالعه Pathak^{۲۵} شیوع کمبود روی در ۱۵۹ مادر باردار هندی، ۶۴/۶٪ و مطالعه Abebe^{۲۶} کمبود روی در جمعیت زنان اتیوپی گزارش شده است.^{۲۷} در مطالعه De yong N^{۲۸} بر روی ۳۰۵ زن باردار فیلیپینی در هفته ۲۴ و ۳۶ بارداری، ۱۵٪ کمبود روی سرم مشاهده شد.^{۲۹} مطالعه حاضر نیز تا حدی گزارش‌های فوق را در مورد کاهش سطح روی در زنان باردار را در مقایسه با گروه زنان غیر باردار تائید می‌کند ولی نتایج این پژوهش در ارتباط با فراوانی کمتر کمبود روی سرم در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به مطالعات^{۲۶ و ۲۹ و ۳۰} می‌تواند تا حدودی نشان‌دهنده آموزش تغذیه دوران بارداری و تفاوت وضعیت اقتصادی و تغذیه‌ای این افراد باشد چنانچه مطالعه Ayhan O^{۳۱}, نشان داد که در سه تریمستر بارداری، میانگین روی سرم در گروه با تغذیه مناسب برخلاف گروه دیگر تغییرات واضحی نداشت.^{۲۸} لذا به نظر می‌رسد که آموزش‌های تغذیه‌ای ارائه شده در دوران بارداری در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی توانسته تا حد زیادی موثر واقع شود. همچنین مطالعات Ortega Rm و Hambidge^{۳۲} نشان‌دهنده اثر تغذیه در بهبود وضعیت روی سرم می‌باشد لذا مطالعه‌ای دقیق‌تر جهت بررسی ارتباط دریافت مواد غذایی و سطح سرمی روی در مادران باردار مناطق مختلف ایران بایستی انجام گردد. همچنین در این مطالعه ارتباطی بین گروه سنی زنان باردار و کمبود روی سرم ملاحظه نگردید. در مطالعه Ruiz NF G Gabrichidze^{۳۳}, Mram I سطح سرم با سن ارتباط داشت و در زنان باردار ۱۶-۲۰ سال و بالای ۳۰ سال با سطح تحصیلات کمتر و بی‌سواد کمبود روی سرم بیشتر دیده شد.^{۳۴} در مطالعه Martin Lago^{۳۵} ارتباطی بین سن زنان و روی سرم ملاحظه نگردید.^{۳۶} در نتایج پژوهش حاضر نیز با توجه به عدم وجود ارتباط آماری معنی‌دار بین سن و کمبود روی سرم و وجود اکثربیت زنان باردار در گروه کمتر از ۲۰ سال، و همچنین با توجه به کمبود روی بیشتر در مقاطع راهنمایی و متوسطه نسبت به تحصیلات آکادمیک، شاید بتوان به نقش آموزش و الگوی مناسب تغذیه‌ای اشاره نمود. چنانچه در مطالعه Saram^{۳۷} در ایران در نقاط جغرافیایی و گروه‌های اقتصادی- اجتماعی مختلف، نوع تغذیه بر سطح سرمی روی اثرگذار بود.^{۳۸} همچنین در این مطالعه، ارتباط معنی‌داری بین کمبود روی سرم و سن حاملگی مشاهده نشد. اگر چه در سه ماهه اول کمبود روی بیشتر از دو تریمستر دیگر به ترتیب با ۱۹/۶٪ (۳۹)

تحصیلات راهنمایی، متوسطه- دیپلم شناس ابتلا به کمبود روی را در دوران بارداری نسبت به زنان با تحصیلات دانشگاهی می‌افزاید. (به ترتیب تحصیلات در حد راهنمایی: OR=۵/۱۴ و Adjusted OR=۱۵/۴۰- Adjusted OR=۳/۶۵ و ۹۵٪ CI: ۱/۷۷- ۱۰/۰۵٪ CI: ۱/۲۷- ۹۵٪ CI: ۱/۲۷) دیده شد. همچنین چون مصرف آهن و سطح هموگلوبین رابطه تنگاتنگی با هم دارند لذا اثر این دو متغیر به صورت جداگانه در معادله رگرسیون سنجیده شد و نتایج نشان داد که هموگلوبین بدون اثر بخشی از مصرف آهن با کمبود روی در ارتباط می‌باشد و سطح کمبود روی در هموگلوبین کمتر از ۱۲ به وضوح بیشتر می‌باشد OR=۲/۴۱, CI: ۱/۳۶- ۴/۲۶٪ اما کمبود روی ارتباطی با سن مادر، تریمستر بارداری، مصرف آهن، تعداد زایمان، BMI نداشت.

بحث

مطالعات فراوانی در زمینه بررسی کمبود روی سرم و پیش‌آگهی آن در دوران بارداری انجام شده است. در این مطالعات عنصر روی به عنوان یکی از متغیرهای مهم در تغذیه مادر که می‌تواند در دوران بارداری بر رشد و تکامل جنین موثر باشد، مورد بحث قرار گرفته است. این تصور وجود دارد که کمبود متوسط یا شدید روی در مادران می‌تواند اثرات عمیقی روی پیش‌آگهی بارداری، زایمان‌زودرس، اکلام‌پسی، مدت‌زمان بارداری، ناهنجاری‌های رشد داخل‌رحمی داشته باشد.^{۳۸} در این مطالعه که بر روی جمعیت زنان باردار و غیر باردار انجام شده است، اکثربیت نمونه‌های زنان باردار در گروه سنی ۲۰-۳۵ سال و زنان غیر باردار در گروه سنی >۳۵ سال بودند و این تفاوت دور از انتظار نیست چون مادران جوان‌تر باردار بوده و مادران غیر باردار دارای تعداد فرزند بیشتری بوده و میانگین متغیرهای BMI، هموگلوبین، هماتوکریت در دو گروه اختلافی نداشته است. در ۱۶/۱٪ نمونه‌ها کمبود روی سرم (در حد حفيف تا شدید) گزارش گردید. (در حد کمتر از ۷۰ میکروگرم در دسی‌لیتر) و در زنان غیر باردار کمبود روی سرم مشاهده نگردید (٪۰). مطالعه سليمی در زاهدان، شیوع کمبود روی در مادران باردار ۴۹/۱٪ و در مطالعه Shidfar در اسلام‌شهر، ۱۷٪^{۳۹} در مطالعه حبیب‌زاده در اصفهان ۱۰۰٪ شیوع کمبود روی گزارش گردید.^{۴۰} در مطالعات مشابه خارجی، JI Anetor^{۴۱} که بر روی ۴۰ زن باردار و ۲۵ زن غیر باردار نیجریه‌ای انجام شد، شیوع کمبود سطح سرمی روی در ۴٪ زنان غیر باردار و ۲۲/۵٪ زنان باردار

روی مشکل عمدۀ در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. با توجه به کمبود روی سرم در $\text{Hb} < 12$ ، علی‌رغم مصرف آهن در این موارد، در خصوص افرودن مکمل‌های روی در دوران بارداری و میزان آن مطالعات کامل‌تری بایستی انجام گردد. با توجه به اهمیت روی در رشد، بلوغ، آگاهی، ایمنی و غیره لازم است متخصصین علم تغذیه، زنان، اطفال و دیگر گروه‌های مرتبط، در مورد کمبود روی کاملاً توجیه شوند تا بتوانند توصیه‌های لازم را به بیماران خود بنمایند. همچنین انجام مطالعات مشابه در سایر گروه‌ها و مناطق دیگر پیشنهاد می‌گردد که در صورت کمبود این عنصر جهت تغییر در الگوی تغذیه‌ای مردم کشور برنامه‌ریزی مدونی انجام گردد و در خصوص افزودن مکمل‌های روی در دوران بارداری و میزان آن مطالعات کامل‌تری انجام گردد. سپاسگزاری: در اجرای این طرح از امکانات آزمایشگاهی دانشکده زنان و مرکز تحقیقات نور بصیر (آزمایشگاه نور) و بودجه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران استفاده شد. بدین‌وسیله از مسئولان این دانشگاه‌ها و همکاران مرکز تحقیقات بهداشت باوری ولی‌عصر سپاسگزاری می‌گردد. همچنین از پرسنل آزمایشگاه بیمارستان امام‌خمینی و پرسشگران و مستشول درمانگاه بیمارستان‌های امام‌خمینی، آرش و میرزا کوچک‌خان که در اجرای این طرح همکاری داشتند، تقدیر و تشکر می‌شود.

References

- Brown KH, Wuehler SE, Peerson JM. The importance of zinc in human nutrition and estimation of the global prevalence of zinc deficiency. *Food Nutr Bull* 2001; 22: 113-25.
- Tamura T, Goldenberg RL, Johnston KE, DuBard M. Maternal plasma zinc concentrations and pregnancy outcome. *Am J Clin Nutr* 2000; 71: 109-13.
- Report of the joint WHO/FAO expert consultation on diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Bangkok: Thailand, 2002.
- Caulfield LE, Zavaleta N, Shankar AH, Merialdi M. Potential contribution of maternal zinc supplementation during pregnancy to maternal and child survival. *Am J Clin Nutr* 1998; 68(2 Suppl): 499S-508S.
- King JC. Determinants of maternal zinc status during pregnancy. *Am J Clin Nutr* 2000; 71: 1334-43.
- Osendorp SJ, West CE, Black RE; Maternal Zinc Supplementation Study Group. The need for maternal zinc supplementation in developing countries: an unresolved issue. *J Nutr* 2003; 133: 817S-827S.
- Scheplyagina LA. Impact of the mother's zinc deficiency on the woman's and newborn's health status. *J Trace Elem Med Biol* 2005; 19: 29-35.
- Kumru S, Aydin S, Simsek M, Sahin K, Yaman M, Ay G. Comparison of serum copper, zinc, calcium, and magnesium levels in preeclamptic and healthy pregnant women. *Biol Trace Elem Res* 2003; 94: 105-12.
- Gabrichidze G, Kintrajia P, Eristvi Z. Dynamic of zinc containing at physiological pregnancy. *Ann Biomed Res Edu* 2001; 1: 248-50.
- Caulfield LE, Zavaleta N, Shankar AH, Merialdi M. Potential contribution of maternal zinc supplementation during pregnancy to maternal and child survival. *Am J Clin Nutr* 1998; 68(2 Suppl): 499S-508S.
- Salimi S, Yaghmaei M, Joshaghani HR, Mansourian AR. Study of zinc deficiency in pregnant women. *Iranian J Publ Health* 2004; 33: 15-8.
- حبيب زاده علیرضا. بررسی توزیع فراوانی غلظت سرمی در زنان باردار شهستان اصفهان و عوامل مرتبط با آن. اصفهان: پایان نامه دکترای حرفه ای پژوهشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. ۱۳۸۰.
- Prasad AS. Zinc deficiency. *BMJ* 2003; 326: 409-10.
- Al-Timimi DJ, Al-Sharbatti SS, Al-Najjar F. Zinc deficiency among a healthy population in Baghdad, Iraq. *Saudi Med J* 2005; 26: 1777-81.
- Haralambie G. Serum zinc in athletes in training. *Int J Sports Med* 1981; 2: 135-8.
- Nigman PK. Serum zinc and copper levels and Cu: Zn ratio in psoriasis. *Indian J Dermatol Venereol Leprol* 2005; 71: 205-6.
- Alnwick D. Candidate noninfectious disease conditions. *Bull World Health Organ* 1998; 76 Suppl 2: 55-60.
- Gabrichidze G, Kintrajia P, Eristvi Z. Dynamic of zinc containing at physiological pregnancy. *Ann Biomed Res Edu* 2001; 1: 248-50.
- Sohrabvand F, Shariat M, Haghollahi F. Vitamin B supplementation for leg cramps during pregnancy. *Int J Gynaecol Obstet* 2006; 95: 48-9.
- Erel O, Avci S. Semi-automated enzymatic measurement of serum zinc concentration. *Clin Biochem* 2002; 35: 41-7.

مورد)، ۴۰٪ (۳۷ مورد) گزارش گردید. چندین مطالعه انجام شده نشان داد در سه ماهه سوم کاهش روی سرم به دلیل مصرف بیشتر جنین می‌باشد. عدم وجود تعذیه مناسب دوره بارداری می‌تواند تا حدودی مسبب این عامل گردد^{۳۴ و ۳۵} ولی در مطالعه حاضر انجام شده به رغم معنی دار نبودن اختلاف آماری در کاهش روی در سه تریمیستر، در تریمیستر اول نسبت به دو تریمیستر دیگر، کمبود سرمی روی بیشتر مشاهده گردید. بهنظر وجود تهوع و استفراغ تریمیستر اول و تعذیه نامناسب‌تر و عدم مراجعت به موقع جهت آموزش‌های دوران بارداری و همچنین عدم مصرف آهن در این دوره (مصرف روتبین مکمل آهن از ۱۲ هفتگی) و $\text{Hb} < 12$ مطرح می‌شود. زیرا چندین مطالعه نشان‌دهنده ارتباط کاهش Hb و سطح سرمی روی می‌باشد که با مصرف مناسب مکمل آهن و روی، تصحیح می‌شود.^{۴۰} ۳۷ چنانچه در مطالعه حاضر نیز در موارد $\text{Hb} < 12$ ، کمبود روی بیشتر ملاحظه گردید. لذا بهنظر می‌رسد در سطوح پایین هموگلوبین، مصرف مکمل آهن و روی جهت رساندن هموگلوبین به سطح نرمال موثرتر عمل نماید. لذا بهنظر می‌رسد با انجام مطالعات گستره‌تر در کشور و با اندازه‌گیری روی سرم و Hb در صورت نیاز مکمل‌های آهن و روی تجویز شده و با اندازه‌گیری آنها در سه تریمیستر، پیامد بارداری بررسی گردد زیرا کمبود میکرو المان‌ها نظری آهن، سلنیوم و

21. Demir N, Küfrevioglu OI, Keha EE, Bakan E. An enzymatic method for zinc determination in serum. *Biofactors* 1993; 4: 129-32.
22. Enjalbert F, Lebreton P, Salat O. Effects of copper, zinc and selenium status on performance and health in commercial dairy and beef herds: Retrospective study. *J Anim Physiol Anim Nutr (Berl)* 2006; 90: 459-66.
۲۳. شیدفر فرزاد، عامری احمد، کشاورز سیدعلی، چاللی محمود. بررسی تاثیر مصرف قرص آهن بر وضعیت روی سرم در زنان باردار در شهرستان اسلامشهر. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران سال ۴، شماره ۴، صفحات ۲۲۹ تا ۲۵۴؛ ۱۳۸۱.
24. Anetor JI, Adelaja O, Adekunle AO. Serum micronutrient levels, nucleic acid metabolism and antioxidant defences in pregnant Nigerians: implications for fetal and maternal health. *Afr J Med Med Sci* 2003; 32: 257-62.
25. Pathak P, Kapil U, Dwivedi SN, Singh R. Serum zinc levels amongst pregnant women in a rural block of Haryana state, India. *Asia Pac J Clin Nutr* 2008; 17: 276-9.
26. Abebe Y, Bogale A, Hambidge KM, Stoecker BJ, Arbide I, Teshome A, et al. Inadequate intakes of dietary zinc among pregnant women from subsistence households in Sidama, Southern Ethiopia. *Public Health Nutr* 2008; 11: 379-86.
27. de Jong N, Romano AB, Gibson RS. Zinc and iron status during pregnancy of Filipino women. *Asia Pac J Clin Nutr* 2002; 11: 186-93.
28. Cavdar AO, Babacan E, Arcasoy A, Ertem U. Effect of nutrition on serum zinc concentration during pregnancy in Turkish women. *Am J Clin Nutr* 1980; 33: 542-4.
29. Hambidge KM, Abebe Y, Gibson RS, Westcott JE, Miller LV, Lei S, et al. Zinc absorption during late pregnancy in rural southern Ethiopia. *Am J Clin Nutr* 2006; 84: 1102-6.
30. Ortega RM, López-Sobaler AM, Andrés P, Martínez RM, Quintas ME. Supplementation with iron and folates during gestation: influence on the zinc status in the mother and on the zinc content in the maternal milk. *Med Clin (Barc)* 1998; 111: 281-5.
31. Ruiz NF, Meertens L, Peña E, Sánchez A, Solano L. Behavior of serum zinc levels during pregnancy. *Arch Latinoam Nutr* 2005; 55: 235-44.
32. Gabrichidze G, Kintrajia P, Erstavi Z. Dynamics of zinc containing at physiological pregnancy. *Ann Biomed Res Edu* 2001; 1: 248-51.
33. Martín-Lagos F, Navarro-Alarcón M, Terrés-Martos C, López-García de la Serrana H, Pérez-Valero V, López-Martínez MC. Zinc and copper concentrations in serum from Spanish women during pregnancy. *Biol Trace Elem Res* 1998; 61: 61-70.
34. Meram I, Bozkurt AI, Ahi S, Ozgur S. Plasma copper and zinc levels in pregnant women in Gaziantep, Turkey. *Saudi Med J* 2003; 24: 1121-5.
35. Sarram M, Younessi M, Khorvash P, Kfouri GA, Reinhold JG. Zinc nutrition in human pregnancy in Fars Province, Iran. Significance of geographic and socioeconomic factors. *Am J Clin Nutr* 1969; 22: 726-32.
36. Al-Bader A, Hussain T, Al-Mousawi M, Otaibi M, Abul H, Khalifa D, et al. Serum zinc and copper concentrations in pregnant women in Kuwait. *J Trace Elem Exp Med* 1998; 10: 209-15.
37. Awadallah SM, Abu-Elteen KH, Elkarmi AZ, Qaraein SH, Salem NM, Mubarak MS. Maternal and cord blood serum levels of zinc, copper, and iron in healthy pregnant Jordanian women. *J Trace Elem Exp Med* 2004; 17: 1-8.
38. Ma AG, Chen XC, Xu RX, Zheng MC, Wang Y, Li JS. Comparison of serum levels of iron, zinc and copper in anaemic and non-anaemic pregnant women in China. *Asia Pac J Clin Nutr* 2004; 13: 348-52.
39. Mahmoudian A, Khademloo M. The effect of simultaneous administration of zinc sulfate and ferrous sulfate in the treatment of Anemic pregnant women. *J Res Med Sci* 2005; 10: 205-9.
40. Hettiarachchi M, Liyanage C, Wickremasinghe R, Hilmers DC, Abrams SA. The efficacy of micronutrient supplementation in reducing the prevalence of anaemia and deficiencies of zinc and iron among adolescents in Sri Lanka. *Eur J Clin Nutr* 2008; 62: 856-65.

A comparative study of Zinc deficiency prevalence in pregnant and non pregnant women

Abstract

Received: February 08, 2009 Accepted: June 21, 2009

Borna S.¹
Haghollahi F.^{2*}
Golestan B.³
Norouzi M.⁴
Hanachi P.⁵
Shariat M.⁶
Sarafnejad A.⁷
Niroomanesh Sh.⁸

1- Department of Gynecology
2- Research Expert

Vali-e-Asr Reproductive Health
Research Center

3- Department of Biostatistics &
Epidemiology, School of Public
Health

4- Midwife Msc, Student office

Tehran University of Medical
Sciences

5- Women Research Center, Alzahra
University

6- Maternal and child Specialist,
maternal-Fetal- Neonatal Health
Research Center

7- Department of Immunology,
School of Public Health

8- Department of Obstetric &
Gynecology, Mirzakoochakchan
Hospital

Tehran University of Medical
Sciences

Background: Zinc is one of the elements necessary for growth and health in human. Some evidences indicate that zinc deficiency is one of real difficulties for the public health in both developed and developing countries. Since the pregnant women are more at risk of zinc deficiency, the objective of this study was to determine the rate of zinc deficiency in pregnant women in the 3 trimesters and to compare these data with that of the healthy controls.

Methods: This research was an analytic- descriptive study which was done on 677 pregnant women in 3 Trimesters and 140 non pregnant groups who referred to clinic of Tehran University. Blood sample were taken And serum zinc was assessed By Enzymatic technique.

Results: The prevalence of zinc deficiency is 16% in pregnancy and 0% in non pregnant women with a significant difference between two groups ($p<0.001$). Zinc deficiency had no relation to mother's age, gestational age, Iron supplementation, Parity and mothers BMI. Hemoglobin level showed a direct relation to zinc deficiency and was grossly found to be more prevalent in Hb levels less than 12 (CI: 1/36-4/26, OR=2/4).

Conclusion: According to the finding of presented study, zinc deficiency is more prevalent in Hb<12 inspite of iron supplementation. Iron and zinc supplements in pregnancy period seem to be more effective for Hb repair in each case.

Keywords: Zinc deficiency, zinc, pregnancy, Hb gestational age.

* Corresponding author: Vali-e-Asr
Reproductive Health Research Center,
Vali-E-Asr Hospital, Keshavarz Blvd.,
Tehran 14194, IRAN
Tel: +98-21-66939320
email: Fedyeh_hagh@yahoo.com