

اثرات ضد آریتمی آگونیست انتخابی گیرنده‌های A₁ آدنوزینی در دهیز جدا شده خوکچه هندی

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۷/۰۳/۲۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۷/۰۷/۱۳

چکیده

زمینه و هدف: در سیستم قلبی-عروقی، رسپتورهای آدنوزینی دارای نقش عمده‌ای در درمان تاکیکاردی‌های فوق بطنی می‌باشد. این اثرات از طریق تداخل رسپتورهای A₁ آدنوزینی با G_q پروتئین اتفاق می‌افتد. در این مطالعه اثر سیکلوپتیل آدنوزین (آگونیست انتخابی گیرنده‌های A₁ آدنوزینی) بر آریتمی حاصل از اووآبائین در دهیز مجزای خوکچه هندی مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: ابتدا دهیز مجزای خوکچه هندی را که در محلول کربس تغییر یافته قرار داده شده بود، به دستگاه فیزیوگراف وصل و انقباضات آن رسم گردید. سیکلوپتیل آدنوزین به مقدار ۸×۱۰^{-۹} مولار به محلول اضافه و ۱۰ دقیقه بعد اووآبائین با مقادیر آریتموژن (۲ میکرومول) اضافه گردید. یافته‌ها: سیکلوپتیل آدنوزین ۱۰ دقیقه قبل از اووآبائین به محلول حمام اضافه شود، به طور مشخصی باعث افزایش زمان شروع آریتمی ناشی از اووآبائین می‌گردد. سیکلوپتیل آدنوزین به تنهایی اثر آریتموژن نداشت ولی تعداد ضربانات دهیز مجزای خوکچه هندی را به طور وابسته به غلظت کاهش می‌داد ($p < 0.05$). اووآبائین (۲ میکرومول) آریتمی قلبی هفت دقیقه پس از تجویز شروع شد و پس از ۲۲ دقیقه به آسیستول منتهی گردید. مصرف سیکلوپتیل آدنوزین به مقدار ۸×۱۰^{-۹} مولار، ۱۰ دقیقه قبل از اضافه کردن اووآبائین شروع آریتمی از هفت دقیقه به بیش از ۲۷/۵ دقیقه و طول زمان زنش دهیز از ۲۲ دقیقه به بیش از ۶۳ دقیقه افزایش یابد. همچنین از وقوع آسیستول جلوگیری کرد.

نتیجه‌گیری: سیکلوپتیل آدنوزین دارای اثر اینوتروپ و کرونوتروپ قلبی از طریق گیرنده A₁ آدنوزین بوده و این دارو تحت شرایط این مطالعه باعث کاهش سمیت اووآبائین در دهیز مجزای خوکچه هندی می‌گردد.

کلمات کلیدی: ضد آریتمی، آگونیست انتخابی گیرنده A₁ آدنوزین، اووآبائین، دهیز خوکچه هندی.

اعظم بختیاریان*

راضیه بهزادمهر، عباس پوستی
میر جمال حسینی، فرزانه نجار
سیما سبزه خواه

گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

* نویسنده مسئول: گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران، کد پستی: ۷۸۷-۱۳۱۶۳
تلفن: ۰۶۴۰۲۵۶۹
email: bakhtiar@sina.tums.ac.ir

مقدمه

می‌رسد رسپتورهای A₁ آدنوزینی شبیه اغلب افکتورها به عنوان سیستم پیامبر ثانویه عمل می‌کند. این عمل از طریق جفت شدن پروتئین‌های مهاری متصل به گوانین و مهار فعالیت آدنیلات سیکلاز، فعال شدن کانال‌های پتانسیم، غیرفعال شدن کانال‌های کلسیمی صورت می‌گیرد.^۱ آدنوزین برای تبدیل سریع تاکیکاردی بطنی به ریتم سینوسی و آرام کردن بطن در طول فیبریلاسیون دهیزی به عنوان معیاری برای ارزیابی قلب در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر که قادر به انجام ورزش نیستند در نظر گرفته می‌شود.^۲ هدف از مطالعه اخیر نشان دادن اثرات آنتی آریتمیک N₆-سیکلو پتیل آدنوزین N₆-Cyclopentyladenosine (CPA) به عنوان آگونیست A₁ انتخابی در مهار پاسخ‌های آریتمی ایجاد شده به سیله اووآبائین در دهیز جدا شده خوکچه هندی می‌باشد.

آدنوزین Adenosine نوکلتوزید داخلی دارای نقش فیزیولوژیکی همراه با تغییرات وسیع در اثرات فیزیولوژیک می‌باشد که شامل مهار تجمع پلاکتی، مهار آزاد سازی نورترانسミترها، انقباض عروق کلیوی، گشادی عروق مغزی، کاهش ضربانات قلب و دپرسیون نیروی آنقباضی دهیز و بطن می‌باشد.^۱ تاکنون چهار نوع از گیرنده‌های آدنوزینی شناسایی گردیده‌اند: A₁, A_{2A}, A_{2B}, A₃. آگونیست رسپتور-های A₁ آدنوزینی باعث ایجاد تغییراتی در سیستم قلبی-عروقی می‌شوند: طولانی کردن هدایت در گره دهیزی-بطنی، کاهش تعداد ضربانات قلبی (اثرات کرونوتروپ منفی)، اثرات اینوتروپ منفی (به واسطه فعال شدن جریان خروج پتانسیم و هیپرپلاریزاسیون) و کاهش عمل تحریکی کاتکول آمین‌ها (اثرات آنتی آدرنرژیک).^{۳-۸} به نظر

صفاف و شفاف و بدون هر گونه کدورت و ذرات معلق به دست آید. محلول‌ها در روز آزمایش تهیه می‌شوند که با اکسیژن کافی قبلاً در تماس بوده‌اند (PH محلول برابر با $7/5$ است). معمولاً هر دهیز برای یک دارو مورد آزمایش قرار می‌گرفت.^{۱۰} داروهای مورد آزمایش که در این آزمایش به کار رفته‌ند شامل سیکلو پتیل آدنوزین و اووابائین بود. سیکلو-پتیل آدنوزین با نسبت $50:50$ در آب دیونیزه-پلی اتیلن گلیکول حل گردید. محلول مادر $0/001$ مولار از آن ساخته شد در داخل فویل آلومینیومی قرار داده شد. این دارو از شرکت سیگما خریداری شد. اووابائین نیز از شرکت سیگما خریداری شد. تهیه محلول با استفاده از آب دیونیزه و PH مجاور $7/3\pm0/1$ صورت گرفت. دهیزها به چهار گروه تقسیم شدند: گروه ۱- شش دهیز با محلول بدون N6- سیکلو پتیل آدنوزین برای یک دوره 20 دقیقه‌ای تیمار گشتند. گروه ۲- بیست و چهار دهیز برای یک دوره 30 دقیقه‌ای مورد آزمایش قرار گرفتند. N6- سیکلو پتیل آدنوزین در دوزهای مختلف ($16-8-4-2$ نانومول) به حمام اضافه گشت. برای هر دهیز فقط یک دوز از آدنوزین به کار رفت. گروه ۳- شش دهیز با اووابائین $1/2$ میکرومول به تنهایی برای یک دوره 30 دقیقه‌ای تیمار گشتند. گروه ۴- شش دهیز ابتدا با CPA (هشت نانومول) برای 10 دقیقه تیمار گشتند سپس اووابائین در غلظت سمی $1/2$ میکرومول به حمام در حضور CPA اضافه گشت. یافته‌ها با جمع‌آوری داده‌ها تجزیه و تحلیل و اطلاعات وارد رایانه شد. نتایج در هر گروه به صورت میانگین \pm انحراف معیار به ازای هر شش عدد دهیز keules می‌باشد. برای آنالیز آماری از ANOVA به همراه آزمون Student-Newman استفاده گردید تا برآورد قابل تشخیصی از نتایج به دست آید. مقادیر $p<0/001$ معنی‌دار بود.

یافته‌ها

هیچ تفاوت معنی‌داری در تعداد و قدرت انقباضی در دهیزهای ایزوله شده خوکچه هندی در گروه Sham در مقایسه با گروه کترول مشاهده نگردید. بنابراین پلی اتیلن گلیکول که برای حل کردن سیکلو پتیل آدنوزین (محلول استوک) به کار می‌رود فاقد هرگونه تاثیری در تعداد و قدرت انقباضی دهیز می‌باشد. N6- سیکلو پتیل آدنوزین در غلظت $2-16$ (نانومول) باعث کاهش معنی‌داری در تعداد و قدرت انقباضی گشت. (۴۸-۲۲٪ کاهش در تعداد انقباضات و ۵۱-۳۴٪ کاهش در

روش بررسی

این یک مطالعه بنیادی می‌باشد که در سال ۱۳۸۶ در گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران طبق دستورالعمل کمیته اخلاق در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است. در این مطالعه از خوکچه هندی با وزن $250-300$ گرم استفاده به عمل آمد. بیهوشی توسط اتر انجام گرفت. سپس قفسه صدری شکافته شده، قلب خارج و به محلول کربس تغییر یافته اکسیژن انتقال یافت. بالاصله Apex قلب باز شده و پس از حصول اطمینان از خروج خون و لخته‌ها از حفرات قلب، دهیزها را با دقت کامل از عدم آسیب به گره‌ها، جدا نموده و با عبور دادن نخ از انتهای دهیزهای چپ و راست به طور جداگانه با واسطه نخ به پایه شیشه‌ای درون حمام بافتی و ترانسdiyosir دستگاه فیزیوگراف متصل نمودیم. دهیزها در حمام مخصوص اکسیژن در دمای 37°C و تحت کشش $0/5$ گرم به مدت 20 دقیقه در محلول کربس تغییر یافته باقی ماندند تا شرایط ثابت شود. سپس با این روش دو پارامتر نیروی انقباضی و تعداد ضربانات دهیز را در دقایق مختلف، قبل و در حضور دارو سیکلوپتیل آدنوزین که از شرکت سیگما در کشور آمریکا خریداری گردید با دوزهای مختلف توسط فیزیوگراف ضربانات ثبت و اندازه‌گیری شدند. ثبت انقباضات با استفاده از دستگاه پلی‌گراف گراس مدل C79 صورت گرفت. با اطلاعات به دست آمده، منحنی دوز-پاسخ (سیکلوپتیل آدنوزین) رسم شد. در گروه شاهد اووابائین به تنهایی به حمام اضافه می‌گردد. در مرحله دوم آزمایش، ابتدا دوزهای مناسب دارو (سیکلوپتیل آدنوزین) داخل حمام تزریق و پس از 10 دقیقه اووابائین به حمام اضافه می‌شود و نتایج حاصله از نظر زمان شروع تغییرات در تعداد ضربانات قلب و نیروی انقباضی، زمان شروع آریتمی و مدت زمان ایجاد بلوک قلبی در حضور اووابائین به تنهایی و با اووابائین در حضور N6- سیکلو پتیل آدنوزین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ترکیب محلول کربس اصلاح شده برای یک لیتر آب مقطر دیونیزه به قرار زیر است:

$\text{MgCl}_2 (0/244\text{gr})$, $\text{CaCl}_2 (0/375\text{gr})$, $\text{NaCl} (7\text{gr})$, $\text{EDTA NaHCO}_3 (2\text{gr})$, $\text{glucose} (2/2\text{gr})$, $\text{Na}_2\text{HPO}_4 (0/1348\text{gr})$, $\text{ascorbic acid} (0/011\text{gr})$, مواد فوق به طور جداگانه مجموعاً در یک لیتر آب مقطر دو بار تقطیر حل می‌شوند تا محلولی

صورت گرفته است به ویژه ایجاد یکسری تغییرات در موقعیت N6 به طور موققت آمیزی آگونیست‌های پایدارتری ایجاد کرده است.^{۱۱} یکی از این تغییرات که به خوبی تحمل می‌شود قرارگیری گروه سیکلوبیتیل روی N6 است که تمایل آگونیست به رسپتور A₁ اختصاصی تر و بیشتر می‌شود و از طرفی در برابر تجزیه توسط آدنوزین دامیناز مقاومتر می‌شود.^{۱۲ و ۱۳} در آزمایشات ما N6- سیکلوبیتیل آدنوزین توانست یک کاهش وابسته به دوز در تعداد و قدرت انقباضی دهیز را نشان دهد ($p < 0.001$). آدنوزین دارای اثرات محافظت کننده قلبی در شرایط ایسکمیک است.^{۱۴} در سیستم قلبی- عروقی، رسپتورهای آدنوزینی دارای نقش عمده‌ای در درمان تاکیکاردی‌های فوق بطنی، کاهش یا خاتمه دادن به ریتم‌های قلبی غیر نرمال می‌باشد.^{۱۵} آدنوزین باعث فعالسازی انواع کانال‌های پتاسیمی و مهار کانال‌های کلسیمی می‌شود.^{۱۶} این اثرات از طریق تداخل رسپتورهای A₁ آدنوزینی با G پروتئین در گره سینوسی- دهیزی (برادیکاردی)، گره دهیزی- بطنی (کاهش قدرت انقباضی)، دهیز (کاهش تحریکات قلبی) اتفاق می‌افتد. رسپتورهای A₁ آدنوزینی به طور غیر مستقیم باعث کاهش جریان کلسیمی در گره دهیزی- بطنی می‌شود که در خاتمه دادن تاکیکاری‌های فوق بطنی موثر است.^{۱۷} این گزارشات می‌تواند در توجیه نتایج ما کمک کننده باشد بدین صورت که CPA دارای اثرات قلبی مستقیم از طریق مهار کانال‌های کلسیمی و هیپرپلا- ریزاسیون غشای سلول‌های دهیزی در دهیز قلب می‌باشد.^{۱۸} این اثرات CPA در مهار آریتمی ایجاد شده به وسیله اووآبائین به‌نظر می‌رسد از طریق مهار کانال‌های یونی صورت می‌گیرد. گلیکوزیدهای قلبی از طریق مهار پمپ سدیم- پتاسیم عمل می‌کنند و بنابراین باعث افزایش سدیم خارج‌سلولی و افزایش ورود کلسیم به داخل می‌ویست- های قلبی می‌شود. سمبیت دیزیتالین به‌نظر می‌رسد از طریق افزایش انتشار کلسیم به سلول‌های قلبی می‌باشد. اثرات درمانی و سمی دیزیتالین به‌نظر می‌رسد از طریق جابه‌جاوی یون کلسیم باشد.^{۱۹ و ۲۰} CPA از طریق مهار کانال‌های کلسیمی از آریتمی ایجاد شده ناشی از اووآبائین جلوگیری می‌نماید. نتایج ما پیشنهاد می‌دهد که CPA به عنوان یک آگونیست رسپتورهای A₁ آدنوزینی با تغییرات یونی از آریتمی ایجاد شده ناشی از اووآبائین جلوگیری می‌کند. با توجه به مثبت بودن و حصول نتایج مورد نظر مبنی بر توانایی سیکلوبیتیل آدنوزین در جلوگیری از آریتمی‌های قلبی، این دارو می‌تواند به عنوان یک داروی



قدرت انقباضات). این کاهش در تعداد و قدرت انقباضی یک الگوی معنی‌دار وابسته به دوز را در دهیز مجزای خوکچه هندی نشان داد. (نمودار ۱). اووآبائین در غلظت ۱/۲ میکرو مول در عرض هفت دقیقه ایجاد آریتمی نمود و در مدت ۲۲ دقیقه آسیستولی داد. پیش تیمار دهیز با N6- سیکلوبیتیل آدنوزین در غلظت هشت نانومول باعث افزایش معنی‌داری در زمان شروع آریتمی (۲۷/۵ دقیقه) و شروع آسیستولی (۶۳ دقیقه) گردید ($p < 0.001$).

بحث

بسیاری از انواع آریتمی‌های قلبی، از مواردی هستند که نیاز به درمان سریع و مؤثر دارند و بعضاً از اورژانس‌های قلبی محسوب می‌شوند. این آریتمی‌ها در صورت عدم درمان به میزان زیادی مرگ و میر خواهد داشت. آریتمی‌های قلبی در بسیاری از بیماری‌های قلبی- عروقی و نیز مسمومیت با بعضی داروها نظیر اووآبائین و اووآبائین می‌توانند ایجاد شوند. به دلیل متفاوت بودن مکانیسم‌های ایجاد آریتمی، داروهای مختلفی نیز برای کنترل آنها نیاز است. در حال حاضر، داروهای موجود برای آریتمی‌های خاص اندک می‌باشند و علاوه بر این بعضی از آنها بالقوه خطرناک بوده و ممکن است منجر به آریتمی قلبی، فیبروز ریوی، تضعیف شدید عملکرد قلبی- عروقی و عوارض دیگری بشوند. بنابراین، دستیابی به داروهای جدیدی که مؤثرتر و کم خطرتر باشد، همچنان در اولویت‌های تحقیقات فارماکولوژی قرار دارد. تلاش زیادی در مورد سنتز آگونیست‌هایی با طول عمر بیشتر

و آناتاگونیست‌های این کانال مورد بررسی قرار گیرد. سپاسگزاری: نویسنده‌گان مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران که پشتیبان مالی طرح تحقیقاتی به شماره ۳۸۴۰ بودند قدردانی می‌نماید.

References

- ضد آریتمی در درمان مسمومیت‌های ناشی از گلیکوزیدهای قلبی به کار رود. با توجه به تاثیری که آدنوزین بر کانال‌های پتانسیمی دارد توصیه می‌گردد که در تحقیقات‌آتی نقش این کانال‌ها توسط آگونیست‌ها
- Felsch A, Felsch A, Stöcker K, Borchard U. Adenosine A1 and A2 receptor agonists alter cardiac functions and prostacyclin release in the isolated guinea-pig heart. *Eur J Pharmacol* 1994; 263: 261-8.
 - Fredholm BB, IJzerman AP, Jacobson KA, Klotz KN, Linden J. International Union of Pharmacology. XXV. Nomenclature and classification of adenosine receptors. *Pharmacol Rev* 2001; 53: 527-52.
 - Hutchinson SA, Scammells PJ. A1 adenosine receptor agonists: medicinal chemistry and therapeutic potential. *Curr Pharm Des* 2004; 10: 2021-39.
 - Wang D, Belardinelli L. Mechanism of the negative inotropic effect of adenosine in guinea pig atrial myocytes. *Am J Physiol* 1994; 267: H2420-9.
 - García Navarro M, Brugger Auban A, Díaz Moncada F, Pastelin Hernández G. Role of adenosine in the digitalis action on atrioventricular conduction in the dog heart. *Arch Inst Cardiol Mex* 1992; 62: 409-14.
 - Nadeau R. Use and mechanism of action of digitalis glycosides as anti arrhythmic drugs. *Acta Cardiol* 1977; 922: 97-105.
 - Suto F, Habuchi Y, Yamamoto T, Tanaka H, Hamaoka K. Increased sensitivity of neonate atrial myocytes to adenosine A1 receptor stimulation in regulation of the L-type Ca²⁺ current. *Eur J Pharmacol* 2000; 409: 213-21.
 - Oguchi T, Furukawa Y, Sawaki S, Kasama M, Chiba S. Are negative chronotropic and inotropic responses to adenosine differentiated at the receptor or postreceptor levels in isolated dog hearts? *J Pharmacol Exp Ther* 1995; 272: 838-44.
 - Shryock JC, Belardinelli L. Adenosine and adenosine receptors in the cardiovascular system: biochemistry, physiology, and pharmacology. *Am J Cardiol* 1997; 79: 2-10.
 - Pousti A, Deemyad T, Malihî G, Broumand K. Involvement of adenosine in the effect of fluoxetine on isolated guinea-pig atria. *Pharmacol Res* 2006; 53: 44-8.
 - Kaiser SM, Quinn RJ. Adenosine receptors as potential therapeutic targets. *Drug Discov Today* 1999; 4: 542-551.
 - Banner GM. Pharmacology. 1st ed. Philadelphia: WB Saunders; 2000.
 - پوستی عباس. اثرات قلبی و عروقی آدنوزین. ماهنامه دارویی رازی ۱۳۷۷، سال ۶، شماره ۷، صفحات ۷ تا ۱۷.
 - Jacobson KA, van Galen PJ, Williams M. Adenosine receptors: pharmacology, structure-activity relationships, and therapeutic potential. *J Med Chem* 1992; 35: 407-22.
 - Clark KL, Merkel L. Potential of adenosine receptor agonists for the prevention and treatment of coronary artery diseases and acute myocardial infarction. *Emerging Drugs* 2000; 5: 89-108.
 - Higa S, Tai CT, Lin YJ, Liu TY, Lee PC, Huang JL, Yuniali Y, Huang BH, Hsieh MH, Lee SH, Kuo JY, Lee KT, Chen SA. Mechanism of adenosine-induced termination of focal atrial tachycardia. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2004; 15: 1387-93.
 - Tripathi KD. Essential of medical pharmacology. 5th ed. New delhi: paypee prathers; 2003. p.183.
 - Katzung BG. Basic and clinical pharmacology. 9th ed. New York: Appleton & Lang; 2004. p. 201-16.

The antiarrhythmic effect of A1-selective adenosine agonist in isolated guinea pig atria

Bakhtiarian A.*
Behzadmehr R.
Pousti A.
Hosseini M J.
Najar F.
Sabzeh-Khah S.

Department of Pharmacology

Tehran University of Medical Sciences

Abstract

Received: June 10, 2008 Accepted: October 04, 2008

Background: Adenosine receptors play an important role in the treatment of paroxysmal supraventricular tachycardia in cardiovascular system. This effect is through interaction with A1 type of G-protein-coupled adenosine receptors. The effect of N6-cyclopentyladenosine (CPA), an A1-selective adenosine agonist, was studied on ouabain-induced toxicity in spontaneously beating isolated guinea pig atria.

Methods: The isolated guinea pig atria were mounted on the organ bath containing modified krebs and contractile responses in the four groups (sham, CPA, ouabain, CPA-ouabain) were measured.

Results: CPA significantly increased the time of onset of arrhythmia (toxicity) induced by ouabain ($1.2\mu M$) when it was administered 10 min before ouabain was added in organ bath. CPA (2-16nM) produced a dose-dependent decrease in the force of contractions (34%-51%) and in the rate of contractions (22%-48%). Ouabain ($1.2\mu M$) alone produced arrhythmia at 7 min and either asystole or standstill at 22 min. CPA alone did not produce any arrhythmogenic effect but CPA (8nM) increased the time required to produce arrhythmia to 27.5 min and prolonged beating atria to more than 63 min and prevented the occurrence of asystole.

Conclusion: CPA produces direct cardiac action, probably due the inhibition of cardiac Ca^{2+} channel and membrane hyperpolarization of atrium cells in guinea pig atria. Moreover, our results suggest that CPA may reduce the membrane conduction through inhibition of ionic channels, which decrease ouabain- induced toxicity.

Keywords: Antiarrhythmic, A1-selective adenosine agonist, ouabain, guinea pig atria.

* Corresponding author: Dept. of Pharmacology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IRAN
Tel: +98-21-66402569
email: bakhtiar@sina.tums.ac.ir