

میزان پاسخ‌دهی تخمدان به تحریک تخمک‌گذاری در سیکل IVF متعاقب سیستکتومی لاپاراسکوپیک اندومتریومای تخمدان

چکیده

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۱۲/۲۱

زمینه و هدف: اندومتریومای تخمدانی یکی از بیماری‌های زنان در سنین باروری است. اثرات سیستکتومی در باروری این بیماران مورد بحث است. در این مطالعه، ما به بررسی اثر جراحی سیستکتومی لاپاراسکوپیک اندومتریومای تخمدانی از نظر پاسخ به تحریک تخمک‌گذاری در مقایسه با تخمدان مقابل پرداختیم.

رووش بررسی: در این مطالعه مورد-شاهدی، ۳۰ بیمار مبتلا به اندومتریومای که طرفه تخمدان که سابقه جراحی سیستکتومی لاپاراسکوپیک به روش Stripping داشتند، از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱ در بیمارستان زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت تحریک تخمک‌گذاری در سیکل In Vitro Fertilization (IVF) قرار گرفتند. سپس تخمدان سیستکتومی شده با تخمدان مقابل از نظر تعداد فولیکول‌های تولید شده مقایسه شد.

یافته‌ها: میانگین سنی بیماران (۳۲ ± ۳ /۴) سال بود. میانگین اندازه کیست اندومتریومای جراحی شده (۴۲ ± ۱۰ /۲) میلی‌متر بود. میانگین تعداد فولیکول‌ها در تخمدان‌های جراحی شده ($۲/۵\pm۱/۲$) با دامنه (۱-۵) بود و در تخمدان‌های کنترل میانگین تعداد فولیکول‌ها ($۳/۹\pm۱/۴$) با دامنه (۱-۶) بود. آزمون آماری نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین تعداد فولیکول‌ها در تخمدان‌های جراحی شده در مقایسه با تخمدان‌های جراحی نشده، وجود داشت به طوری که کاهش معنی‌دار در ذخیره تخمدانی و تولید فولیکول‌ها در تخمدان‌های جراحی شده مشاهده شد ($۶/۰$ - $۲/۰$ الی).

(P<0.001). CI/۹۵

نتیجه‌گیری: سیستکتومی لاپاراسکوپیک اندومتریومای باعث کاهش پاسخ تخمدان به تحریک تخمک‌گذاری در سیکل IVF می‌شود. این کاهش پاسخ تخمدان ارتباط معنی‌داری با سن، شاخص توده بدنی، اندازه و محل کیست و فاصله زمانی از جراحی تخمدان نداشت.

کلمات کلیدی: اندومتریومای، لاپاراسکوپی، تخمک‌گذاری، تحریک تخمک‌گذاری.

* نسرین مقدمی تبریزی^۱، خدیجه ادبی^۲
** عذرآ آزموده^۱، سپیده نکوئی^۳
*** بابک دبیر اشرافی^۳، کامیار دبیر اشرافی^۳
**** بتول قربانی یکتا^۴

۱- گروه جراحی زنان و زایمان، گروه نازایی و IVF بیمارستان جامع زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

۲- گروه جراحی زنان و زایمان، بیمارستان جامع زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

۳- دانشجویی پزشکی، بیمارستان جامع زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

۴- مرکز تحقیقات پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

* نویسنده مسئول: تهران، خیابان کریم‌خان، خیابان استاد نجات‌اللهی شمالی، بیمارستان جامع زنان
** تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۰۰۰۰۲
E-mail: Khadabi88@gmail.com

مقدمه

اندومتریومای تخمدان قرار می‌گیرد.^{۱-۳} وجود اندومتریومای باعث آسیب به بافت تخمدان مجاور خود می‌شود. میزان پایین تخمک‌گذاری خودبه‌خودی و پاسخ ضعیفتر به تحریک تخمک‌گذاری در تخمدانی که دارای اندومتریومای می‌باشد و سیستکتومی نشده است، گزارش شده است.^{۴-۶} از سوی دیگر مدارکی دال بر آسیب عمل جراحی سیستکتومی بر پاسخ به تحریک تخمک‌گذاری در تخمدان وجود دارد.^{۷-۸} مکانیسم بالقوه آسیب عمل

جراحی نقش اساسی در درمان اندومتریومای دارد. علی‌رغم نگرانی‌ها در مورد اثر جراحی در کاهش ذخیره تخمدان، نتایج جراحی در بهبود درد و افزایش میزان بارداری، درمان اندومتریومای را به سوی جراحی سوق داده است.^۱ شواهد فراوان روزافزون نشان دهنده که ذخیره تخمدانی تحت تأثیر عمل جراحی خارج کردن

روش بررسی

در یک مطالعه مورد- شاهدی،^{۳۰} بیمار واحد معیارهای ورود که از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱ در بیمارستان زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران کاندید IVF بودند، وارد مطالعه شدند. این مطالعه توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران تایید شد.

معیارهای ورود شامل موارد زیر بود:

- ۱- سابقه عمل جراحی سیستکتومی لپاراسکوپیک یک کیست اندومنتريومای یک طرفه تخدمان به روش Stripping که پاتولوژی مبنی بر اندومنتريوما موجود باشد.
- ۲- بیماران کاندید قرار گرفتن در سیکل IVF بوده و در زمان انجام تحریک تخمک گذاری سن بیمار زیر ۴۰ سال باشد.
- ۳- به ازای هر بیمار فقط یک سیکل IVF (آخرین سیکل IVF) وارد مطالعه شد. بیمارانی که قبل از عمل جراحی سابقه سیکل داشتند از مطالعه حذف نشدند.

بیمارانی که جراحی قبلی تخدمان داشتند و یا شرح عمل لپاراسکوپی به طور دقیق موجود نبود، از مطالعه حذف شدند. بیماران بدون توجه به فاصله زمانی بین سیکل تحریک تخمک گذاری و عمل جراحی سیستکتومی لپاراسکوپیک انتخاب شدند.

اطلاعات مربوط به تکنیک عمل جراحی، اندازه و پاتولوژی کیست تخدمان از پرونده بیماران استخراج گردید. رضایت‌نامه از تمامی بیماران گرفته شد. فاکتورهای سرمی LH, FSH, E2 روز سوم Human Chorionic Gonadotropin (hCG) و استراديول روز تزریق (Estradiol) به انتخاب اندازه‌گیری و ثبت شد.

رژیم دارویی جهت تحریک تخمک گذاری با استفاده از روش GnRH agonist (Suprefact, Long protocol با ۱mg روزانه Aventis, Frankfurt, Germany) شروع در فاز لوتال قبلی وادامه با GnRH agonist ۰/۵mg (Gonal-f, Merck Serono S.A., Geneva, Switzerland) شد.

میانگین دوز FSH استفاده شده IU (۳۲۰۷-۵۸۵۰) (۱۵۰۰) بود. دوز FSH بر اساس سن بیمار، تست‌های هورمونی، مشخصات سونوگرافیک تخدمان‌ها و نتایج دوره‌های قبلی تحریک

جراحی، برداشتن مقداری از بافت سالم تخدمان هنگام سیستکتومی، التهاب موضعی به دنبال عمل جراحی یا آسیب عروقی به علت استفاده از منعقدکننده‌های عروقی الکتریکی می‌باشد.^{۱۰-۲۶} صرف نظر از مکانیسم این آسیب، شدت آسیب تخدمانی نیز مهم می‌باشد.


بررسی ذخیره تخدمان با استفاده از فاکتورهای سرمی Follicle Stimulating Hormone (FSH) Estradiol (E2), Inhibin Luteinizing Hormone (LH) و آنتی‌مولرین هورمون و یا با بررسی سونوگرافی (ارزیابی حجم تخدمان، شمارش فولیکول آنترال و جریان خون استرومای تخدمان صورت می‌گیرد) انجام می‌شود، ولی بررسی تخمک گذاری می‌تواند بهترین و مناسب‌ترین روش بررسی ذخیره تخدمانی باشد.^{۱۱-۱۳} مطالعات در مواردی که سیستکتومی یک طرفه اندومنتريوما انجام شده است نشان‌گر کاهش رشد فولیکولی در تخدمان جراحی شده نسبت به سمت مقابل بوده‌اند.^{۱۰} اهمیت بالینی این مساله در درمان اندومنتريومای تخدمان همراه با نازایی هنوز جای بحث می‌باشد. متانالیزهای اخیر کاهش پاسخ‌دهی تخدمان به تحریک تخمک گذاری به دنبال عمل جراحی سیستکتومی را تایید کرده‌اند.^۳ اندومنتريومای تخدمان در (۷۲-۸۰٪) موارد یک طرفه می‌باشد که تخدمان سالم سمت مقابل نقص عملکرد تخدمان مبتلا را جبران می‌کند.^{۱۴}

لذا اهمیت بالینی آسیب تخدمانی مربوط به اندومنتريوما در موارد دو طرفه مشخص‌تر می‌گردد. مطالعاتی که در زمینه پیامد In Vitro Fertilization (IVF) در موارد سیستکتومی دو طرفه اندومنتريومای تخدمان انجام شده است، کاهش واضح میزان بارداری را نشان می‌دهند.^{۱۵} هم‌چنین مواردی از نارسایی تخدمان در سیستکتومی دو طرفه اندومنتريوما بالا فاصله بعد از عمل جراحی گزارش شده است.^{۱۶-۱۸} فراوانی این عارضه و خیم ۲/۴٪ می‌باشد.^{۱۷}

در مقابل گزارشاتی مبنی بر تشابه میزان تولید فولیکول پس از تحریک تخمک گذاری با گنادوتروفین در تخدمان‌هایی که تحت سیستکتومی قرار گرفته‌اند در مقایسه با تخدمان‌های سالم موجود می‌باشد.^{۱۹}

در این مطالعه مورد شاهدی، پاسخ تخدمان به تحریک تخمک گذاری در سیکل IVF در تخدمانی که تحت عمل جراحی سیستکتومی لپاراسکوپیک قرار گرفته با تخدمان مقابل مقایسه شده است.

میانگین تعداد فولیکول‌ها $2/5 \pm 1/2$ با دامنه $(1-5)$ بود و در گروه کنترل میانگین تعداد فولیکول‌ها $3/9 \pm 1/4$ با دامنه $(1-6)$ بود. بین تعداد فولیکول‌ها در سمت جراحی شده با تعداد فولیکول‌های تخدان جراحی نشده اختلاف معنی‌دار وجود داشته، به طوری که کاهش معنی‌داری در ذخیره تخدانی و تولید فولیکول‌ها مشاهده شد. مورد سایز، محل کیست اندومتریوما، فاصله زمانی از جراحی تخدان، سن و شاخص توده بدنی بیماران با میزان پاسخ‌دهی



نمودار ۱: مقایسه فراوانی در گروه کنترل با گروه سیستکتومی شده (خطای استاندارد \pm میانگین)

تخمک‌گذاری تنظیم گردید. در تمام بیماران رشد فولیکولی تخدان‌ها با استفاده از سونوگرافی واژینال سریال توسط نویسنده سوم مقاله، کنترل شد و هنگامی که یک یا دو فولیکول بزرگ‌تر از 18 میلی‌متر مشاهده شد، تخمک‌گذاری با استفاده از 10000 IU HCG (Pregnyl®, N.V. Organon, Oss, The Netherlands) روز تجویز hCG مشخصات دقیق هر دو تخدان، تعداد و قطر فولیکول‌های بزرگ‌تر از 10 میلی‌متر ثبت شد. این اطلاعات در مورد هر کدام از تخدان‌ها به طور جداگانه اندازه‌گیری گردید. قطر فولیکول‌ها بر اساس میانگین سه قطر اندازه‌گیری شده محاسبه شد. اگر بعد از تجویز hCG هیچ فولیکولی با متوسط قطر 10 میلی‌متر مشاهده نشد، تخدان به شدت آسیب دیده در نظر گرفته شد.

آنالیز آماری اطلاعات با استفاده از SPSS ویراست 16 انجام شد. مقایسه میانگین متغیرهای کمی بین دو گروه با کمک Student's t-test و با ضریب اطمینان 95% و $\alpha=0.05$ معنی‌دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

مشخصات کلی توصیفی به‌طور خلاصه در جدول ۱ آمده است. در 30 بیمار مورد مطالعه، 30 تخدان در گروه کنترل و 30 تخدان در گروه سیستکتومی شده قرار گرفتند. در گروه سیستکتومی شده

جدول ۱: متغیرهای مورد بررسی در بیماران مورد مطالعه

متغیر	تعداد	حداقل	حداکثر	میانگین	انحراف معیار
سن (سال)	۳۰	۲۶	۳۸	۲۲/۳	۲/۴۶
شاخص توده بدنی (kg/m^2)	۳۰	۱۹/۹۲	۳۰/۳۶	۲۶/۸۱	۲/۴۷
زمان نازایی (سال)	۳۰	۱	۱۴	۵/۳۸	۴/۰۱
قطر کیست (میلی‌متر)	۳۰	۳۰	۷۰	۴۳/۴۲	۱۰/۲
زمای سپری شده از جراحی تخدان (سال)	۳۰	۰/۵	۱۲	۲/۷۳	۲/۶۵
استرادیول روز سوم (پیکوگرم/میلی‌لیتر)	۳۰	۱۳/۵	۱۱۳	۳۵/۴۶	۲۸/۴۷
میزان LH روز سوم (واحد/میلی‌لیتر)	۳۰	۰/۶	۱۵/۱	۴/۷۱	۴/۷۸
میزان FSH روز سوم (واحد/میلی‌لیتر)	۳۰	۲/۴	۹	۵/۹	۲/۶
میزان استرادیول روز تزریق HCG (پیکوگرم/میلی‌لیتر)	۳۰	۵۸۹	۳۵۱۶	۱۶۲۰/۶	۸۲۴/۷۴
مدت زمان تحریک (روز)	۳۰	۸	۱۵	۱۰/۴	۲/۰۲
میزان FSH مصرفی (IU)	۳۰	۱۵۰۰	۵۸۵۰	۳۲۰۷/۵	۱۱۰۲/۵

IVF قرار گرفتند رشد فولیکولی را با سونوگرافی مانیتورینگ کرد. تعداد فولیکول در تخدمان جراحی شده ($3/4 \pm 2/4$) نسبت به تخدمان مقابله ($5/7 \pm 3/0$) به طور معنی دار کاهش یافته بود. در ۱۲ تخدمان عمل شده رشد فولیکولی مشاهده نشد در حالی که در تخدمان مقابله در همه موارد فولیکولها رشد کردند. وی شیوع آسیب شدید به تخدمان را 13% گزارش کرد.^{۱۳} از طرفی عوارض لپاراسکوپی در یک متانالیز $1/4 - 7/5$ درصد گزارش شده است و با احتساب این که اندومتریوما معمولاً همراه با چسبندگی است این عوارض نیز بیشتر است.^{۱۴}

در مورد برداشتن کیست اندومتریوما در خانم های نابارور قبل از شروع تحریک تخدمک گذاری اختلاف نظر وجود دارد. در متانالیزی که بر روی زنان مبتلا به اندومتریومای تحت IVF انجام شد،^{۲۰} مطالعه بررسی شدند که در پنج مطالعه درمان جراحی با درمان انتظاری مقایسه شده بود. میزان حاملگی کلینیکی بین دو گروه درمان شده و درمان نشده تفاوتی نداشت.^{۲۱}

افزایش قابل انتظار میزان بارداری پس از اولین جراحی اندومتریوما بر اساس مطالعه مروری Vercellini^{۲۲} بین ۱۰ تا ۲۵ درصد بود. البته مشخص کردن فواید خارج کردن کیست اندومتریوما به علت فاکتورهای مخدوش کننده مطالعه دشوار است.^{۲۳} صرف نظر از نوع روش جراحی میزان حاملگی بعد از جراحی لپاراسکوپی 15% الی 67% درصد گزارش شده بود. میزان حاملگی در مطالعه ما 20% بود که با این اعداد قابل مقایسه است.^{۲۴}

Almong در سال 2010 در مطالعه ای دیگر روی 38 خانم (80 سیکل) که به دلیل کیست اندومتریومای یک طرفه با اندازه $2-5/8\text{cm}$ توسط یک جراح از طریق سیستکتومی لپاراسکوپیک شده بودند، پاسخ به تحریک با گنادوتروپین را در تخدمان جراحی شده با تخدمان سالم مقایسه کرد. تعداد فولیکولهای آنترال و تخدمک های به دست آمده در تخدمان جراحی شده بسیار کمتر از تخدمان سالم بود $4/5$ در مقایسه با $(7/4 < 0/05)$. در $18/75\%$ از تخدمان های جراحی شده هیچ تخدمکی به دست نیامد.^{۲۵}

در مطالعه ای دیگر در خانم های دچار اندومتریومای یک طرفه که تحت اولین IVF قرار گرفته بودند، تعداد فولیکولهای آنترال و تخدمک های به دست آمده در تخدمان مبتلا به اندومتریوما و تخدمان سالم تفاوتی نداشتند. در این مطالعه ارتباطی بین اندازه کیست

تخدمان سیستکتومی شده و تخدمان مقابله به تحریک تخدمک گذاری مشاهده نشد. سیستکتومی راست یا چپ با کاهش پاسخ دهی تخدمان به تحریک تخدمک گذاری در سیکل IVF رابطه ای نداشت.

بحث

در این مطالعه، آسیب به تخدمان به دنبال عمل جراحی سیستکتومی لپاراسکوپیک یک طرفه اندومتریوما توسط پاسخ تخدمان به تحریک تخدمک گذاری در سیکل IVF مورد بررسی قرار گرفت. ما مشاهده نمودیم که در مقایسه با تخدمان گروه کنترل، تعداد فولیکولهای تولید شده در تخدمان سیستکتومی شده نسبت به طرف مقابله به طور معنی داری کمتر بود و ذخیره تخدمان گروه کنترل، تعداد سیستکتومی لپاراسکوپیک نسبت به تخدمان سالم کمتر بود. در توافق با نتایج مشاهده های ما مطالعه های دیگری با ارزیابی های مختلف وجود دارند که بیان می کنند پاسخ تخدمان به داروهای محرك تخدمک گذاری پس از جراحی کیست اندومتریوما کاهش می یابد اگرچه بعضی از مطالعات چنین ارتباطی را گزارش نکرده اند.^{۱۶-۱۹}

کاهش پاسخ تخدمان به تحریک تخدمک گذاری پس از جراحی کیست تخدمان نه تنها ناشی از برداشتن بافت طبیعی تخدمان است، بلکه ایسکمی ناشی از به کار بردن الکتروکوثر و التهاب موضعی سبب آسیب به تخدمان می شوند. در مطالعه ای که توسط Kuroda منتشر شد در بررسی های پاتولوژیک نمونه های سیستکتومی تخدمان، میزان بافت سالم برداشته شده در کیست اندومتریوما به طور معنی داری بیشتر از کیست های غیر اندومتریومی بود.^{۲۰}

هم راستا با این مشاهدات، Chang با اندازه گیری هورمون آنتی مولرین قبل و بعد از سیستکتومی نشان داد که سطح هورمون آنتی مولرین سه ماه پس از جراحی به 65% قبل از جراحی می رسد، بنابراین ذخیره تخدمانی پس از سیستکتومی کاهش می یابد.^{۲۱} در سال Alborzi 2007 در 70 سیکل پاسخ تخدمان به تحریک تخدمک گذاری پس از جراحی سیستکتومی لپاراسکوپیک اندومتریومای یک طرفه انجام دادند و تفاوت معنی داری در تخدمان سیستکتومی شده نسبت به طرف مقابله مشاهده نکردند.^{۱۹} Benaglia در سال 2010 در 93 خانم که به دلیل اندومتریومای یک طرفه جراحی شده بودند و تحت

روش لیزر ابیشن انجام دادند. Shimizo در سال ۲۰۱۰ مطالعه بر روی ۲۱ بیمار به روش لیزر ابیشن انجام داد و تفاوت معنی دار مشاهده نشد.^{۲۰}

ما هیچ مورد از آسیب شدید تخدمان مشاهده نکردیم. در مطالعه Benagila^{۲۱} میزان ۱۳٪ آسیب مشاهده شده بود. مقایسه هر بیمار با خودش باعث حذف گروه زیادی از عوامل متغیر مخدوش کننده می شود که به نوعی می تواند در دقت و صحت نتایج مشاهده شده تأثیر داشته باشد. نکته ای دیگر که باستی به آن توجه نمود تأثیر سن، توده بدنی، ژنتیک و سایر متغیرهای تاثیرگذار در این ارتباط است، اما در تحقیق حاضر، به دلیل ماهیت طراحی مطالعه که بر یک بیمار فولیکول های سمت جراحی شده و نشده مورب بررسی قرار گرفته است، این اثرات حذف شده و دقت گزارش بیشتر گردید، زیرا در هر بیمار تمام متغیرهای موثر بر نتیجه به علت مقایسه در همان بیمار مشابه می باشد.

سیستکتومی لاپاروسکوپیک اندومنتریوما باعث کاهش پاسخ تخدمان به تحریک تخدمک گذاری در سیکل IVF می شود. این کاهش پاسخ تخدمان ارتباط معنی داری با سن، شاخص توده بدنی، اندازه و محل کیست و فاصله زمانی از جراحی تخدمان نداشت. سپاسگزاری: این مقاله حاصل پایان نامه تحت عنوان "مطالعه آسیب به تخدمان به دنبال عمل جراحی سیستکتومی لاپاروسکوپیک یک طرفه اندومنتریوما با بررسی پاسخ تخدمان به تحریک تخدمک گذاری در سیکل IVF" از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱ در بیمارستان زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقطع دکترای تخصصی در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۱۳ و کد ۸۹۸ می باشد که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اجرا شده است.

اندومنتریوما تا ۵cm و تعداد کل تخدمک های به دست آمده وجود نداشت. نویسنده این مقاله اظهار داشتند که درمان با IVF بدون خارج کردن کیست اندومنتریومای تخدمان به دو دلیل انجام شود: ۱- خارج کردن کیست اندومنتریوما به تخدمان آسیب می رساند، ۲- تعداد تخدمک های به دست آمده در حضور و عدم حضور اندومنتریوما یکسان است. Takashi^{۲۲} میزان تخدمک گذاری را در سیکل های طبیعی در ۲۸ بیمار با اندومنتریومای یک طرفه قبل و پس از سیستکتومی بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ مقایسه کرد. اندازه کیست اندومنتریوما ۲/۵-۶/۵cm بود. میزان تخدمک گذاری پس از جراحی به خصوص در اندومنتریومای زیر ۴cm کمتر از قبل از جراحی بود (۱۶/۹٪ در مقایسه با ۴/۳۴٪) اما در اندومنتریومای ۴cm و بیشتر تغییری در میزان تخدمک گذاری وجود نداشت زیرا رشد فولیکول ها قبل تر توسط اندومنتریوما تخریب شده بود. بنابراین در اندومنتریومای ۴cm و بیشتر جراحی را پیشنهاد کرد.^{۲۳}

از نقاط قوت مطالعه ما حذف زنان با عود آندومتریوز بود. در مطالعه Benagila^{۲۴} میزان عود ۴۶٪ و در مطالعه Guo^{۲۵} ۴۰-۵۰٪ گزارش شد. این موارد می توانند به خطأ در گزارش نتایج منجر شود. بیمارانی که دارای جراحی قبلی بودند می توانند پاسخ ضعیف تری به درمان نشان دهند. آن ها نیز از مطالعه حذف شدند. ما هیچ ارتباطی بین سایز کیست و تعداد فولیکول ها در پاسخ به IVF مشاهده نکردیم.

مطالعه بر روی ذخیره تخدمان به دنبال عمل جراحی به روش های غیر از سیستکتومی لاپاروسکوپیک اندومنتریوما نیز انجام شده است. Alborzi^{۲۶} به روش سوراخ کردن جدار کیست و کواگولیشن و Duru^{۲۷} سیستکتومی لاپاراتومیک و Shimizo^{۲۸} به

References

- Jadoul P, Kitajima M, Donnez O, Squifflet J, Donnez J. Surgical treatment of ovarian endometriomas: state of the art? *Fertil Steril* 2012;98(3):556-63.
- Garcia-Velasco JA, Somigliana E. Management of endometriomas in women requiring IVF: to touch or not to touch. *Hum Reprod* 2009;24(3):496-501.
- Tsoumpou I, Kyrgiou M, Gelbaya TA, Nardo LG. The effect of surgical treatment for endometrioma on in vitro fertilization outcomes: a systematic review and meta-analysis. *Fertil Steril* 2009;92(1):75-87.
- Somigliana E, Infantino M, Benedetti F, Arnoldi M, Calanna G, Ragni G. The presence of ovarian endometriomas is associated with a reduced responsiveness to gonadotropins. *Fertil Steril* 2006;86(1):192-6.
- Benaglia L, Somigliana E, Vercellini P, Abbiati A, Ragni G, Fedele L. Endometriotic ovarian cysts negatively affect the rate of spontaneous ovulation. *Hum Reprod* 2009;24(9):2183-6.
- Ragni G, Somigliana E, Benedetti F, Paffoni A, Vegetti W, Restelli L, et al. Damage to ovarian reserve associated with laparoscopic excision of endometriomas: a quantitative rather than a qualitative injury. *Am J Obstet Gynecol* 2005;193(6):1908-14.

7. Somigliana E, Ragni G, Benedetti F, Borroni R, Vegetti W, Crosignani PG. Does laparoscopic excision of endometriotic ovarian cysts significantly affect ovarian reserve? Insights from IVF cycles. *Hum Reprod* 2003;18(11):2450-3.
8. Chang HJ, Han SH, Lee JR, Jee BC, Lee BI, Suh CS, et al. Impact of laparoscopic cystectomy on ovarian reserve: serial changes of serum anti-Müllerian hormone levels. *Fertil Steril* 2010;94(1):343-9.
9. Loh FH, Tan AT, Kumar J, Ng SC. Ovarian response after laparoscopic ovarian cystectomy for endometriotic cysts in 132 monitored cycles. *Fertil Steril* 1999;72(2):316-21.
10. Ho HY, Lee RK, Hwu YM, Lin MH, Su JT, Tsai YC. Poor response of ovaries with endometrioma previously treated with cystectomy to controlled ovarian hyperstimulation. *J Assist Reprod Genet* 2002;19(11):507-11.
11. Pados G, Tsolakidis D, Assimakopoulos E, Athanatos D, Tarlatzis B. Sonographic changes after laparoscopic cystectomy compared with three-stage management in patients with ovarian endometriomas: a prospective randomized study. *Hum Reprod* 2010;25(3):672-7.
12. Somigliana E, Berlanda N, Benaglia L, Viganò P, Vercellini P, Fedele L. Surgical excision of endometriomas and ovarian reserve: a systematic review on serum antimüllerian hormone level modifications. *Fertil Steril* 2012;98(6):1531-8.
13. Somigliana E, Vercellini P, Viganò P, Ragni G, Crosignani PG. Should endometriomas be treated before IVF-ICSI cycles? *Hum Reprod Update* 2006;12(1):57-64.
14. Benaglia L, Somigliana E, Vighi V, Ragni G, Vercellini P, Fedele L. Rate of severe ovarian damage following surgery for endometriomas. *Hum Reprod* 2010;25(3):678-82.
15. Esinler I, Bozdag G, Aybar F, Bayar U, Yarali H. Outcome of in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection after laparoscopic cystectomy for endometriomas. *Fertil Steril* 2006;85(6):1730-5.
16. Somigliana E, Arnoldi M, Benaglia L, Iemmello R, Nicolosi AE, Ragni G. IVF-ICSI outcome in women operated on for bilateral endometriomas. *Hum Reprod* 2008;23(7):1526-30.
17. Hirokawa W, Iwase A, Goto M, Takikawa S, Nagatomo Y, Nakahara T, et al. The post-operative decline in serum anti-Müllerian hormone correlates with the bilaterality and severity of endometriosis. *Hum Reprod* 2011;26(4):904-10.
18. Celik HG, Dogan E, Okyay E, Ulukus C, Saatli B, Uysal S, et al. Effect of laparoscopic excision of endometriomas on ovarian reserve: serial changes in the serum antimüllerian hormone levels. *Fertil Steril* 2012;97(6):1472-8.
19. Alborzi S, Ravanbakhsh R, Parsanezhad ME, Alborzi M, Alborzi S, Dehbashi S. A comparison of follicular response of ovaries to ovulation induction after laparoscopic ovarian cystectomy or fenestration and coagulation versus normal ovaries in patients with endometrioma. *Fertil Steril* 2007;88(2):507-9.
20. Kuroda M, Kuroda K, Arakawa A, Fukumura Y, Kitade M, Kikuchi I, et al. Histological assessment of impact of ovarian endometrioma and laparoscopic cystectomy on ovarian reserve. *J Obstet Gynaecol Res* 2012;38(9):1187-93.
21. Chapron C, Fauconnier A, Goffinet F, Bréart G, Dubuisson JB. Laparoscopic surgery is not inherently dangerous for patients presenting with benign gynaecologic pathology. Results of a meta-analysis. *Hum Reprod* 2002;17(5):1334-42.
22. Tsoumpou I, Kyrgiou M, Gelbaya TA, Nardo LG. The effect of surgical treatment for endometrioma on in vitro fertilization outcomes: a systematic review and meta-analysis. *Fertil Steril* 2009;92(1):75-87.
23. Vercellini P, Somigliana E, Viganò P, Abbiati A, Barbara G, Crosignani PG. Surgery for endometriosis-associated infertility: a pragmatic approach. *Hum Reprod* 2009;24(2):254-69.
24. Somigliana E, Vercellini P, Viganò P, Ragni G, Crosignani PG. Should endometriomas be treated before IVF-ICSI cycles? *Hum Reprod Update* 2006;12(1):57-64.
25. Almog B, Sheizaf B, Shalom-Paz E, Shehata F, Al-Talib A, Tulandi T. Effects of excision of ovarian endometrioma on the antral follicle count and collected oocytes for in vitro fertilization. *Fertil Steril* 2010;94(6):2340-2.
26. Almog B, Shehata F, Sheizaf B, Tan SL, Tulandi T. Effects of ovarian endometrioma on the number of oocytes retrieved for in vitro fertilization. *Fertil Steril* 2011;95(2):525-7.
27. Horikawa T, Nakagawa K, Ohgi S, Kojima R, Nakashima A, Ito M, et al. The frequency of ovulation from the affected ovary decreases following laparoscopic cystectomy in infertile women with unilateral endometrioma during a natural cycle. *J Assist Reprod Genet* 2008;25(6):239-44.
28. Guo SW. Recurrence of endometriosis and its control. *Hum Reprod Update* 2009;15(4):441-61.
29. Duru NK, Dede M, Acikel CH, Keskin U, Fidan U, Baser I. Outcome of in vitro fertilization and ovarian response after endometrioma stripping at laparoscopy and laparotomy. *J Reprod Med* 2007;52(9):805-9.
30. Shimizu Y, Takashima A, Takahashi K, Kita N, Fujiwara M, Murakami T. Long-term outcome, including pregnancy rate, recurrence rate and ovarian reserve, after laparoscopic laser ablation surgery in infertile women with endometrioma. *J Obstet Gynaecol Res* 2010;36(1):115-8.

Ovarian response during IVF cycle following laparoscopic cystectomy of ovarian endometrioma

Nasrin Moghadami Tabrizi
M.D.¹
Khadijeh Adabi M.D.^{2*}
Azra Azmoodeh M.D.¹
Sepideh Nekuei³
Babak Dabirashrafi³
Kamyar Dabirashrafi³
Batool Ghorbani Yekta Ph.D.⁴

1- *Obstetrics and Gynecology, Fellowship of Laparoscopy and Infertility, Women Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.*

2- *Department of Obstetrics and Gynecology, Women Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.*

3- *Medical Student, Women Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.*

4- *Medical Sciences Research Center, Islamic Azad University, Medical Branch, Tehran, Iran.*

Abstract

Received: January 30, 2013 Accepted: March 11, 2013

Background: Endometrioma of ovary is one of the common diseases during reproductive age and the effect of laparoscopic cystectomy of endometrioma on infertility is still matter of debate. We designed this case control study to evaluate the ovarian response to controlled ovarian hyperstimulation during IVF (In vitro fertilization) cycle following laparoscopic unilateral cystectomy of endometrioma.

Methods: In a case control study, we enrolled 30 women with history of unilateral laparoscopic cystectomy of ovarian endometrioma in stripping method who underwent IVF cycle in women Hospital, 2009-2012. The numbers of follicles in response to controlled ovarian hyperstimulation during IVF cycle in the ovary with history of unilateral laparoscopic cystectomy of endometrioma were compared with those from the contralateral ovary.

Results: The mean age ($\pm SD$) of patients was 32.3 (± 3.4). The mean ($\pm SD$) diameter of excised ovarian endometrioma was 42.4 (± 10.4) mm. Interval since ovarian surgery to induction ovulation was 2.7 (± 2.6) years. Mean number of follicles in the ovary with history of unilateral laparoscopic cystectomy of endometrioma was 2.5 (± 1.2) with the range of 1 to 5 and in the control ovary 3.9 (± 1.4) with the range of 1 to 6. There was significant difference in the number of follicles in the ovary with laparoscopic cystectomy of endometrioma compared with opposite one ($P < 0.001$).

Conclusion: Laparoscopic cystectomy for unilateral endometrioma is associated with a reduced ovarian response to controlled ovarian hyperstimulation during IVF cycle. We did not find any statistically significant difference in reduced ovarian response with regard to patients age, body mass index, size and location of the cyst, and time duration since ovarian cystectomy.

Keywords: Endometrioma, fertilization in vitro, laparoscopy, ovulation.

* Corresponding author: Women Hospital, Karim Khan Ave., Ostad Nejatollahi Ave., Tehran, Iran.
Tel: +98-21-88900002
E-mail: Khadabi88@gmail.com