

## اثرات سیتو توکسیک و القاء آپوپتوزیس بعضی از مشتقات جدید ترکیبات کرومین بر رشد رده‌های سلول سرطان انسانی در حالت *in vitro*

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۸/۰۲/۱۹ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۰۳/۳۱

### چکیده

زمینه و هدف: ترکیبات کرومین با زنجیره شیمیائی ۴-Aryl-4H-chromenes، گروهی از ترکیبات طبیعی هستند که خواص ضد توموری شدیدی در بافت‌های مبتلا به تومور از خود نشان می‌دهند. بر اساس گزارشات این ترکیبات از طریق جلوگیری از تشکیل توبولین در هنگام تقسیم سلولی باعث توقف تکثیر سلول‌ها می‌گردند. در این مطالعه اثرات سیتو توکسیسیته سلولی و اثر القاء آپوپتوز (ایجاد مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی) مشتقاتی از این ترکیبات که در آزمایشگاه سنتز شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است. روش بررسی: اثر سیتو توکسیسیته سلولی مشتقات سنتز شده ترکیبات کرومین با استفاده از رده‌های سلولی تومور انسانی شامل MCF-7 (کارسینومای پستان)، A549 (کارسینومای ریه)، HEPG-2 (کارسینومای کبد)، SW-480 (کارسینومای کولون)، 1321N1 (آستر و سیتوما)، U87-MG (گلیوبلاستوما) و DAOY (مدولوبلاستوما) و با به کارگیری روش assay MTT مورد ارزیابی قرار گرفت. در این روش جهت کنترل و مقایسه از داروی ضد سرطان etoposide استفاده شد. اثر القاء آپوپتوز این مشتقات با روش رنگ‌آمیزی DNA (DAPI staining) مورد سنجش قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج این بررسی نشان داد که مشتقات سنتز شده‌ای که دارای گروه شیمیائی فنیل-ایزو اکسال یا حاوی گروه متوكسی در زنجیره شیمیائی خود می‌باشند، اثر سیتو توکسیسیته سلولی و اثر القاء آپوپتوزیس قابل مقایسه و یا حتی بیشتری در مقایسه با داروی etoposide از خود نشان می‌دهند. نتیجه گیری: جایه‌جایی گروه شیمیائی تری متوكسی فنیل (3,4,5-trimethoxyphenyl) (۳) با گروه شیمیائی تیازول در مشتقات کرومین سنتز شده باعث کاهش اثر سیتو توکسیسیته ترکیب کرومین می‌گردد در حالی که مشتق سنتز شده‌ای که حاوی گروه شیمیائی فنیل-ایزو اکسال باشد اثر سیتو توکسیسیته و اثر القاء آپوپتوزیس شدیدتری دارد.

کلمات کلیدی: مشتقات - آریل کرومین، سیتو توکسیسیته سلولی، القاء آپوپتوزیس

مجید محمودی،<sup>۱,۲\*</sup> سعید رجبعلیان،<sup>۱</sup>  
علیرضا فرمودی،<sup>۳</sup> سعید حیدری کشل،<sup>۴</sup>  
ملیحه سادات صفوی،<sup>۵</sup> احمد خوش  
زبان،<sup>۶</sup> کورس دیوسالار،<sup>۱</sup> محمدعلی  
حقیقی<sup>۷</sup>

- مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
- مرکز تحقیقات سرطان
- مرکز تحقیقات علوم دارویی
- مرکز تحقیقات بانک فراورده‌های پیوندی ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

\*نویسنده مسئول، تهران، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، انتهای بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، کد پستی ۱۴۱۷۷، تلفن: ۰۶۱۹۲۵۰۶؛ email: dmahmoodi@razi.tums.ac.ir

### مقدمه

شده و حذف می‌گردد.<sup>۱,۲</sup> هر گونه اشتباه در این پروسه باعث به وجود آمدن حالت‌های پاتولوژیک می‌شود. از جمله انحراف از مسیر آپوپتوز باعث گسترش تومور و متاستاز شده و القاء آپوپتوز باعث ایجاد بیماری‌های تحلیل اعصاب مثل الایمیر می‌گردد.<sup>۳,۴</sup> دوروش مهم آپوپتوز شناخته شده است، اتصال محرك مرگ سلولی به ریپتورهایی نظیر TNF $\alpha$  در سطح سلول‌ها باعث آپوپتوز از طریق مسیر خارجی می‌شود. از طرفی دیگر عوامل شیمی درمانی، استرس‌های ژنتوتوكسیک و سایر عوامل محرك مرگ سلولی موجب آغاز آپوپتوز از طریق یک مسیر داخلی یا میتوکندری می‌گردد.<sup>۵</sup> داروهای شیمی درمانی که هدف‌شان از یک جهت جلوگیری از تکثیر

آپوپتوز (Apoptosis) یا مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی یک پروسه تنظیم شده نرمال خودکشی سلولی است که موجود زنده را قادر می‌سازد تا تعداد سلول‌های خود را حفظ کرده و سلول‌های ناخواسته را که بقاء موجود را تهدید می‌کند حذف نماید. تعادل درست بین آپوپتوز و مهار آپوپتوز در حفظ هموستاز بافت و مورفوژنز اندام نقش مهم دارد.<sup>۶,۷</sup> در طی انجام آپوپتوز تغییرات بیوشیمیایی و سیتو لوژیکی خاصی در سلول اتفاق می‌افتد که شامل متراکم‌سازی نوکلئوپلاسم و سیتوپلاسم، قطعه قطعه شدن DNA و تشکیل اجسام آپوپتوزی متصل به غشا می‌باشد که توسط سلول‌های مجاور شناخته

## روش بررسی

این مطالعه به صورت یک بررسی تجربی در آزمایشگاه مرکز تحقیقات بانک فرآورده‌های پیوندی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. مطالعه مزبور به مدت ۱۱ ماه از اردیبهشت ماه لغایت اسفند ماه ۱۳۸۶ به طول انجامید.

(الف) رده‌های سلولی و کشت سلول: رده‌های سلولی و کشت سلول: رده‌های سلولی به کار برده شده در این مطالعه جهت ارزیابی اثرات سیتو توکسیسیته مشتقات فوق به ترتیب شامل بود: MCF-7 (Human lung cell line), A549 (Human breast tumor cell line), Human epidermoid (human U87-MG), رده سلولی (nasopharyngeal cell line) liver carcinoma cell (HEPG-2), رده سلولی (colon adenocarcinoma cell line) SW-480, رده سلولی (astrocytoma cell line) Daoy و رده سلولی (glial cell line) 1321NI که همگی از بانک سلولی ایران (NCBI) خریداری شدند. سلول‌ها در محیط کشت DMEM دارای ۱۰٪ سرم جنین گاوی و ۱۰۰ میکروگرم در میلی‌لیتر استرپتومایسین و ۱۰۰ واحد در میلی‌لیتر پنی‌سیلین کشت و پاساز داده می‌شدند. جهت جدا نمودن سلول‌ها از کف فلاسک از محلول تریپسین-EDTA استفاده شد. شمارش سلول با هموسایوتومتر انجام شد. در تمامی آزمون‌ها ابتدا درصد سلولهای زنده با رنگ تریپان بلو تعیین گردید که همواره بالای ۹۵٪ بود.

(ب) ارزیابی سیتو توکسیسیته سلولی مشتقات کروم: جهت سنجش اثر سیتو توکسیسیته سلولی مشتقات کروم از روش MTT assay استفاده شد.<sup>۱۵</sup> ابتدا ترکیبات کروم در حلال DMSO حل شده و تا زمان مصرف نگهداری شدند. غلظت نهایی DMSO در محیط کشت در تمامی آزمون‌ها کمتر از ۰/۱ درصد بود. در این مطالعه از کشت‌های سلولی در فاز رشد و تکثیر استفاده شد. ابتدا صد میکرولیتر از سوسپانسیون سلولی معادل پنج هزار سلول در محیط کشت کامل به چاهک‌های پلیت‌های ۹۶ حفره‌ای ریخته شد. سپس ۵۰ میکرولیتر محیط کشت کامل حاوی رقت‌های لگاریتمی هر یک از مشتقات (۰/۳ تا ۳۰۰ میکرولیتر در میلی‌لیتر) به چاهک‌ها اضافه گردید. بدین ترتیب رقت نهایی بین ۰/۱ تا ۱۰۰ میکرولیتر در میلی‌لیتر تنظیم گردید. هر رقت مشتقات دارویی در سه چاهک

بی‌رویه سلول‌ها در بافت‌های مشخصی از اندام‌های بدن می‌باشد و از طرفی القاء آپوپتوز در سلول‌های توموری است، از کاندیداهای مهم در درمان سرطان محسوب می‌شوند. داروهای شیمی درمانی نظر vinblastine و paclitaxel در هنگام تکثیر سلولی هدف آنها است، از داروهای مفید و موفق ضد سرطان می‌باشند.<sup>۸</sup> یک عامل تثبیت کننده میکروتوبول microtubule stabilizing agent است که به میکروتوبول کامل چسبیده و از دیلیمریزاسیون زیر واحدهای توبولین جلوگیری می‌کند. Vinblastine با اتصال به منورهای توبولین مانع پلیمریزاسیون آنها به صورت میکروتوبول می‌شود.<sup>۷</sup> پیدایش سلول‌های توموری مقاوم به این داروها و همچنین سمیت نورولوژیک وابسته به دوز آنها اگرچه استفاده از داروهای موثر بر توبولین را محدود کرده است، ولی با در نظر گرفتن اینکه جلوگیری از تشكیل توبولین از طریق اتصال ترکیبات دارویی به کلشی‌سین، که روی مونومرهای غیر پلیمریزه  $\alpha/\beta$  توبولین قرار دارد، امکان‌پذیر می‌باشد، از این‌رو داروهای جدیدتری معرفی می‌شوند که به طریق فوق عمل نموده و در نهایت مانع تشکیل توبولین خواهند شد.<sup>۹</sup> علاوه بر این، اخیراً چندین مهارکننده توبولین معرفی شده‌اند که رگ‌های سلول‌های توموری را از طریق تاثیر بر سلول‌های اندوتیال تخریب می‌کنند که در نهایت مانع تغذیه سلول‌های توموری می‌گردد. از جمله این داروها، پیش داروهای amide (AVE- 8062) Combretastatin A-4 Phosphate (CA4P) هستند که در فاز بالینی می‌باشند. هر دو این داروها پلیمریزاسیون توبولین را با متصل شدن به محل اتصال کلشی‌سین مهار می‌کنند، به علاوه این داروها به عنوان عوامل جلوگیری کننده در تشكیل رگ‌های خونی در میان سلول‌های توموری شناخته شده‌اند.<sup>۹-۱۱</sup> کروم‌ها ترکیبات ساده‌ای هستند که به گروه بزرگی از مولکول‌ها به نام مشتقات بنزو پیران و کروم-۴-اون، که ترکیبات طبیعی هستند، تعلق دارند. این ترکیبات و مشتقات وابسته به آنها خواص بیولوژیک متنوعی دارند که شامل خواص آنتی‌توموری، اثر ضد لیشمایی و اثر ضد باکتریایی می‌باشند. این اثرات موجب شده که این ترکیبات جهت مشتق‌سازی و غربالگری به عنوان عوامل جدید درمانی مورد توجه قرار گیرند.<sup>۱۲-۱۴</sup> این مطالعه اثر سیتو توکسیسیته مشتقاتی از ترکیبات کروم که در آزمایشگاه شیمی داروئی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران سنتز شده‌اند را مورد بررسی قرار می‌دهد.

تخلیه کامل پارافورمالدئید و شستشو با PBS، لایه سلولی با محلول یک میکروگرم در میلی لیتر ترکیب فلورسانس DAPI به مدت پنج دقیقه پوشانده شد. پس از تخلیه کامل DAPI و شستشو با آب مقطر، لایه سلولی بهوسیله میکروسکوب فلورسانس بررسی و عکس برداری شد. سلول‌های آپوپتوز شده با مورفولوژی هسته چروکیده، قطعه قطعه شده و با شدت فلورسانس بالا در مجموع صد هسته سلولی شمارش شد و به عنوان درصد سلول‌های آپوپتوز شده گزارش شد.

## یافته‌ها

نام شیمیائی هر یک از مشتقات کرومین ستز شده عبارت بود از:

Compound (7a): 2-amino-7-(dimethylamino)-4-(2-phenylthiazol-4-yl)-4H-chromene-3-carbonitrile:

Compound (7b): 2-amino-4-(2-(2-chlorophenyl)thiazol-4-yl)-7-(dimethylamino)-4H-chromene-3-carbonitrile:

Compound (7c): 2-amino-4-(2-(3-chlorophenyl)thiazol-4-yl)-7-(dimethylamino)-4H-chromene-3-carbonitrile:

Compound (7d): 2-amino-4-(2-(4-chlorophenyl)thiazol-4-yl)-7-(dimethylamino)-4H-chromene-3-carbonitrile:

Compound (7e): 2-amino-4-(2-(4-bromophenyl)thiazol-4-yl)-7-(dimethylamino)-4H-chromene-3-carbonitrile:

Compound (9): 2-amino-7-(dimethylamino)-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-chromene-3-carbonitrile:

Compound (11): 2-amino-4-(5-(2,4-dichlorophenyl)isoxazol-3-yl)-7-(dimethylamino)-4H-chromene-3-carbonitrile:

نتایج بررسی اثرات سایتو توکسیک مشتقات ستز شده کرومین در جدول ۱ خلاصه شده است، به طوری که IC<sub>50</sub> این ترکیبات بر حسب








سنجهش شد. سه چاهک دارای سلول و محیط کشت کامل به عنوان کنترل استفاده شد. پلیت‌ها در شرایط ۳۷ درجه سانتی‌گراد و اتمسفر پنج درصد CO<sub>2</sub> و ۹۵ درصد هوا به مدت ۷۲ ساعت انکوبه شدند. پس از پایان انکوباسیون ۳۰ میکرولیتر از محلول MTT (۲/۵ میلی‌گرم در میلی‌لیتر PBS) به تمامی چاهک‌ها افزوده شده و پلیت به مدت یک ساعت دیگر انکوبه گردید. در پایان پس از تخلیه آرام محیط کشت، کریستال‌های رنگ فورمازان راسب شده در سیتوپلاسم سلول‌ها با افزودن ۱۰۰ میکرولیتر DMSO به هر چاهک حل شد. شدت رنگ با دستگاه ثبت الیزا در طول موج ۵۷۰ نانومتر و رفرانس ۶۳۰ نانومتر ثبت گردید. تمامی مراحل آزمون سه مرتبه تکرار شد. IC<sub>50</sub> (غاظتی از هر مشتق داروئی که ۵۰ درصد رشد سلول را نسبت به کشت کنترل کاهش دهد) از طریق معادله رگرسیون غیرخطی منحنی‌های رشد سلول در برابر غلظت مشتقات محاسبه شد.

ج) روش DAPI Staining برای بررسی آپوپتوز ناشی از دارو: ابتدا، یک و نیم میلی‌لیتر از سوپراسپانسیون سلولی معادل صد هزار سلول در میلی‌لیتر در پلیت‌های ۳۵ میلی‌متری به مدت ۲۴ ساعت انکوبه شد. سپس محیط کشت آنها تخلیه گردید و سلول‌ها را با محیط کشت کامل حاوی رقت‌های معادل IC<sub>50</sub> و IC<sub>75</sub> از هر یک از مشتقات ستز شده به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت انکوبه شد. پس از پایان انکوباسیون ادامه آزمون به شرح زیر انجام شد:

لایه سلولی پس از تخلیه کامل محیط کشت و شستشو با PBS با پارافورمالدئید چهار درصد به مدت ده دقیقه فیکس گردید. پس از

جدول - ۱:

ساختمان و میزان سایتو توکسیسیته (IC<sub>50</sub>) ترکیبات کرومین ستز شده (7a-7e و 11) در مقابل رده‌های سلولی سرطان انسانی و در مقایسه با Etoposide در *in vitro*


Cell line IC <sub>50</sub> ( $\mu\text{M}$ ) <sup>*</sup>									X	Compound
1321N1	U87-MG	Daoy	SW480	Hep-G2	A549	KB	MCF-7			
۳۶/۳±۱۹/۱	۳۴/۷±۱۱/۴	۳۰±۸/۱	۲۸±۴/۴	۲۶/۸±۲/۷	۱۱/۴±۰/۹	۲۸/۳±۱۱/۲	۵/۶±۱/۴۱		Va	
۵/۲±۲/۹	۵/۹±۰/۷۸	۱/۸±۰/۱۷	۴/۸±۱/۹	۶/۴±۲/۴	۸/۷±۲/۵	۲/۰/۵±۰/۱۷	۲/۷±۰/۴		Vb	
۹/۳±۴/۴	۳/۱/۵±۹/۸	۲۸±۰/۷	۱۷/۴±۴/۷	۲/۲±۰/۶۳	۱۰/۰±۳/۶	۳۱±۱۱/۹	۵/۸±۰/۵۸		Vc	
۱۰/۴±۲/۲	۶/۴±۰/۳۱	۱۳/۹±۵/۲	۴/۲±۱/۱	۳/۸±۰/۹۷	۴/۱±۱/۷	۱۲/۵±۳/۱	۰/۳۶±۰/۰۲		Vd	
۹/۴±۵/۷	۳/۷±۰/۲۹	۱۲/۰±۱/۸	۶/۶±۰/۲۶	۶/۶±۰/۸۸	۱۱/۸±۲/۳	۷/۳±۱/۹	۳/۲±۰/۷۲		Ve	
۰/۷۳±۰/۲۸	۶/۸±۰/۸۳	۱/۲±۰/۱۸	۱/۱±۰/۳۱	۰/۸۹±۰/۴	۰/۴۹±۰/۳	۲/۵±۱/۱	۱±۰/۴۴		9	
۱/۱±۱/۳۸	۰/۸۴±۰/۳	۱۲/۱±۶/۹	۳/۷±۱/۶	۰/۲۸±۰/۰۹	۵/۱±۰/۶	۰/۳۹±۰/۳	۰/۹۸±۰/۷۷		11	
۴/۹±۰/۵۴	۴/۴±۰/۴۶	۱۱/۱±۰/۶۵	۵/۲±۰/۷	۱/۱±۰/۸۹	۰/۶±۰/۴۳	۰/۷۶±۰/۱۹	۰/۵۴±۰/۱۱	-	Etoposide	

(بر حسب میکرومکان) هر یک از ترکیبات کرومین ستز شده دهنده میانگین حاصل از سه بار آزمایش است<sup>SD</sup>


تصاویر حاصل از میکروسکوپ فلورسانس در اشکال ۱ و ۲ نشان داده شده است. شکل ۱ نمونه کترل منفی (بدون اضافه نمودن دارو به محیط کشت سلول) می‌باشد و شکل ۲ تصویر حاصل از اثر القاء آپوپتوز مشتق سنتز شده شماره ۱۱ را در محیط کشت سلولی KB نشان می‌دهد. در نمونه کترل (بدون دارو) سلول‌ها با دیواره سلولی صاف و سیتوپلاسم روشن و کم رنگ مشاهده می‌گردند، در حالی که در نمونه‌های مجاور شده با دارو هسته سلول‌ها رنگ را به خود گرفته و دیواره سلول‌ها چروکیده می‌باشد.

بحث

رشد و توسعه تومور معمولاً در نتیجه عدم وقوع مرگ طبیعی و تنظیم شده سلولی (apoptosis) در هر یک از بافت‌های بدن می‌باشد و یا ممکن است به علت تکثیر نامنظم سلول‌ها صورت گیرد.<sup>۱۵، ۱۶</sup> از طرفی مشخص شده است که بعضی از عوامل سیتوتوکسیک قادر به القاء اپوپتوزیس در سلول‌های توموری می‌باشند.<sup>۱۷، ۱۸</sup> مکانیسم اثر این ترکیبات سیتوتوکسیک بر روی سلول متفاوت است. این تحقیق اثرات سیتوتوکسیک و القاء اپوپتوزیس مشتقانی از ترکیبات کرومین که جدیداً در آزمایشگاه شیمی دارویی سنتز شده‌اند را مورد بررسی قرار داد. طبق مطالعات انجام یافته مشتقان دیگر این ترکیبات از طریق تداخل در تشکیل توبولین و یا ممانعت در پلیمراز‌سیون توبولین باعث القاء اپوپتوزیس در سلول‌های توموری می‌گردد. اثر سیتوتوکسیک این مشتقان با تست MTT مورد بررسی قرار گرفت و اثر القاء اپوپتوزیس از طریق رنگ‌آمیزی DNA سلول با ترکیب فلورسانس DAPI پی‌گیری شد. رده‌های سلولی مورد استفاده شامل هشت رده سلولی سرطان انسانی است که از بافت‌های مختلف بدن گرفته شده بودند. ترکیبات 7a-e دارای استخلاف‌های کلر و برم با موقعیت‌های متفاوت روی حلقه فنیل می‌باشند و ترکیب ۹ و ۱۱ دارای ساختار متفاوت از ترکیبات قبلی هستند. ترکیبات 7a-e دارای حلقه تیازول بوده و حلقه فنیل دارای کلر با موقعیت‌های متفاوت و برم در موقعیت پارا می‌باشد (جدول ۱). نتایج نشان می‌دهند این ترکیبات بر علیه برخی لاین‌های سلولی با IC<sub>50</sub> پایین موثرند، اما در مقابل برخی دیگر IC<sub>50</sub> بالایی از خود نشان می‌دهند به‌طوری که مشتق سنتز شده 7d بر علیه MCF-7 که یک لاین سلولی سرطان سینه می‌باشد دارای IC<sub>50</sub>=۰/۳۶ است که در مقایسه با دارویی Etoposide



شکل- ۱: میکروسکوپ فلورسانس از سلول‌های KB (رده سلولی اپیدرمال نازو- فارنکس) در محیط کشت DMEM بدون اضافه نمودن دارو به محیط (سلول‌های کترول)



شکل - ۲: تصاویر میکروسکوپ فلورسانس از سلول های KB (رده سلولی اپiderمال نازوفارنکس) در محیط کشت DMEM بعد از اضافه نمودن مشتق سترز شده شماره ۱۱ با غلظت متوسط  $10/39$  میکرومولار به محیط کشت به مدت ۷۲ ساعت

میکرومولار ارائه شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که همه ترکیبات دارای اثرات سیتو توکسیک با IC<sub>50</sub> کمتر از ۴۰ میکرومولار می‌باشند که در لاین‌های سلولی مختلف متفاوت است. ترکیبات ۹ و ۱۱ اثرات قویتری در اکثر لاین‌های سلولی دارند به طوری که IC<sub>50</sub> این دو ترکیب بر علیه هشت لاین سلولی کمتر از ۶/۸ می‌باشد. مشتق سنتز شده ۷d بر علیه لاین سلولی MCF-7 دارای IC<sub>50</sub> معادل ۳۶٪ می‌باشد. مشتق سنتز شده ۷b IC<sub>50</sub> معادل ۱/۸ بر لاین سلولی Doay را دارد. ضعیف‌ترین ترکیب ۷a است که بالاترین IC<sub>50</sub> را بر علیه لاین‌های سلولی داراست. بیشتر ترکیبات بر لاین سلولی Daoy بالاترین IC<sub>50</sub> را دارا می‌باشند. نتایج بررسی اثر القاء آپوپتوزیس این مشتقان در

دارای متوكسی در موقعیت‌های متا و پارا است. ترکیب ۱۱ دارای یک حلقه ایزوکسازول و یک حلقه فنیل با دو برم در موقعیت‌های ارتو و پاراست. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مشتق‌ات سنتز شده‌ای که دارای گروه شیمیائی فنیل-ایزوکسال یا حاوی گروه متوكسی در زنجیره شیمیائی خود می‌باشد، اثر سیتو-توکسیسیته سلولی و اثر القاء آپوپتوزیس قابل مقایسه و یا حتی بیشتری در مقایسه با داروی etoposide دارند. این یافته‌ها نماینگر این است که جابجایی گروه شیمیائی ۳,4,5-trimethoxyphenyl با گروه شیمیائی تیازول در مشتق‌ات کرومین سنتز شده باعث کاهش اثر سیتو-توکسیسیته ترکیب کرومین می‌گردد در حالی که مشتق سنتز شده‌ای که حاوی گروه شیمیائی فنیل-ایزوکسال باشد اثر سیتو-توکسیسیته و اثر القاء آپوپتوزیس شدیدتری دارد. سپاسگزاری: نویسنده‌گان مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان که پشتیبان این طرح تحقیقاتی به شماره‌های ۴۷۸۵ و ۴۷۸۶ بودند قدردانی می‌نمایند.

که در درمان سرطان سینه و یا دیگر سرطان‌ها به کار می‌رود با IC<sub>50</sub>=۰/۵۴ اثر قویتری از خود نشان می‌دهد. همچنین مشتق سنتز شده ۷b با IC<sub>50</sub>=۱/۸ بر لاین سلولی Doay موثر است و در مقایسه با Etoposide که آن در مقابل این لاین سلولی برابر با ۱۱/۱ می‌باشد، اثر قویتری از داروی رفرانس دارد. در این سری از ترکیبات ۷a ضعیفترین ترکیب است، در این ترکیب حلقه فنیل فاقد استخلاف کلر می‌باشد. ترکیب ۷c با داشتن کلر در موقعیت متا در رده بعدی قرار دارد، به نظر می‌رسد ترکیب ۷b با داشتن کلر در موقعیت ارتو دارای IC<sub>50</sub> پایین‌تری در اکثر لاین‌های سلولی می‌باشد. ترکیبات ۹ و ۱۱ نسبت به ترکیبات فوق قویترند به طوری که در اکثر لاین‌های سلولی دارای IC<sub>50</sub> پایین‌تری نسبت به Etoposide می‌باشند. IC<sub>50</sub> ترکیب ۹ در مقابل لاین سلولی Doay برابر با ۱/۲ بوده ولی IC<sub>50</sub> اتوپوسید به عنوان داروی رفرانس برابر با ۱۱/۱ است. ترکیب ۱۱ دارای IC<sub>50</sub>=۰/۸۴ در برابر لاین سلولی U87-MG می‌باشد در حالی که اتوپوسید IC<sub>50</sub>=۴/۴ فاقد حلقه تیازول بوده و IC<sub>50</sub> است. ترکیب ۹ فاقد حلقه تیازول بوده و

## References

- Kemnitzer W, Drewe J, Jiang S, Zhang H, Wang Y, Zhao J, et al. Discovery of 4-aryl-4H-chromenes as a new series of apoptosis inducers using a cell- and caspase-based high-throughput screening assay. 1. Structure-activity relationships of the 4-aryl group. *J Med Chem* 2004; 47(25): 6299-310.
- O'Driscoll L, Linehan R, Clynes M. Survivin: role in normal cells and in pathological conditions. *Curr Cancer Drug Targets* 2003; 3(2): 131-52.
- Reed JC, Tomaselli KJ. Drug discovery opportunities from apoptosis research. *Curr Opin Biotechnol* 2000; 11(6): 586-92.
- Kemnitzer W, Kasibhatla S, Jiang S, Zhang H, Zhao J, Jia S, et al. Discovery of 4-aryl-4H-chromenes as a new series of apoptosis inducers using a cell- and caspase-based high-throughput screening assay. 2. Structure-activity relationships of the 7- and 5-, 6-, 8-positions. *Bioorg Med Chem Lett* 2005; 15(21): 4745-51.
- Reed JC. Dysregulation of apoptosis in cancer. *J Clin Oncol* 1999; 17(9): 2941-53.
- Robertson GS, Crocker SJ, Nicholson DW, Schulz JB. Neuroprotection by the inhibition of apoptosis. *Brain Pathol* 2000; 10(2): 283-92.
- Kemnitzer W, Drewe J, Jiang S, Zhang H, Zhao J, Crogan-Grundy C, et al. Discovery of 4-aryl-4H-chromenes as a new series of apoptosis inducers using a cell- and caspase-based high-throughput screening assay. 3. Structure-activity relationships of fused rings at the 7,8-positions. *J Med Chem* 2007; 50(12): 2858-64.
- Kemnitzer W, Drewe J, Jiang S, Zhang H, Crogan-Grundy C, Labreque D, et al. Discovery of 4-aryl-4H-chromenes as a new series of apoptosis inducers using a cell- and caspase-based high throughput screening assay. 4. Structure-activity relationships of N-alkyl substituted pyrrole fused at the 7, 8-positions. *J Med Chem* 2008; 51(3): 417-23.
- Gaya AM, Rustin GJ. Vascular disrupting agents: a new class of drug in cancer therapy. *Clin Oncol (R Coll Radiol)* 2005; 17(4): 277-90.
- Thorpe PE. Vascular targeting agents as cancer therapeutics. *Clin Cancer Res* 2004; 10(2): 415-27.
- Haggarty SJ, Mayer TU, Miyamoto DT, Fathi R, King RW, Mitchison TJ, et al. Dissecting cellular processes using small molecules: identification of colchicine-like, taxol-like and other small molecules that perturb mitosis. *Chem Biol* 2000; 7(4): 275-86.
- Lee KY, Nam DH, Moon CS, Seo SH, Lee JY, Lee YS. Synthesis and anticancer activity of lavendustin A derivatives containing arylethenylchromone substituents. *Eur J Med Chem* 2006; 41(8): 991-6.
- Sang S, Lambert JD, Tian S, Hong J, Hou Z, Ryu JH, et al. Enzymatic synthesis of tea theaflavin derivatives and their anti-inflammatory and cytotoxic activities. *Bioorg Med Chem* 2004; 12(2): 459-67.
- Sairafianpour M, Kayser O, Christensen J, Asfa M, Witt M, Staerk D, et al. Leishmanicidal and antiplasmoidal activity of constituents of Smirnowia iranica. *J Nat Prod* 2002; 65(12): 1754-8.
- Mosmann T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to proliferation and cytotoxicity assays. *J Immunol Methods* 1983; 65(1-2): 55-63.
- Steller H. Mechanisms and genes of cellular suicide. *Science* 1995; 267(5203): 1445-9.
- Thompson CB. Apoptosis in the pathogenesis and treatment of disease. *Science* 1995; 267(5203): 1456-62.
- Herr I, Debatin KM. Cellular stress response and apoptosis in cancer therapy. *Blood* 2001; 98(9): 2603-14.
- Rich T, Allen RL, Wyllie AH. Defying death after DNA damage. *Nature* 2000; 407(6805): 777-83.

## In vitro cytotoxicity and apoptotic inducing activity of the synthesized 4-aryl-4H-chromenes derivatives against human cancer cell lines

Mahmoodi M.<sup>1,2\*</sup>  
Rajabalian S.<sup>1</sup>  
Foroumadi A<sup>3</sup>  
Hidayekeshel S.<sup>4</sup>  
Safavi M.<sup>3</sup>  
Khoshzaban A.<sup>4</sup>  
Divsalar K.<sup>1</sup>  
Mohagheghi MA.<sup>2</sup>

1- Neuroscience Research Center,  
Kerman University of Medical  
Sciences  
2- Cancer Research Center  
3- Pharmaceutical Sciences  
Research Center  
4- Iranian Tissue Bank Research &  
Preparation Center

Tehran University of Medical  
Sciences

### Abstract

Received: May 09, 2009 Accepted: June 21, 2009

**Background:** 4-Aryl-4H-chromenes are novel anticancer agents which induce apoptosis in cancer cells. These compounds were found to induce apoptosis by targeting the tubulin/microtubule system in cell proliferation process. The aim of this study was to report cytotoxic and apoptosis inducing activities of a new series of synthesized 4-aryl-4H-chromenes compounds.

**Methods:** The in vitro cytotoxic activity of the synthesized 4-aryl-4H-chromenes was investigated against a panel of human cancer cell lines including MCF-7 (breast carcinoma), A549 (lung carcinoma), HEPG-2 (liver carcinoma), SW-480 (colon adenocarcinoma), U87-MG (glioblastoma), 1321N1 (astrocytoma), and DAOY (medulloblastoma). The percentage of growth inhibitory activity was evaluated using MTT colorimetric assay versus controls not treated with test derivatives. The data for etoposide, a well known anticancer drug, was included for comparison. For each compound, the 50% inhibitory concentration (IC<sub>50</sub>) were determined. Apoptosis inducing activity were assessed by DAPI staining.

**Results:** Preliminary screening showed that those chromenes analogs bearing phenyl-isoxazole-3-yl substitution or the derivatives containing methoxyphenyl in chromene ring exhibited cytotoxic and apoptotic inducing activity comparable with or even superior than the reference drug, etoposide. The compounds without this type of substitution have lower activity.

**Conclusions:** Replacement of 3, 4, 5-trimethoxyphenyl group with thiazol ring in the synthesized derivatives reduced the cytotoxic activity. However, the derivatives with phenyl-isoxazole analogue showed potent cytotoxic and apoptotic inducing activity.

**Keywords:** 4-aryl-4H-chromenes, cytotoxic activity, apoptosis.

\*Corresponding author: Cancer Research Center, Cancer Institute, Keshavarz Blv, Imam Khomeini Hospital  
Tel: +98-21-61192506  
email: dmahmoodi@razi.tums.ac.ir