

انسفالیت: گزارش موردنی Bickerstaff

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۰۶/۲۱

چکیده

* منصوبه تقاء^۱

عبدالرضا ناصر مقدسی^۱

بهارک مهدی پور آقاباقر^۲

مقدمه: انسفالیت بیکراستاف (BBE) یک بیماری نادر در سیستم عصبی مرکزی با علت ناشناخته می‌باشد. اگرچه تشخیص این بیماری دشوار است و تاکنون موردی در ایران گزارش نشده است اما با تشخیص به موقع قابل درمان می‌باشد. معرفی بیمار: خانم ۸۳ ساله‌ای با اختلال تعادل همراه با تکلم دیس آرتیک و شروع سرگیجه از هفته گذشته مراجعه کرد. در MRI انجام شده افزایش سیگنال در ناحیه پونز مشاهده شد. بیمار با تشخیص استروک ایسکمیک تحت درمان قرار گرفت. چند روز بعد ضعف عضلانی به صورت قرینه در اندام‌های تحتانی به وجود آمد. در معاینه کاوش رفلکس‌های وتری و بروز اختلال حس عمقی دو طرفه مشاهده گشت. در بررسی مایع مغزی-نخاعی افزایش پروتئین و در EMG-NCV انجام شده پلی‌نوروپاتی حاد گزارش شد. بیمار با تشخیص انسفالیت بیکراستاف تحت درمان با IVIG و سپس کورتیکواستروئید قرار گرفت و بهبود نسبی پیدا کرد. **نتیجه‌گیری:** علی‌رغم علایم شدید اولیه انسفالیت بیکراستاف پیش‌آگهی مناسبی داشته اگر به درستی تشخیص و درمان گردد و اگر چه نظاهرات بالینی بسیار مهم می‌باشد ولی اقدامات پاراکلینیک نیز برای تشخیص این سندروم ضروری است.

کلمات کلیدی: انسفالیت ساقه مغز، بیکراستاف، تشخیص، درمان.

۱- گروه داخلی، مغز و اعصاب، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

۲- مرکز توسعه پژوهش بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

* نویسنده مسئول: تهران، خیابان امام خمینی، بیمارستان سینا، بخش داخلی مغز و اعصاب

تلفن: ۰۶۳۴۸۵۰۱
email: toghae@sina.tums.ac.ir


مقدمه

همراه با تکلم دیس آرتیک در بخش نورولوژی بیمارستان سینا بستری شد. بیمار از یک هفته قبل دچار سرگیجه غیروضعیتی، اختلال راه رفتن و اختلال هوشیاری خفیف (Confusion) شده بود. از سردرد، دویینی و پارستزی اندام‌ها شاکی نبود، اختلال اسفنکتری نداشت و سابقه ابتلا به تب یا عفونت اخیر را ذکر نمی‌کرد. بیمار سابقه فشار خون بالا (HTN) و چربی خون بالا (HLP) را ذکر می‌کرد. بیمار دچار گیجی Confusion بود و در معاینات اعصاب کرaniyal نیستاگموس افقی دو طرفه مشهود بوده ولی افتالموپلزی نداشت. در معاینات مخچه‌ای آتاکسی تنهای Truncal ataxia وجود داشت. سایر معاینات نرمال بود. در MRI مغز بیمار در بد و ورود ضایعه‌ای Hyperintense بدون Enhancement در ناحیه پونز (Pons) به نفع انفارکتوس Infarction گزارش شد (شکل ۱). آزمایش خون بیمار به شرح زیر بود: گلبول سفیدخون (WBC): $۱۳۱۰ \mu\text{L}$ نرمال: $۱۰۹۰ \mu\text{L}$ ، ESR: ۶۲، هموگلوبین (Hb): ۹.7 gm/dL (نرمال: $۱۳/۲-۱۶/۲ \text{ gm/dL}$)،


Bickerstaff's Brainstem Encephalitis یک بیماری دمیلیزان و نادر در سیستم عصبی مرکزی می‌باشد که علت بروز آن همچنان ناشناخته باقی مانده است. اما احتمالاً این بیماری ریشه در اختلالات اتوایمیون داشته باشد.^۱ BBE، شروع حاد و پیشرونده افتالموپلزی و آتاکسی است که با اختلال در سیستم عصبی مرکزی باعث اختلال هوشیاری و هایپرفلکسی می‌شود. اکثر بیماران پرونز خوبی دارند، تعداد کمی از آنها می‌میرند و یا دچار بهبودی ناقص همراه با علایم عود کننده می‌شوند.^۲ به دلیل همپوشانی این بیماری با سندروم گیلن باره ممکن است تظاهرات درگیری اعصاب محیطی را نیز در روند بیماری شاهد باشیم. انسفالیت یک بیماری نادری است که با تشخیص به موقع درمان می‌شود.

معرفی بیمار

خانم ۸۳ ساله با شکایت ضعف اندام‌های فوقانی و تحتانی



شکل-۲: نمایی از MRI مغز پس از دو سال، از بین رفتن نواحی Hyper intense MRI



شکل-۱: نمایی از MRI مغز بیمار در بدرو ورود که ضایعه‌ای Hyper intense Enhancement در ناحیه Pons مشهود است.

بهبودی مطلوب بیمار روزانه 500 mg متیل پردنیزولون برای پنج روز به درمان وی اضافه شد. پس از آن بیمار در طی سه ماه سیر بهبودی را طی کرد. پس از دو سال بیمار قادر است با کمک عصا راه برود و همچنین قدرت عضلانی وی به حد مطلوب رسیده است. در بررسی MRI مغز بیمار نواحی Hyper intense از بین رفته است (شکل ۲).

بحث

در سال ۱۹۵۷ Bickerstaff هشت بیمار را با علایم اختلال حاد ساقه مغز (خواب آلودگی، افتالموپلژی و آتاکسی) همراه با اختلالات حسی و حرکتی معرفی کرد که وجود شرایط ذکر شده به عنوان Bickerstaff's Brainstem Encephalitis (BBE) نام گذاری شد.^۳ طبق آنچه Bickerstaff بیان داشت معیارهای تشخیصی این سنتدرم عبارتند از: ۱) درگیری پیشروندۀ و متقارن چشمی (افتالموپلژی) همراه با آتاکسی در طی چهار هفته ۲) اختلال سطح هوشیاری یا افزایش رفلکس‌های وتری و ۳) قدرت عضلانی نزدیک به نرمال.^۴ Odaka نیز در سال ۲۰۰۳ با برسی ۶۲ بیمار درگیری تدریجاً پیشروندۀ دو طرفه و متقارن چشمی (افتالموپلژی) همراه با آتاکسی در طی چهار هفته، اختلال سطح هوشیاری و هایپررفلکسی را از علایم

(نرمال: کمتر از ۳۰ ، اوره (BUN): ۴۷ mg/dl (نرمال: $۷\text{--}۲۱\text{ mg/dl}$)، کراتینین (Cr): $۱/۷\text{ mg/dl}$ (نرمال: $۰/۵\text{--}۱/۴\text{ mg/dl}$)، کلسیم: $۸/۴\text{ mg/dl}$ (نرمال: $۰/۹\text{--}۱/۰\text{ mg/dl}$)، LDH: ۳۵۸ U/L (نرمال: $۰/۲\text{--}۲۵۰\text{ U/L}$)، پلاکت (Plt)، قند خون ناشنا (FBS)، اسید اوریک، سدیم، پتاسیم، CPK و PTT در محدوده نرمال بودند، تست‌های VDRL و رایت منفی گزارش شدند. بیمار با تشخیص Ischemic stroke تحت درمان با قرص‌های آسپرین ۸۰ mg/daily و سیمواستاتین ۲۰ mg/daily و تزریق زیر جلدی آمپول انوکسپارین ۶۰ mg/bd قرار گرفت. پس از پنج روز اختلال راه رفتن تشدید شد. در معاینه تشدید ضعف عضلانی ابتدا در اندام تحتانی و سپس در اندام فوقانی یافت شده و همزمان رفلکس‌های وتری نیز به تدریج کاهش یافتند. با شک به پلی نوروپاتی حاد برای بیمار الکترومیوگرافی انجام شد که در آن افت شدید دامنه امواج (Amplitude) در اعصاب حرکتی مشاهده شد. اعصاب حسی نرمال بودند. سپس از بیمار نمونه مایع نخاعی (LP) گرفته شد. یافته غیرطبیعی LP بیمار پروتئین $۱۹۵/۸\text{ mg/dl}$ ($۱۵\text{--}۴۵\text{ mg/dl}$) بود. با توجه به تظاهرات بالینی بیمار و نتایج بررسی‌های مختلف بیمار را با تشخیص انسفالیت Bickerstaff تحت درمان با ایمونوگلوبولین وریدی یا IVIG (۱۲۰ گرم در پنج روز) قرار دادیم. به علت عدم

طبيعي گزارش شد.^۲ موارد معرفی شده توسط Roz در سال ۲۰۰۸^{۱۵} و Sharma در سال ۲۰۰۶^۶ و Wang^۷ و نیز Ho^۸ شامل عالیم بالینی و پاراکلینیک فوق بود. مطالعه Doudier در سال ۲۰۰۷ معرف یک مورد بیماری Bickerstaff است که با تظاهرات تب و عفونت تنفسی مراجعه کرده بود و طی یک هفته دچار خواب آلودگی، ضعف اندام‌ها و آفازی شد. در LP بیمار افزایش پروتئین مشهود بود. MRI مغز بیمار هیچگونه ضایعه‌ای را در ناحیه ساقه مغز نشان نمی‌داد.^{۱۷} اما مطالعه Doudier معرف یک مورد بیماری Bickerstaff است که با تظاهرات تب و عفونت تنفسی مراجعه کرده بود و طی یک هفته دچار خواب آلودگی، ضعف اندام‌ها و آفازی شد. در LP بیمار افزایش پروتئین مشهود بود. MRI مغز بیمار هیچگونه ضایعه‌ای را در ناحیه ساقه مغز نشان نمی‌داد.^{۱۷} با این حال مطالعه Mondejar وجود ضایعات Hyper intense را در تشخیص انسفالیت Bickerstaff ضروری دانست. همانگونه که ذکر شد این ضایعات در MRI بیمار ما نیز مشهود بوده‌اند.^{۱۸}

در بیمار ما برخلاف اکثر موارد گزارش شده افتالموپلژی و رفلکس بایینسکی وجود نداشت. همچنین سابقه عفونت قبلی را ذکر نمی‌کرد. در واقع از لحاظ بالینی عالیم بیمار ما با گفته‌های Bickerstaff مطابقت نداشته ولی شواهد آزمایشگاهی و پاسخ مناسب BBE به درمان ترکیبی IVIG و متیل پردنیزولون، اثبات کننده تشخیص BBE می‌باشدند. همچنین وجود ضایعات ساقه مغز همراه با GBS در بیمار فوق تایید کننده تشخیص سندرم Bickerstaff است. در ایران گزارشی از این بیماری موجود نیست و بیمار ما با بسیاری از موارد گزارش شده در سایر کشورها تفاوت دارد. با توجه به موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که معیارهای بالینی برای اثبات BBE به تنهایی کافی نمی‌باشند و موارد پاراکلینیک شامل MRI و CSF در مواردی که شواهدی به نفع نوروپاتی وجود دارد انجام EMG-NCS نیز برای تشخیص لازمند. توصیه این مقاله می‌تواند بازنگری معیارهای تشخیصی BBE با احتساب یافته‌های پاراکلینیک باشد. تشخیص این بیماری می‌تواند با تجویز به موقع دارو منجر به بهبودی بیمار شود، در حالی که اگر به این بیماری فکر نشود تمام مشکلات بیمار به حساب استروک گذاشته شده و بیمار از دریافت درمان محروم می‌گردد.

سپاسگزاری: با سپاس از مرکز توسعه پژوهش بیمارستان سینا.

BBE اعلام کرد.^۳ از آنجایی که روش تشخیصی مسجلی برای BBE وجود ندارد، باید گروهی از تشخیص‌های افتراقی شامل مولتیپل اسکلروزیس، بیماری بهجت، بیماری لایم، لکوانسفالوپاتی چند کانولوپی پیشرونده، سارکوپیودوز، بیماری ویپل،^۵ تومورهای ساقه مغز و لنفوم^۶ را رد نمود. اکثر این بیماران شرح حالی از عفونت قبلی مخصوصاً عفونت سیستم تنفسی فوقانی (URI) را می‌دهند.^{۷,۸} بیمارانی که قدرت عضلانی آنها بر اساس معیارهای تعریف شده سه و یا کمتر باشد به عنوان همپوشانی سندرم گیلن باره (GBS) و BBE در نظر گرفته می‌شوند که این همراهی امری شناخته شده می‌باشد.^۹

برای تشخیص BBE می‌توان از MRI مغز (به صورت افزایش سیگنال در نمای T2 که وسیع و ناظم بوده و به خصوص ناحیه پونز را درگیر می‌کند و با بهبود بیماری از بین می‌روند.^{۱۰,۱۱} الکترومیوگرافی (در موارد همپوشانی با سندرم گیلن به صورت Anti-GQ1b IgG (Acute motor axonal neuropathy) سرم (که در بیماران BBE به میزان قابل توجهی مثبت می‌گردد)، استفاده کرد.^{۱۰} درمان‌های پیشنهادی شامل پلاسمافرزر^{۱۲} و IVIG^{۱۳} است. لازم به ذکر است که ترکیب IVIG و دوز بالای متیل پردنیزولون اثرات درمانی بهتری دارد.^{۱۴} Ito در سال ۲۰۰۸ با بررسی ۵۳ بیمار مبتلا به BBE که همه آنها دچار افتالموپلژی و آتاكسی بودند اعلام کرد که بیشتر افراد شامل مردان بودند. متوسط سن این بیماران ۴۰ سال بود. عالیم عفونت تنفسی فوقانی در ۹۶٪ افراد وجود داشت. سایر عالیم شامل آتاكسی (۴۷٪)، دوبینی (۳۲٪)، اسهال (۲۹٪) و اختلال هوشیاری (۹٪) بودند. در طی مدت بیماری همانند بیمار مطالعه ما ضعف اندام‌ها در ۴۹٪ موارد، اختلالات حسی در ۴۲٪ و رفلکس بایینسکی در ۳۸٪ افراد ظاهر شد. اکثر بیماران (۳۵٪) با تجویز ایمونوگلوبولین وریدی درمان شدند و ۱۳٪ با آنها پس از دوره درمان بهبودی کامل پیدا کردند.^۸

Odaka در سال ۲۰۰۳ پس از مطالعه ۶۲ بیمار Bickerstaff اعلام کرد که تمامی بیماران دچار افتالموپلژی اکسترنال و آتاكسی بودند. ۷۴٪ از بیماران در مدت بستری دچار اختلال هوشیاری شدند و تمام آنها بیماری هوشیاریشان مختل نبود دچار هایپرفلکسی بودند. ۶۰٪ بیماران دچار ضعف اندام و ۴۰٪ آنها دارای رفلکس بایینسکی مثبت و ۱۶٪ دچار دیس آرتی بودند. ضایعات غیرطبیعی در MRI ۳۰٪ از بیماران مشهود بود و پروتئین CSF اکثر بیماران بالاتر از حد

References

- Berkowicz T, Siger-Zajdel M, Zaleski K, Sokołowska D, Wendorff J, Selmaj K. Bickerstaff's brainstem encephalitis: an analysis of clinical and MRI findings. *Neurol Neurochir Pol* 2006;40(1):16-21.
- Odaka M, Yuki N, Yamada M, Koga M, Takemi T, Hirata K, et al. Bickerstaff's brainstem encephalitis: clinical features of 62 cases and a subgroup associated with Guillain-Barré syndrome. *Brain* 2003;126(Pt 10):2279-90.
- Sonneville R, Klein I, de Broucker T, Wolff M. Post-infectious encephalitis in adults: diagnosis and management. *J Infect* 2009;58(5):321-8.
- Susuki K, Yuki N, Hirata K. Fine specificity of anti-GQ1b IgG and clinical features. *J Neurol Sci* 2001;185(1):5-9.
- Falini A, Kesavadas C, Pontesilli S, Rovaris M, Scotti G. Differential diagnosis of posterior fossa multiple sclerosis lesions--neuroradiological aspects. *Neurol Sci* 2001;22 Suppl 2:S79-83.
- Sharma V, Chan YC, Ong, Teoh HL, Wilder-Smith EP. Bickerstaff's brainstem encephalitis: can it recur? *J Clin Neurosci* 2006;13(2):277-9.
- Wang DS, Tang Y, Wang Y. A case of overlapping Bickerstaff's brainstem encephalitis and Guillain-Barré syndrome. *J Zhejiang Univ Sci B* 2006;7(2):138-41.
- Ito M, Kuwabara S, Odaka M, Misawa S, Koga M, Hirata K, et al. Bickerstaff's brainstem encephalitis and Fisher syndrome form a continuous spectrum: clinical analysis of 581 cases. *J Neurol* 2008;255(5):674-82.
- Ogawara K, Kuwabara S, Yuki N. Fisher syndrome or Bickerstaff brainstem encephalitis? Anti-GQ1b IgG antibody syndrome involving both the peripheral and central nervous systems. *Muscle Nerve* 2002;26(6):845-9.
- Chikakiyo H, Kunishige M, Yoshino H, Asano A, Sumitomo Y, Endo I, et al. Delayed motor and sensory neuropathy in a patient with brainstem encephalitis. *J Neurol Sci* 2005;234(1-2):105-8.
- Williams MH. The spectrum of IgG GQ1(b) syndrome: an unusual cluster. *J Clin Neurosci* 2001;8(4):315-8.
- Berkowicz T, Siger-Zajdel M, Zaleski K, Sokołowska D, Wendorff J, Selmaj K. Bickerstaff's brainstem encephalitis: an analysis of clinical and MRI findings. *Neurol Neurochir Pol* 2006;40(1):16-21.
- Fox RJ, Kasner SE, Galetta SL, Chalela JA. Treatment of Bickerstaff's brainstem encephalitis with immune globulin. *J Neurol Sci* 2000;178(2):88-90.
- van Koningsveld R, Schmitz PI, Meché FG, Visser LH, Meulstee J, van Doorn PA; Dutch GBS study group. Effect of methylprednisolone when added to standard treatment with intravenous immunoglobulin for Guillain-Barré syndrome: randomised trial. *Lancet* 2004;363(9404):192-6.
- Roos RP, Soliven B, Goldenberg F, Badruddin A, Baron JM. An elderly patient with Bickerstaff brainstem encephalitis and transient episodes of brainstem dysfunction. *Arch Neurol* 2008;65(6):821-4.
- Ho TW, Mishu B, Li CY, Gao CY, Cornblath DR, Griffin JW, et al. Guillain-Barré syndrome in northern China. Relationship to *Campylobacter jejuni* infection and anti-glycolipid antibodies. *Brain* 1995;118 (Pt 3):597-605.
- Doudier B, Rovery C, Rossi P, Feuillet L, Brouqui P. Bickerstaff's brainstem encephalitis: a case report. *Med Mal Infect* 2007;37(4):234-6.
- Mondéjar RR, Santos JM, Villalba EF. MRI findings in a remitting-relapsing case of Bickerstaff encephalitis. *Neuroradiology* 2002;44(5):411-4.

اصلاحیه نام نویسنده مقاله

بدینویسیله نام سرکار خاتم دکتر پاک نژاد از نویسنندگان مقاله "بررسی تاثیر ورزش‌های هوایی و هوایی- مقاومتی بر حجم‌های ریوی و کیفیت زندگی بیماران آسمی" چاپ شده در شماره ۶ سال ۱۳۸۹ صفحه ۵۴-۳۴۸، مجله دانشکده پزشکی به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.

ام البنین پاک نژاد

از بابت این اشتباه پژوهش می‌خواهیم.

Erratum: author's correction

In the article titled "The effects of aerobic and strength exercises on pulmonary function tests and quality of life in asthmatic patients" that appeared in the September 2010 issue of Tehran University Medical Journal (TUMJ 2010;68(6):348-54, the name of the author Dr. Paknejad should be as follows:

Omolbanin Paknejad MD.

We regret the error.

Bickerstaff's brainstem encephalitis: a case report

Mansoureh Toghae MD.^{1*}
Abdoreza Naser-moghadasi
MD.¹
Baharak Mehdipour-
Aghabagher MD.²

1- Department of Internal Diseases
Neurology, Sina Hospital, Tehran
University of Medical Science,
Tehran, Iran.

2- Research and Development
Center, Sina Hospital.
Tehran University of Medical
Science, Tehran, Iran.

Abstract

Received: June 08, 2010 Accepted: September 12, 2010

Background: Bickerstaff's brainstem encephalitis (BBE) is a very uncommon central nervous system disease with unknown etiology. As it is usually responsive to treatment, the diagnosis this disease is important. It seems There is no reported Bickerstaff's brainstem encephalitis case in Iran.

Case presentation: An 83 year old woman presented with vertigo, ataxia and dysarthria from a week prior to admission. Her T2 weighted MRI revealed high intensity lesions in the pons area. She received treatment with impression of ischemic stroke. After few days, lower extremities became weak symmetrically and deep tendon reflexes depressed. Deep sensory loss was noted too. The EMG-NCV studies showed acute polyneuropathy and in CSF examination increased protein content was noted. The patient improved after IVIG and corticosteroid therapy with impression of Bickerstaff's brainstem encephalitis.

Conclusion: In spite of severe initial presentation, Bickerstaff's brainstem encephalitis has a good prognosis if it diagnosed and treated properly. Although clinical features is too important, but paraclinical work up are necessary to diagnose this syndrome.

Keywords: Brainstem encephalitis, bickerstaff, diagnosis, treatment.

*Corresponding author: Dept. of Internal Diseases, Neurology, Sina Hospital, Imam Khomeini St., Tehran, Iran.
Tel: +98-21- 66348501
email: toghae@sina.tums.ac.ir