

ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D و پلیمورفیسم‌های گیرنده آن با سرطان مدولاری تیروپید

چکیده

دریافت: ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ ویرایش: ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ پذیرش: ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ آنلاین: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

زمینه و هدف: سرطان تیروپید شایعترین بدخیمی غدد درون‌ریز می‌باشد. اثرات ضد سرطانی ویتامین D را در سرطان‌های مختلف نشان داده‌اند. پلیمورفیسم‌های گیرنده ویتامین D می‌تواند استعداد ابتلا به سرطان‌های مختلف را تحت تاثیر قرار دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سطح سرمی ویتامین D و پلیمورفیسم‌های BsmI، FokI و Tru9I گیرنده ویتامین D انجام گردید.

روش بررسی: مطالعه از نوع مورد-شاهدی بوده و در تیر ماه ۱۳۹۴ در پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام گردید. تعداد ۴۰ بیمار و ۴۰ فرد سالم وارد مطالعه شدند. DNA ژنومی نمونه‌ها پس از استخراج به روش نمک اشباع/پروتیناز K با روش PCR-Sequencing مورد بررسی قرار گرفت. سطح سرمی ویتامین D با استفاده از تکنیک الایزا تعیین گردید.

یافته‌ها: فراوانی ژنتیپی و آللی مربوط به پلیمورفیسم‌های FokI و BsmI بین گروه تست و کنترل تفاوت معناداری را نشان نداد. در مورد پلیمورفیسم Tru9I فراوانی ژنتیپی Tt در گروه تست ۴۵٪ و در گروه کنترل ۵٪ و فراوانی آللی t در گروه تست ۲۵٪ و در گروه کنترل ۸٪ بود، این تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود ($P=0.006$). میانگین سطح سرمی ویتامین D در گروه تست ۲۳/۳۲ ng/ml و در گروه کنترل ۱۸/۹۵ ng/ml به دست آمد که این تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود ($P=0.02$).

نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد سطح سرمی ویتامین D بر خلاف انتظار ارتباط معکوسی با سرطان مدولاری تیروپید دارد و پلیمورفیسم Tru9I به صورت معناداری با افزایش ریسک ابتلا به سرطان مدولاری تیروپید همراه است.

کلمات کلیدی: سرطان مدولاری تیروپید، ویتامین D، گیرنده ویتامین D، پلیمورفیسم.

مهرنوش رمضانی^۱، مهدی هدایتی^۲
سعید حسینی اصل^۱
معراج طباطبایی^۳، محمد ماذنی^{۱*}
شیرزاد نصیری^۴

۱- گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی و پرایپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران. ۲- مرکز تحقیقات سلوی و مولکولی، پژوهشکده غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ۳- گروه ایمuno لوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ۴- جراحی عمومی و سرطان، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، بیمارستان شریعتی، تهران، ایران.

* نویسنده مسئول: اردبیل، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی و پرایپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۱۰۰۵۲
E-mail: m.mazani@arums.ac.ir

مقدمه

پارافولیکولار (سلول‌های C) و سه شکل دیگر از خاستگاه سلول‌های فولیکولار می‌باشد. چندین فاکتور در رشد غده تیروپید دخیل هستند که از بین آن‌ها هورمون تحریک‌کننده تیروپید (Thyroid stimulating hormone) نقش عمده‌ای در تنظیم رشد و تمایز سلول‌های تیروپیدی ایفا می‌نماید، هورمون تحریک‌کننده تیروپید باعث تحریک تولید مولکول‌های دخیل در انتقال سیگنال داخل سلولی از جمله cAMP، جذب ید و رشد سلولی می‌گردد.^۱ فرم فعل ویتامین D (1,25-(OH)₂D) تیروپید شایعترین بدخیمی غدد درون‌ریز بوده و ۱-٪/۲ سرطان‌ها را شامل می‌شود. مطالعات اپیدمیولوژیک نشان دهنده افزایش میزان بروز جهانی آن می‌باشد.^{۲-۴} سرطان تیروپید از لحاظ سیتوالوژیک به چهار نوع تقسیم می‌گردد: پاپیلاری، فولیکولار، مدولاری و آنапلاستیک.^۵ کارسينوم مدولاری از خاستگاه سلول‌های

سرطان تیروپید شایعترین بدخیمی غدد درون‌ریز بوده و ۱-٪/۲ سرطان‌ها را شامل می‌شود. مطالعات اپیدمیولوژیک نشان دهنده افزایش میزان بروز جهانی آن می‌باشد.^{۲-۴} سرطان تیروپید از لحاظ سیتوالوژیک به چهار نوع تقسیم می‌گردد: پاپیلاری، فولیکولار، مدولاری و آنапلاستیک.^۵ کارسينوم مدولاری از خاستگاه سلول‌های

هدف مطالعه حاضر بررسی سطح سرمی ویتامین D و پلیمورفیسم‌های موجود در اگزون ۲ و ایترون ۸ ژن گیرنده ویتامین D در بیماران مبتلا به سرطان مدولاری تیروئید در مقایسه با گروه کنترل بود.

D-vitamin 2-az طریق اتصال به گیرنده خود با استفاده از مکانیسم‌های ژنومیک و غیرژنومیک باعث مهار اثر تکثیری هورمون تحریک کننده تیروئید بر سلول‌های تیروئید می‌گردد، بنابراین ویتامین D می‌تواند نقش مهمی در تنظیم تکثیر سلولی غده تیروئید داشته باشد.^۸

روش بررسی

مطالعه از نوع مورد-شاهدی بوده و در تیر ماه ۱۳۹۴ در پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام گردید. ۴۰ نفر از مراجعه‌کنندگان که سرطان مدولاری آن‌ها بر اساس شواهد آسیب شناختی در بیمارستان‌های دانشگاهی و مراکز درمانی نقاط مختلف کشور به تایید متخصص پاتولوژیست رسیده بود و جهت انجام اقدامات درمانی بیشتر به بیمارستان طالقانی تهران و پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارجاع داده شده بودند، به عنوان گروه مورد و ۴۰ نفر داوطلب سالم بدون هیچ سابقه فامیلی ابتلا به سرطان تیروئید به عنوان گروه کنترل قرار گرفت. همچنین افراد مورد مطالعه در هر دو گروه مورد و کنترل فاقد هرگونه بیماری خود اینمی بوده‌اند و از لحاظ سن و جنس همسان‌سازی شدند.


مطالعه توسط کمیته اخلاق پزشکی مرکز علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم بیمارستان طالقانی تهران مورد تایید قرار گرفت. همچنین فرم رضایت‌نامه آگاهانه از هر دو گروه دریافت گردید. از هر فرد ۱۰ خون وریدی دریافت شده و در لوله‌های حاوی EDTA جمع‌آوری گردید. استخراج DNA از ۵ ml خون کامل توسط روش استاندارد نمک اشباع/پروتیناز K انجام گرفت.^۹ برای اطمینان از کیفیت و خلوص DNA به دست آمده، نسبت جذب نوری نمونه‌ها در ۲۶۰ به ۲۸۰ نانومتر اندازه‌گیری شد. واکنش Polymerase chain reaction (PCR) در حجم نهایی ۳۵ μl در میکروتیوب‌های آماده (Premix, Bioneer, Korea) که هر کدام حاوی ۱۰ آنژیم Taq پلیمراز، mM Tris-HCl (۱۰ mM), dNTP (۲۵۰ μM) و KCl (۳۰ μM) می‌باشد، انجام گرفت. به هر میکروتیوب به مقدار ۱/۵ μl MgCl₂ (۵-۱۰ pmole) ۱ μl از هر کدام از پرایمیرها، (۵-۵۰ ng) ۱ μl آب مقطر استریل اضافه گردید. شرایط بهینه برای تکثیر قطعات مورد نظر شامل ۳۰ سیکل دمایی (۳۵ °C) در ۹۴ ثانیه است.

اتصال فرم فعال ویتامین D (کلسی‌تریول) به گیرنده آن اثرات پلیوتروپیک بسیاری را در بر دارد از جمله: تنظیم متابولیسم کلسیم و فسفات، تقسیم سلولی، تمایز، آپوپتوز (مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی)، آژیوژنز و متاباستاز سلولی. بنابراین کلسی‌تریول می‌تواند به عنوان یک عامل بسیار مهم پاسخ‌های ضد سرطانی مطرح باشد.^۹ مطالعات بسیاری اثرات ضد سرطانی ویتامین D را در سرطان‌های پروستات، پستان، کولون و تومورهای اندوکرین نشان داده‌اند. مهار تکثیر سلولی و القای تمایز سلولی به همراه القای آپوپتوز و مهار آژیوژنز بازووهای اصلی ضد سرطانی ویتامین D به حساب می‌آیند.^{۱۰-۱۹}

ویتامین D اثرات ضد سرطانی خود را از طریق اتصال فرم فعال آن به گیرنده ویتامین D که عضوی از گیرنده‌های استروئید/تیروئید-ریتینوئیک اسید و جزء سوپر فامیلی گیرنده‌های هسته‌ای محسوب می‌شود اعمال می‌کند.^{۱۱} در پستانداران، بیان گیرنده ویتامین D در بافت‌های متابولیک از جمله روده، کلیه، پوست و غده تیروئید بالا بوده و در سایر بافت‌ها بیان به نسبت متوسطی دارد. همچنین گیرنده ویتامین D به میزان زیادی در بافت‌های سرطانی از جمله کولون، پستان و پروستات بیان می‌شود.^{۱۲} عملکرد این گیرنده هسته‌ای به واسطه بودن چندین پلیمورفیسم ژنتیکی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.^{۱۳} چندین پلیمورفیسم در ایترون‌ها و اگزون‌های مختلف ژن گیرنده ویتامین D شناسایی شده است از جمله کولون، FokI در اگزون ۲ و TaqI در اگزون ۹، که هر کدام از این پلیمورفیسم‌ها تغییراتی را در عملکرد پروتین یا بیان گیرنده ویتامین D اعمال می‌نمایند.^{۱۴-۱۶} FokI در قسمت ۵ و سه پلیمورفیسم دیگر در ۳ ژن گیرنده ویتامین D قرار دارد.^{۱۷} از طرف دیگر ارتباط بین پلیمورفیسم‌های ژن گیرنده ویتامین D و ریسک ابتلا به سرطان‌های مختلف توسط مطالعات زیادی نشان داده شده است.^{۱۸-۲۱} همچنین ارتباط بین پلیمورفیسم ژن‌هایی از جمله RET, PI3K/AKT و سرطان مدولاری تیروئید در مطالعات پیشین مشخص شده است.^{۲۲-۲۸}

Tru9I-rs757343) در جدول ۱ آورده شده است. محصولات جهت انجام تعیین توالی بر اساس پرایمر Forward در میکروتیپ‌های ۱/۵ ml به کشور کره جنوبی ارسال گردید. Chromas ver. 2.4.3 (Technelysium Pty Ltd, South Brisbane, Australia) تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جهت اطمینان از وجود تغییر تک (National Center for Biotechnology Information, NCBI) استفاده شد. (Basic local alignment search tool, BLAST) کردن قرار گرفته (شکل ۱).

دنا توراسیون، ۱ دقیقه در ۶۰/۵°C برای واکنش Annealing ۴۵ ثانیه در ۷۲°C برای واکنش Extension ۱۰ دقیقه در ۷۲°C برای Final Extension) ۱۰ دقیقه در دمای ۹۴°C به منظور دنا توراسیون اولیه، TC-XP-E, Bioneer, Thermal cycler (China) به انجام رسید. در تمامی مراحل انجام کار میکروتیپ‌ها در ظرف حاوی یخ قرار گرفته بودند. به منظور تایید تکیه DNA مورد نظر از ژل پلی‌اکریل آمید (۰.۸٪) ولتاژ ۲۰۰، مدت زمان ۹۰ دقیقه و رنگ‌آمیزی نیترات نقره، استفاده گردید. توالی پرایمرهای مورد استفاده برای تکیه قطعات 339bp (FokI- rs2228570) 237bp (BsmI- rs1544410 A>G) و



شکل ۱) شکل‌های (الف-ب) نتیجه تعیین توالی DNA در ناحیه اگزون ۲ ژن گیرنده ویتامین D را نشان می‌دهد. پیک مشخص شده در شکل (الف) توالی DNA طبیعی و پیک مشخص شده در شکل (ب) تغییر نوکلئوتیدی مورد انتظار (Fok- rs2228570 T>C) را که به صورت هتروزیگوت می‌باشد نشان می‌دهد. شکل‌های (ج-د) و (ه-و) نتیجه تعیین توالی DNA در ناحیه ایترون ۸ ژن گیرنده ویتامین D را نشان می‌دهد. پیک مشخص شده در شکل (ج) و (ه) توالی DNA طبیعی و پیک مشخص شده در شکل (د) و (و) تغییر نوکلئوتیدی مورد انتظار (Tru9I- rs757343 A>G) را که به صورت هتروزیگوت می‌باشد نشان می‌دهد.

آنالیزهای آماری در مورد پلی مورفیسم‌های FokI و BsmI تفاوت معناداری را در هیچ یک از ژنتوپیپ‌ها نشان نداد ($P=0.953$, $n=502$).

در پلی مورفیسم Tru9I فراوانی ژنتوپیپ Tt در گروه تست در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری را از لحاظ آماری نشان داد ($P=0.006$). فراوانی، نسبت شانس و مقدار ژنتوپیپ‌ها در جدول ۲ آورده شده است. آنالیز آماری نشان داد توزیع فراوانی پلی مورفیسم‌های ژن گیرنده ویتامین D در جمعیت مورد مطالعه در تعادل Hardy-Weinberg قرار دارد ($P=0.327$).

فراوانی آللی t در بین گروه تست و کنترل از لحاظ آماری تفاوت معناداری را نشان داد ($P=0.006$). فراوانی، نسبت شانس و مقدار آلل‌ها در جدول ۳ آورده شده است.

نتایج حاصل از بررسی سطح سرمی ویتامین D با استفاده از

اندازه‌گیری ۲۵-هیدروکسی ویتامین D در پلاسمای بیماران مبتلا به سرطان مدولاری تیرویید و گروه کنترل، توسط کیت الایزا (Calbiotec, Austin, USA) و بر اساس دستور کار شرکت سازنده انجام گرفت. برای مقایسه سطح سرمی ویتامین D دو گروه مورد و کنترل، از آزمون Mann-Whitney و برای آنالیز پلی مورفیسم در گروه تست و کنترل از Chi-square test استفاده گردید. توزیع فراوانی پلی مورفیسم‌های ژن گیرنده ویتامین D برای بررسی تعادل Hardy-Weinberg از Chi-square test (GraphPad Prism, version 5 SPSS (GraphPad Software, Inc., San Diego, CA, USA) و software, version 20 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA) تجزیه و تحلیل گردید و $P<0.05$ معنادار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

بر اساس یافته‌های این مطالعه، از ۸۰ نمونه، ۴ بیمار مبتلا به سرطان مدولاری تیرویید (متوسط سن ۳۶ سال) به عنوان گروه مورد و ۴۰ مورد گروه کنترل (متوسط سن ۳۳ سال) بوده‌اند که آنالیز آماری نشان داد میانگین سنی در دو گروه مورد و کنترل اختلاف معناداری ندارد. توزیع بیماران بر اساس جنسیت در گروه مورد و به صورت همسان‌سازی شده در گروه کنترل، شامل ۲۳ زن و ۱۷ مرد بودند.

جدول ۱: توالی پرایمرهای مورد استفاده برای PCR ژن گیرنده ویتامین D

توالی پرایمرهای مورد استفاده		FokI
F:5-GATGCCAGCTGGCCCTGGCA-3	R:5-ATGGAAACACCTTGCTTCTT-3	
F:5-CAGAGTGTGCAGGGG-3	R:5-CCCTTTGGACCTCATCAC-3	Tru9I و BsmI

جدول ۲: فراوانی ژنتوپیپ پلی مورفیسم‌های FokI و BsmI و Tru9I در دو گروه تست و کنترل

پلی مورفیسم	ژنتوپ	بیمار (تعداد ۴۰)	کنترل (تعداد ۴۰)	P*	نسبت شانس (حدود اطمینان ۹۵%)
FokI	FF	۱۰/۲۵	۳/۷/۵		ژنتوپیپ مرجع
	Ff	۱۲/۳۰	۱۲/۳۰	۰/۸۷۶	۱/۰۸(۰/۴۱-۲/۸۴)
BSMI	ff	۲۷/۶۷/۵	۲۵/۶۲/۵	۰/۶۱	۳/۲۴(۰/۳۲-۳۳/۲۲)
	BB	۲۳/۵۷/۵	۱۶/۴۰/۰		ژنتوپیپ مرجع
Tru9I	Bb	۱۱/۲۷/۵	۲۰/۵۰/۰	۰/۵۰۲	۲/۶۱(۰/۹۸-۶/۹۲)
	bb	۶/۱۵/۰	۴/۱۰/۰	۰/۹۵۳	۰/۹۶(۰/۲۳-۳/۹۵)
	TT	۲۱/۵۲/۵	۳۳/۸۲/۵		ژنتوپیپ مرجع
	Tt	۱۸/۴۵/۰	۷/۱۷/۵	۰/۰۰۶	۰/۲۴(۰/۰۹-۰/۶۹)
	tt	۱/۵/۰	۰/۰/۷	۰/۲۱۷	-

*آزمون آماری: $P<0.05$ معنادار در نظر گرفته شد.

جدول ۳: فراوانی آلی پلی مورفیسم‌های FokI، BsmI و Tru9I در دو گروه مورد و کنترل

پلی مورفیسم	ژنوتیپ	بیمار (تعداد=۴۰)	کنترل (تعداد=۴۰)	P*	نسبت شانس (حدود اطمینان ۹۵٪)
FokI	F	۱۴٪/۲۲٪	۱۸٪/۲۲٪	۰/۴۲۹	ژنوتیپ مرجع ۱/۳۷(۰/۶۳-۲/۹۸)
	f	۶۶٪/۸۲٪	۶۲٪/۷۷٪		ژنوتیپ مرجع ۱/۳۳(۰/۶۸-۲/۶۰)
BSMI	B	۵۷٪/۷۱٪	۵۲٪/۶۵٪	۰/۳۹۶	ژنوتیپ مرجع ۱/۳۳(۰/۱۱-۰/۷۳)
	b	۲۳٪/۲۸٪	۲۸٪/۳۵٪		ژنوتیپ مرجع ۰/۰۰۶
Tru9I	T	۶۰٪/۷۵٪	۷۳٪/۹۱٪	۰/۰۰۶	ژنوتیپ مرجع ۰/۰۰۶
	t	۲۰٪/۲۵٪	۷٪/۸٪		ژنوتیپ مرجع ۱/۳۷(۰/۶۳-۲/۹۸)

آزمون آماری: Chi-square test: $P<0.05$ معنادار در نظر گرفته شد.

ارتباطی معناداری را بین پلی مورفیسم‌های Tru9I، ApaI و BsmI نشان نداد، ولی در فراوانی آلی پلی مورفیسم Tru9I تفاوت معناداری بین گروه بیمار و کنترل مشاهده شده بود.^{۳۰}

بررسی پلی مورفیسم‌های ApaI، TaqI، BsmI و Tru9I در سرطان‌های مختلفی از جمله سرطان پروستات، پستان، تخمدان و ملانوما ارتباط معناداری را با افزایش ریسک ابتلاء نشان داده‌اند.^{۳۱-۳۵} در مقابل، مطالعات دیگر ارتباط معناداری را بین این پلی مورفیسم‌ها با سرطان تخمدان و پروستات مشاهده نکرده‌اند.^{۳۶}

در مطالعه حاضر سطح سرمی ۲۵-هیدروکسی ویتامین D برخلاف انتظار در گروه بیمار در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری بالاتر بود. در حالیکه مطالعات بسیاری ارتباط معکوسی را بین سطح سرمی ویتامین D و سرطان‌های مختلف از جمله، سرطان کولون،^{۳۸} سرطان پستان،^{۳۹} پروستات^{۴۰} و سرطان تیروئید نوع فولیکولار و پاپیلاری^{۴۱} گزارش کرده بودند. با این وجود شواهد اپیdemiolوژیک موجود نتایج محدود و بحث‌انگیزی را در مورد این ارتباط مطرح می‌نمایند.^{۴۰-۴۳}

در مطالعه‌ای که اثر ویتامین D را بر روی سل لاین‌های سرطانی مختلف مورد بررسی قرار داده بود، مشاهده گردید که افزودن ویتامین D به کشت سلولی اکثر سلول‌های سرطانی اثر مهاری بر تکثیر آن‌ها دارد، برخلاف انتظار افزودن ویتامین D به رده سلولی سرطان مدولاری تیروئید (سلول‌های TT) به طور قابل توجهی باعث افزایش تکثیر سلولی و مهار ترشح کلستیونین گشته و ۴/۸ برابر سترز DNA و

تکنیک الایزا نشان داد میانگین سطح سرمی ویتامین D در گروه تست ۲۳/۳۲ ng/ml و گروه کنترل ۱۸/۹۵ ng/ml بوده و این اختلاف از لحاظ آماری معنادار می‌باشد ($P=0.02$).

بحث

در مطالعه حاضر، در بررسی پلی مورفیسم‌های FokI و BsmI هیچکدام از ژنوتیپ‌ها و آل‌های مورد بررسی با ریسک ابتلا به سرطان مدولاری تیروئید ارتباط معناداری را نشان نداد. بررسی پلی مورفیسم Tru9I-rs757343 نشان داد که ژنوتیپ هتروزیگوت موتانت (Tt) در گروه مبتلا به سرطان مدولاری تیروئید در مقایسه با گروه کنترل تفاوت آماری معناداری را نشان می‌دهد و بررسی آل‌ها نشان داد، آلل t به طور معناداری ریسک سرطان مدولاری تیروئید را افزایش می‌دهد.

در مطالعه مشابه که پلی مورفیسم‌های گیرنده ویتامین D را در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید نوع فولیکولار و پاپیلاری مورد ارزیابی قرار داده بود، نتایج حاصل ارتباط معناداری را بین پلی مورفیسم‌های ApaI و FokI با سرطان فولیکولار تیروئید و نه نوع پاپیلاری آن نشان داد و پلی مورفیسم‌های BsmI و TaqI ارتباط معناداری را در هیچکدام از دو نوع سرطان تیروئید بررسی شده نشان نداد.^{۴۲} در مطالعه مشابه دیگری بر روی جمعیت ایرانی مبتلا به سرطان تیروئید نوع فولیکولار و پاپیلاری، نتایج به دست آمده هیچ

در رژیم غذایی این افراد به احتمال تاثیر مثبتی بر روند درمان این بیماران نخواهد داشت. پلی‌مورفیسم Tru9I با استعداد ابتلا به سرطان مدولاری تیروپید ارتباط معناداری را نشان داد.

سپاسکزاری: این مقاله بخشی از پایان‌نامه تحت عنوان "بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D و پلی‌مورفیسم‌های (FokI-rs2228570, BsmI-rs1544410 و rs757343) گیرنده آن با سرطان مدولاری تیروپید، در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۹۵-۹۶ می‌باشد که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل اجرا شده است. همچنین مولفین از حمایت پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قدردانی می‌نمایند.

بیان ژن C-myc (افزایش بیان این ژن با سرطانی شدن ارتباط دارد) را افزایش داد.^۴ این نتایج تا حدودی می‌تواند تناظر حاصل در سطح سرمی ویتامین D مطالعه حاضر با مطالعات دیگر را توجیه نماید. با این وجود از آنجایی که این مطالعه برای اولین بار بر روی بیماران مبتلا به سرطان مدولاری انجام گرفته است و محدودیت نمونه به دلیل پایین بودن نرخ شیوع این نوع سرطان، به مطالعات جامع‌تر با تعداد نمونه بیشتر برای تایید نتایج حاصل از این مطالعه ضروری می‌باشد.

از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که برخلاف انتظار، سطح ویتامین D سرمی در بیماران مبتلا به سرطان مدولاری تیروپید در مقایسه با افراد سالم بالاتر بوده و افزایش میزان ویتامین D خوراکی

References

- Nikiforov YE. Molecular diagnostics of thyroid tumors. *Arch Pathol Lab Med* 2011;135(5):569-77.
- Patel SS, Goldfarb M. Well-differentiated thyroid carcinoma: the role of post-operative radioactive iodine administration. *J Surg Oncol* 2013;107(6):665-72.
- Shah JP. Exploiting biology in selecting treatment for differentiated cancer of the thyroid gland. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2008;265(10):1155-60.
- Nozhat Z, Hedayati M, Azizi F. Thyroid Cancer Epidemic: A Peril or an Alarm? *Int J Endocrinol Metab* 2015;13(4):e28491.
- Lang BH, Chow SM, Lo CY, Law SC, Lam KY. Staging systems for papillary thyroid carcinoma: a study of 2 tertiary referral centers. *Ann Surg* 2007;246(1):114-21.
- Ghazi AA, Bagheri M, Tabibi A, Sarvghadi F, Abdi H, Hedayati M, et al. Multiple endocrine neoplasia type 2A in an Iranian family: clinical and genetic studies. *Arch Iran Med* 2014;17(5):378-82.
- Jameson JL, Anthony PW. Disorders of thyroid gland. In: Kasper DL, Fauci AS, Longo DL, Braunwald E, Hauser SL, Jameson LJ, editors. Harrison's Principle of Internal Medicine. 16th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2005. p. 2123.
- Mehta RG, Mehta RR. Vitamin D and cancer. *J Nutr Biochem* 2002;13(5):252-64.
- Ordonez-Moran P, Larriba MJ, Pendas-Franco N, Aguilera O, Gonzalez-Sancho JM, Munoz A. Vitamin D and cancer: an update of in vitro and in vivo data. *Front Biosci* 2005;10:2723-49.
- Slattery ML. Vitamin D Receptor Gene (VDR) Associations with Cancer. *Nutr Rev* 2007;65(8 Pt 2):S102-S104.
- Carlberg C, Dunlop TW. The impact of chromatin organization of vitamin D target genes. *Anticancer Res* 2006;26(4A):2637-45.
- Haußler MR1, Jurutka PW, Mizwicki M, Norman AW. Vitamin D receptor (VDR)-mediated actions of 1 α ,25(OH)₂vitamin D: genomic and non-genomic mechanisms. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab* 2011;25(4):543-59.
- Buttigliero C, Monagheddu C, Petroni P, Saini A, Dogliotti L, Ciccone G, et al. Prognostic role of vitamin d status and efficacy of vitamin D supplementation in cancer patients: a systematic review. *Oncologis* 2011;16(9):1215-27.
- Hutchinson PE, Osborne JE, Lear JT, Smith AG, Bowers PW, Morris PN, et al. Vitamin D receptor polymorphisms are associated with altered prognosis in patients with malignant melanoma. *Clin Cancer Res* 2000;6(2):498-504.
- Ntais C, Polycarpou A, Ioannidis JP. Vitamin D receptor gene polymorphisms and risk of prostate cancer: a meta-analysis. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2003;12(12):1395-402.
- Ye WZ, Reis AF, Velho G. Identification of a novel Tru9 I polymorphism in the human vitamin D receptor gene. *J Hum Genet* 2000;45(1):56-7.
- Kostner K, Denzer N, Muller CS, Klein R, Tilgen W, Reichrath J. The relevance of vitamin D receptor (VDR) gene polymorphisms for cancer: a review of the literature. *Anticancer Res* 2009;29(9):3511-36.
- Peters U, McGlynn KA, Chatterjee N, Gunter E, Garcia-Closas M, Rothman N, et al. Vitamin D, calcium, and vitamin D receptor polymorphism in colorectal adenomas. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2001;10(12):1267-74.
- Sillanpaa P, Hirvonen A, Kataja V, Eskelinen M, Kosma VM, Uusitupa M, et al. Vitamin D receptor gene polymorphism as an important modifier of positive family history related breast cancer risk. *Pharmacogenetics* 2004;14(4):239-45.
- Valdivielso JM, Fernandez E. Vitamin D receptor polymorphisms and diseases. *Clin Chim Acta* 2006;371(1-2):1-12.
- Penna-Martinez M, Ramos-Lopez E, Stern J, Hinsch N, Hansmann ML, Selkiski I, et al. Vitamin D receptor polymorphisms in differentiated thyroid carcinoma. *Thyroid* 2009;19(6):623-8.
- Hedayati M, Zarif Yeganeh M, Sheikholeslami S, Afsari F. Diversity of mutations in the RET proto-oncogene and its oncogenic mechanism in medullary thyroid cancer. *Crit Rev Clin Lab Sci* 2016;53(4):217-27.
- Nozhat Z, Hedayati M. PI3K/AKT Pathway and Its Mediators in Thyroid Carcinomas. *Mol Diagn Ther* 2016;20(1):13-26.
- Yeganeh MZ, Sheikholeslami S, Hedayati M. RET proto oncogene mutation detection and medullary thyroid carcinoma prevention. *Asian Pac J Cancer Prev* 2015;16(6):2107-17.

25. Yeganeh MZ, Sheikholeslami S, Dehbashi Behbahani G, Farashi S, Hedayati M. Skewed mutational spectrum of RET proto-oncogene Exon10 in Iranian patients with medullary thyroid carcinoma. *Tumour Biol* 2015;36(7):5225-31.
26. Sheikholeslami S, Zarif Yeganeh M, Hoghooghi Rad L, Golab Ghadaksaz H, Hedayati M. Haplotype Frequency of G691S/S904S in the RET Proto-Onco-gene in Patients with Medullary Thyroid Carcinoma. *Iran J Public Health* 2014;43(2):235-40.
27. Hedayati M, Zarif Yeganeh M, Sheikholeslami S, Rezghi Barez S, Hoghooghi Rad L, Azizi F. Predominant RET Germline Mutations in Exons 10, 11, and 16 in Iranian Patients with Hereditary Medullary Thyroid Carcinoma. *J Thyroid Res* 2011;2011:264248.
28. Alvandi E, Akrami SM, Chiani M, Hedayati M, Nayer BN, Tehrani MR, et al. Molecular analysis of the RET proto-oncogene key exons in patients with medullary thyroid carcinoma: a comprehensive study of the Iranian population. *Thyroid* 2011;21(4):373-82.
29. Miller SA, Dykes DD, Polesky HF. A simple salting out procedure for extracting DNA from human nucleated cells. *Nucleic Acids Res* 1988;16(3):12-5.
30. Haghpanah V, Ghaffari SH, Rahimpour RP, Abbasi A, Saeedi M, Pak H, et al. Vitamin D receptor gene polymorphisms in patients with thyroid cancer. *Gene Ther Mol Biol* 2007;11:299-304.
31. Cheteri MB, Stanford JL, Friedrichsen DM, Peters MA, Iwasaki L, Langlois MC, et al. Vitamin D receptor gene polymorphisms and prostate cancer risk. *Prostate* 2004;59(4):409-18.
32. Lurie G, Wilkens LR, Thompson PJ, McDuffie KE, Carney ME, Terada KY, et al. Vitamin D receptor gene polymorphisms and epithelial ovarian cancer risk. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2007;16(12):2566-71.
33. Gapska P, Scott RJ, Serrano-Fernandez P, Huzarski T, Byrski T, Kladny J, et al. Vitamin D receptor variants and breast cancer risk in the Polish population. *Breast Cancer Res Treat* 2009;115(3):629-33.
34. Sinotte M, Rousseau F, Ayotte P, Dewailly E, Diorio C, Giguère Y, et al. Vitamin D receptor polymorphisms (FokI, BsmI) and breast cancer risk: association replication in two case-control studies within French Canadian population. *Endocr Relat Cancer* 2008;15(4):975-83.
35. Barroso E, Fernandez LP, Milne RL, Pita G, Sendagorta E, Floristan U, et al. Genetic analysis of the vitamin D receptor gene in two epithelial cancers: melanoma and breast cancer case-control studies. *BMC Cancer* 2008;8:385.
36. Clendenen TV, Arslan AA, Koenig KL, Enquist K, Wirgin I, Agren A, et al. Vitamin D receptor polymorphisms and risk of epithelial ovarian cancer. *Cancer Lett* 2008;260(1-2):209-15.
37. Oakley-Girvan I, Feldman D, Eccleshall TR, Gallagher RP, Wu AH, Kolonel LN, et al. Risk of early-onset prostate cancer in relation to germ line polymorphisms of the vitamin D receptor. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2004;13(8):1325-30.
38. Gorham ED, Garland CF, Garland FC, Grant WB, Mohr SB, Lipkin M, et al. Optimal vitamin D status for colorectal cancer prevention: a quantitative meta analysis. *Am J Prev Med* 2007;32(3):210-6.
39. Rohan T. Epidemiological studies of vitamin D and breast cancer. *Nutr Rev* 2007;65(8 Pt 2):S80-3.
40. Giovannucci E. Strengths and limitations of current epidemiologic studies: vitamin D as a modifier of colon and prostate cancer risk. *Nutr Rev* 2007;65(8 Pt 2):S77-9.
41. Baier R, Grauer A, Lazaretti-Castro M, Ziegler R, Raue F. Differential effects of 1,25-dihydroxyvitamin D₃ on cell proliferation and calcitonin gene expression. *Endocrinology* 1994;135(5):2006-11.

Association of vitamin D levels and receptor gene polymorphisms with medullary thyroid cancer

Mehrnoosh Ramezani M.Sc.¹
Mehdi Hedayati Ph.D.²
Saeed Hoseini Asl Ph.D.¹
Meraj Tabatabaei M.Sc.³
Mohammad Mazani Ph.D.^{1*}
Shirzad Nasiri Ph.D.⁴

1- Department of Biochemistry,
School of Medicine, Ardabil
University of Medical Science,
Ardabil Iran.

2- Cellular and Molecular Research
Center, Research Institute for En-
docrine Sciences, Shahid Beheshti
University of Medical Sciences, Te-
hran, Iran.

3- Department of Immunology,
School of Medicine, Shahid Be-
heshti University of Medical Sci-
ences, Tehran, Iran.

4- General Surgery and Cancer,
Associate Professor of Tehran Uni-
versity of Medical Sciences, Sharia-
ti Hospital, Tehran, Iran.

Abstract

Received: 13 Jun. 2016 Revised: 04 Sep 2016 Accepted: 09 Sep 2016 Available online: 10 Sep 2016

Background: Thyroid cancer is the most common endocrine malignancy. Accounting for approximately 1-2% of all cancers. Thyroid cancers have been divided into four main types: papillary, follicular, medullary and anaplastic. The active form of vitamin D (1,25- (OH) 2-vitamin D3) by binding to its receptor, using genomic and non-genomic mechanisms inhibits the proliferative effect of TSH on thyroid cells. Therefore, vitamin D may have a role in regulating of thyroid gland cell proliferation. Many studies have shown anti-cancer effects of vitamin D in cancers. Polymorphisms of Vitamin D receptor can influence the prevalence to various cancers. In the present study, serum level of vitamin D and FokI, BsmI and Tru9I polymorphism of vitamin D receptor was investigated.

Methods: This case-control study was performed in the summer of 2015 in Endocrinology and Metabolism Center of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Forty medullary thyroid cancer patients and 40 healthy controls were investigated. Genomic DNA of subjects was extracted with saturated salt/proteinase K and polymorphisms of vitamin D receptor gene investigated by polymerase chain reaction-sequencing. Serum level of vitamin D evaluated by ELISA technique. The results were analyzed by SPSS, ver. 20 (Chicago, IL, USA) and GraphPad Prism, ver. 5 (GraphPad, Inc., CA, USA) softwares.

Results: Genotypic and allelic abundance of FokI and BsmI polymorphisms between test and control groups have not shown significant different. In Tru9I polymorphism, Tt genotype abundance in test group were 45 percent and in control group were 17.5 percent and t allelic abundance in test group were 25 percent and in control group were 8.7 percent which this different were significant. Average serum level of vitamin D in test group was 23.32 ng/ml and in control group was 18.95 ng/ml which was statistically significant.

Conclusion: Unexpectedly, serum levels of vitamin D in test group were higher than control group. Tru9I polymorphism is significantly correlated to medullary thyroid carcinoma prevalence.

Keywords: case-control studies, polymorphism, thyroid neoplasms, vitamin D, vitamin D receptor.

* Corresponding author: Department of Biochemistry, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
Tel: +98- 045-33510052
E-mail: m.mazani@arums.ac.ir