

مقایسه تأثیر هپارین با وزن مولکولی پایین با هپارین غیر فراکشن در درمان بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد بدون بالا رفتن قطعه ST: کارآزمایی بالینی تصادفی

چکیده

امیر فرنگ زند پارسا*

حمیرا جعفری

غلامحسین طباطبایی

گروه قلب

دانشگاه علوم پزشکی تهران

زمینه و هدف: بیماریهای عروقی کرونر از شایع‌ترین علل مرگ در جهان می‌باشد. با توجه به شیوع بالاتر سندرم کرونری حاد بدون بالا رفتن قطعه ST نسبت به سندرم کرونری حاد با بالا رفتن قطعه ST و ظهور هپارین با وزن مولکولی پایین (Low Molecular Weight Heparin (L.MWH) که موفقیتی بزرگ در عالم پزشکی محسوب می‌گردد در این مطالعه به مقایسه اثر انوکسپارین و هپارین غیر فراکشن (UFH) در بیماران سندرم کرونری حاد بدون بالا رفتن قطعه ST پرداخته شده است. روشن پرسی: ۲۰۰ بیمار شامل ۱۰۰ بیمار در گروه هپارین و ۱۰۰ بیمار در گروه انوکسپارین انتخاب گردیدند. گروه هپارین تحت درمان با UFH، ابتدا دوز بولوس ۵۰۰۰ واحد، سپس ۱۰۰۰ واحد در ساعت به صورت وریدی برای حداقل ۷۲ ساعت و گروه انوکسپارین تحت درمان با ۱mg/kg انوکسپارین هر ۱۲ ساعت در روز به صورت زیر جلدی برای حداقل ۷۲ ساعت قرار گرفتند. سپس بیماران از نظر میزان مرگ و میر کلی، انفارکتوس میوکارد، آثین صدری تکرار شونده، نیاز به اقدامات تهاجمی و میزان خونریزی مورد پیگیری و مقایسه قرار گرفتند. یافته‌ها: میزان فراوانی آثین صدری تکرار شونده، مرگ و میر کلی و نیاز به اقدامات تهاجمی در طول مدت بستری در بیمارستان در گروه دریافت‌کننده انوکسپارین به طور معنی‌داری نسبت به گروه دریافت‌کننده هپارین کمتر بود (به ترتیب $p=0.02$ و $p=0.35$ و $p=0.01$). اما از نظر میزان فراوانی خونریزی و میزان فراوانی انفارکتوس میوکارد در بین دو گروه تقاضوت معنی‌داری مشاهده نشد (به ترتیب $p=1$ و $p=1$). نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که انوکسپارین با توجه به اثرات چشمگیری که در پیشگیری از عوارض در بیماران سندرم کرونری حاد بدون بالا رفتن قطعه ST دارد می‌تواند به عنوان داروی جایگزین هپارین مطرح گردد.

کلمات کلیدی: انوکسپارین، هپارین با وزن مولکولی پایین، هپارین غیر فراکشن، سندرم حاد کرونری بدون بالا رفتن

قطعه ST.

مقدمه

در دهه اخیر با وجود کاهش چشمگیر مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی - عروقی در کشورهای پیشرفته، این بیماری‌ها هنوز از جدی‌ترین خطرها برای سلامت بشر و از علل عمدۀ مرگ و میر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه می‌باشد.^۱ نظری بر آمار، اهمیت پیشگیری و درمان بیماری‌های ایسکمیک قلب را آشکار می‌سازد. به همین سبب شعار سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۲ "قلب ریتم زندگی را می‌نوازد" بود. سندرم کرونری حاد بدون بالا رفتن قطعه ST، Non ST Elevation Acute Coronary Syndrome (NSTEACS) از شیوع بالاتری نسبت به سندرم کرونری حاد با

۱mg/kg دو بار در روز به صورت زیر جلدی برای مدت حداقل ۷۲ ساعت دریافت نمودند. الکتروکاردیوگرام(ECG)، Complete Blood Count (CBC)، پلاکت، Partial Thromboplastin Time (PTT) به صورت روزانه در این بیماران اندازه‌گیری شد. شدت خونریزی براساس معیارهای TIMI trial در طی ۲۴ ساعت بعد از شروع درمان تعیین گردید. خونریزی مژوثر شامل افت هموگلوبین بیش از ۵ gr/dl با یا بودن محل مشخص بدون ارتباط با CABG، خونریزی ایتراکرانیال یا تامپوناد قلبی و خونریزی مینور شامل افت هموگلوبین بیش از ۳gr/dl و کمتر از ۵gr/dl با یک محل مشخص یا به صورت هماچوری گروس خودبخودی یا هماتمز یا هموپیزی تعریف می‌گردد. پس از پایان جمع‌آوری اطلاعات، تمامی اطلاعات وارد بانک اطلاعاتی برنامه رایانه‌ای SPSS ویراست ۱۱/۵ گردید و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش Paired t-test استفاده شد.

یافته‌ها

از نظر خصوصیات دموگرافیک بیشترین فراوانی بیماران از نظر سنی در گروه سنی ۴۱-۶۰ سال بود که به ترتیب در گروه تحت درمان با UFH ۶۱ مورد (۶۱٪) و در گروه انوکسایپارین ۵۴ مورد (۵۴٪) بودند. در مورد جنس بیماران مورد مطالعه در گروه تحت درمان با UFH، ۳۸ مورد (۳۸٪) از بیماران جنس مونث و ۶۲ مورد (۶۲٪) جنس مذکر بودند که در گروه انوکسایپارین ۴۲ مورد (۴۲٪) مونث و ۵۸ مورد (۵۸٪) مذکر بودند که از نظر آماری اختلاف معنی داری در سن و جنس بیماران در دو گروه مشاهده نشد ($p=0.2$). از نظر فراوانی سابقه Ischemic Heart Disease (IHD) در بیماران مورد مطالعه، در گروه تحت درمان با UFH، ۸۸ مورد (۸۸٪) سابقه IHD داشتند که از این تعداد ۵۰ مورد (۵۶٪) سابقه دردهای آنژینی، ۱۵ مورد (۱۷٪) سابقه انفارکتوس میوکارد و ۲۳ مورد (۲۶٪) هم سابقه دردهای آنژینی و هم سابقه انفارکتوس میوکارد را داشتند. در گروه تحت درمان با انوکسایپارین ۸۷ مورد (۸۷٪) سابقه IHD داشتند که ۵۹ مورد (۶۷٪) سابقه دردهای آنژینی، ۹ مورد (۱۰٪) سابقه انفارکتوس میوکارد و ۱۹ مورد (۲۱٪) سابقه دردهای آنژینی و انفارکتوس میوکارد را همزمان داشتند. از نظر آماری از نظر سابقه IHD در دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت (به ترتیب $p=0.27$ و $p=0.16$ و $p=0.18$). در مورد سابقه قبلی

مقایسه اثر LMWH (انوکسایپارین) و Unfractionated Heparin (UFH) در کاهش عود دردهای آنژینی، فراوانی انفارکتوس میوکارد و نورتالیتی و نیاز به رواسکولاریزاسیون در بیماران NSTEACS مراجعه کننده به بیمارستانهای امام خمینی و شریعتی تهران در طی مهر ماه ۱۳۸۳ لغایت مهر ۱۳۸۴ پرداخته شود.

روش بررسی

این مطالعه از نوع مطالعه آینده‌نگر بالینی - تصادفی می‌باشد که جمعیت مورد مطالعه بیماران با تشخیص NSTEACS می‌باشند که در طی مهر ماه ۸۳ لغایت مهر ماه ۸۴ در بیمارستان امام خمینی و شریعتی تهران بستری شده‌اند. بیماران با دردهای طولانی مدت بیشتر یا مساوی ۲۰ دقیقه یا حملات تکرار شونده آنژین در هنگام استراحت یا شروع درد با فعالیت کم در طی ۲۴ ساعت گذشته همراه با تغییرات در الکتروکاردیوگرام به صورت افت قطعه ST یا معکوس شدن موج T در ۳ لید یا بیشتر یا افزایش آنژیمهای قلبی به صورت CK مساوی یا بیشتر از دو برابر حد نرمال یا تروپونین مثبت انتخاب گردیدند. بیماران با معیارهای زیر از جمعیت مورد مطالعه حذف شدند: ST Elevation Myocardial Infarction (STEMI) در طی ۴۸ ساعت گذشته، کتراندیکاسیون مصرف آنتی کواگولانت، ترومبوسیتوپنی (پلاکت کمتر از ۱۵۰۰۰ در میلی متر مکعب)، آرژی با عدم تحمل به آسپرین، UFH یا انوکسایپارین و کراتینین سرم بیش از ۲gr/dl. روش جمع‌آوری داده‌ها: ابتدا براساس پرسشنامه‌ای که تنظیم گردید خصوصیات دموگرافیک و کلینیکی بیماران شامل سن، جنسیت، ریسک فاکتورهای بیماری کرونری شامل سیگار، فشارخون، دیس لیپیدمی، بیماری قند، سابقه خانوادگی مثبت بیماری کرونری، سابقه قلبی آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی، سابقه انفارکتوس میوکارد قبلی، Coronary Artery Bypass Graft (CABG) و سایر مصارف آسپرین، انوکسایپارین یا هپارین در طی ۲۴ ساعت قبل از انتخاب و غیره در این پرسشنامه ثبت گردیده است. تمامی بیماران مورد مطالعه آسپرین به میزان ۳۲۵ میلی‌گرم روزانه دریافت نمودند. سپس بر اساس جدول اعداد تصادفی بیماران به دو گروه تقسیم گردیدند. در گروه اول UFH ابتدا دوز بولوس ۵۰۰۰ واحد به صورت وریدی دریافت نموده سپس افزایش ۱۰۰۰ واحد به میزان ۱۰۰۰ واحد در ساعت برای مدت حداقل ۷۲ ساعت ادامه یافت. گروه دوم بیماران انوکسایپارین به میزان

آنژیوگرافی نرمال، در گروه دریافت کننده هپارین ۴۰ مورد در گیری یک رگ، ۴۰ مورد در گیری چند رگ چهار مورد در گیری چند رگ همراه با در گیری LM و ۱۶ مورد آنژیوگرافی نرمال داشتند در حالی که در گروه دریافت کننده انوکسایپارین ۳۰ مورد در گیری یک رگ، ۴۳ مورد در گیری چند رگ و سه مورد در گیری چند رگ همراه با در گیری LM و ۲۴ مورد آنژیوگرافی نرمال داشتند که از نظر یافته‌های آنژیوگرافیک بین دو گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد ($p=0.3$). در مورد پاسخ به درمان از نظر زمانی، به چهار گروه تقسیم گردیدند که شامل: بهبودی کامل درد سینه در طی ۲۴ ساعت، بهبودی کامل درد سینه بین ۲۴–۴۸ ساعت، بهبودی کامل درد سینه بین ۴۸–۷۲ ساعت و عود مکرر دردها، می‌باشد. از لحاظ پاسخ به درمان، در بیماران مورد مطالعه، بین دو گروه اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. میزان عود مکرر دردها در گروه تحت درمان با انوکسایپارین ۱۷٪ در مقابل ۳۹٪ در گروه تحت درمان با UFH بوده است ($p=0.002$). از لحاظ مدت زمان بستره در بیمارستان، به سه گروه زمانی تقسیم گردیدند: ۵–۷ روز، ۸–۱۴ روز و ۱۵–۲۱ روز که از نظر آماری بین دو گروه از نظر مدت زمان بستره در بیمارستان اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید ($p=0.14$). در مورد نیاز به اقدامات تهاجمی، در گروه UFH ۹۹ مورد (۹۹٪) نیاز به آنژیوگرافی کرونر پیدا کردند ولی در گروه انوکسایپارین ۸۴ نفر (۸۴٪) نیاز به انجام آنژیوگرافی کرونر پیدا کردند ($p=0.01$). از لحاظ انجام ریواسکولاریزاسیون در گروه Percutaneous Coronary Intervention (PCI) ۱۷ UFH مورد تحت CABG ۱۶ مورد تحت قرار گرفتند. در حالی که در گروه انوکسایپارین هشت مورد PCI و شش مورد CABG گردیدند. که از نظر آماری تفاوت معنی‌داری بین دو گروه از نظر میزان فراوانی ریواسکولاریزاسیون (CABG, PCI) به نفع انوکسایپارین مشاهده گردید ($p=0.001$). از نظر فراوانی مرگ و میر قلبی اختلاف معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد ($p=1$), اما از نظر میزان فراوانی مرگ و میر کلی تفاوت بین دو گروه معنی‌دار بود، در گروه انوکسایپارین و هپارین، به ترتیب صفر درصد در برابر ۰٪ ($p=0.35$). میزان بروز انفارکتوس میوکارد در هر دو گروه یکسان بود. انفارکتوس میوکارد در طی مدت بستره در هیچ‌کدام از دو گروه رخ نداد ($p=1$). همچنین در هیچ‌کدام از گروه‌های درمانی، خونریزی اعم از مژوزر یا مینور دیده نشد ($p=1$).

آنژیوگرافی، در گروه تحت درمان با UFH، ۲۰ مورد (۲۰٪) و در گروه تحت درمان با انوکسایپارین، ۲۲ مورد (۲۲٪) از بیماران سابقه Coronary Artery Angiography (CAG) قبلی (CAG) را ذکر نمودند (۰٪). از لحاظ سابقه آنژیوپلاستی بیماران گروه UFH ۱۰ مورد (۱۰٪) و گروه انوکسایپارین ۹ مورد (۹٪) سابقه آنژیوپلاستی را ذکر کردند ($p=1$). در مورد فراوانی سابقه CABG در بیماران مورد مطالعه، در گروه تحت درمان با UFH، سه مورد (۳٪) و در گروه تحت درمان با انوکسایپارین پنج مورد (۵٪) سابقه قبلی CABG را داشتند ($p=0.7$). از نظر میزان فراوانی ریسک فاکتورها در دو گروه، پنج ریسک فاکتور مژوزر شامل دیابت قندی، سابقه خانوادگی مثبت، سیگار، فشار خون بالا و دیس لیپیدمی در نظر گرفته شد. در گروه دریافت کننده UFH ۳۱ مورد (۳۱٪) دارای دیابت قندی بودند در حالی که در گروه انوکسایپارین ۲۴ مورد (۲۴٪) دارای دیابت بودند ($p=0.1$). سابقه خانوادگی مثبت در گروه UFH ۱۱ مورد (۱۱٪) و در گروه انوکسایپارین ۱۱ مورد (۱۱٪) بود ($p=1$). ۳۰ مورد (۳۰٪) در گروه انوکسایپارین این میزان هپارین سیگاری بودند در حالی که در گروه انوکسایپارین این میزان ۳۸ مورد (۳۸٪) بود ($p=0.3$) و سابقه فشار خون بالا در گروه هپارین ۳۰ مورد (۳۰٪) و در گروه انوکسایپارین ۴۶ مورد (۴۶٪) بود ($p=0.5$) و بالاخره دیس لیپیدمی در گروه هپارین ۳۰ مورد (۳۰٪) و در گروه انوکسایپارین ۳۴ مورد (۳۴٪) بود ($p=0.7$). بنابراین مشاهده می‌شود که از لحاظ میزان فراوانی ریسک فاکتورهای مژوزر در دو گروه مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری وجود نداشته است (جدول ۱). از نظر مصرف داروهای کمکی که شامل بتابلوکرهای، کلسمیم بلوکرهای، Angiotensin Converting Enzyme (ACE) نیترات‌ها و مهارکننده‌های Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF) تشخیصی غیرتهاجمی (اکوکاردیوگرافی)، میانگین LVEF در گروه UFH ۱۱/۲ و در گروه انوکسایپارین ۴۹/۱±۱۱٪ و در گروه انوکسایپارین از نظر اتفاقی از نظر میزان فراوانی ریسک فاکتورهای مژوزر نشد. (به ترتیب $p=0.9$ و $p=0.7$ و $p=1$). از نظر اقدامات Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF) در گروه UFH ۵۲/۰۵±۹/۱ بود که اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. در تقسیم‌بندی از نظر LVEF به چهار گروه تقسیم شدند. (۰٪). در تقسیم‌بندی از نظر LVEF به چهار گروه تقسیم شدند. LV EF=۳۰–۴۹٪، LV EF=۴۰–۴۹٪، LV EF=۴۰–۴۹٪ و LV EF≤۲۹٪ مقایسه‌ای که از نظر یافته‌های آنژیوگرافیک بین دو گروه صورت گرفت به چهار گروه تقسیم شدند در گیری یک رگ، در گیری چند رگ، در گیری چند رگ همراه با در گیری Left main (LM) و

جدول-۱: خصوصیات دموگرافیک بیماران STEACS درمان شده با هپارین یا انوکسایپرین.

P	نوع درمان	خصوصیات دموگرافیک
	انوکسایپرین	UFH
۰/۲	(٪۵۴)۵۴	(٪۶۱)۶۱
۰/۶	(٪۵۸)۵۸	(٪۶۲)۶۲
۰/۸	(٪۲۲)۲۲	(٪۲۰)۲۰
۱	(٪۹)۹	(٪۱۰)۱۰
۰/۷	(٪۵)۵	(٪۳)۳
۰/۲۷	(٪۶۷/۸)۵۹	(٪۵۶/۸)۵۰
۰/۱۶	(٪۱۰/۳)۹	(٪۱۷/۰۴)۱۵
۰/۱۸	(٪۲۱/۸)۱۹	(٪۲۶/۱)۲۳
۰/۱	(٪۲۴)۲۴	(٪۲۱)۲۱
۱	(٪۱۱)۱۱	(٪۱۱)۱۱
۰/۳	(٪۳۸)۳۸	(٪۳۰)۳۰
۰/۵	(٪۴۶)۴۶	(٪۴۸)۴۸
۰/۷	(٪۳۴)۳۴	(٪۳۰)۳۰

همکارانش صورت گرفته، به مقایسه اثر انوکسایپرین و UFH در ۳۹۱۰ بیمار با تشخیص UA/NSTEMI در طی مدت ۳۵ روز پی گیری پرداخته شده است. در این مطالعه نیز میزان فراوانی ریواسکولاریزاسیون ۱۷/۳٪ در مقایسه با ۱۹/۲٪ (p=۰/۴۸) و میزان مرگ و میر ۱۲/۴٪ در مقایسه با ۱۴/۵٪ (p=۰/۰۴۸) به ترتیب در گروههای انوکسایپرین و UFH بوده است که در این مطالعه نیز تفاوت به نفع انوکسایپرین معنی دار بوده است. در مطالعه‌ای که در سال ۱۹۹۸ توسط Cohen و همکارانش بر روی ۳۱۷۱ بیمار با تشخیص UA/NSTEMI صورت گرفت^۵ نیز دریافتند که در گروه درمان شده با انوکسایپرین میزان مرگ و میر، انفارکتوس میوکارد و نیاز به اقدامات تهاجمی به طور معنی داری نسبت به گروه دریافت‌کننده UFH کمتر بوده است (p=۰/۰۱۹). همچنین در مطالعه Cohen و همکارانش^۶ بر روی ۵۲۵ بیمار با تشخیص UA/NSTEMI، تمامی بیماران آسپیرین روزانه ۱۶۰-۳۲۵ میلی گرم و Tirofiban با دوز ابتدایی ۰/۴mg/kg/min در عرض ۳۰ دقیقه و سپس انفوژیون به میزان ۰/۱ mg/kg/min دریافت نمودند. سپس به صورت تصادفی ۲۱۰ نفر از این بیماران تحت درمان با UFH با دوز بولوس IU ۵۰۰۰ به صورت وریدی و سپس انفوژیون IU ۱۰۰۰ در ساعت برای حداقل ۴۷/۵ ساعت و حداقل ۱۰/۷ ساعت دریافت شدند.

بحث

نتایج به دست آمده از این مطالعه حاکی است که در گروه تحت درمان با انوکسایپرین در مقایسه با گروه دریافت‌کننده UFH، میزان فراوانی آنژین صدری مقاوم به درمان و میزان نیاز به ریواسکولاریزاسیون در طی مدت بستری در بیمارستان به طور قابل توجهی کمتر بوده است ولی از لحاظ میزان فراوانی مرگ و میر قلبی، میزان فراوانی انفارکتوس میوکارد، مدت زمان بستری در بیمارستان و میزان فراوانی خونریزی تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشده است (نمودار ۱). در مطالعه ESSENCE^۷ که توسط Goodman روی ۳۱۷۱ بیمار با تشخیص UA/NSTEMI صورت گرفته، به مقایسه اثر انوکسایپرین و UFH از نظر میزان مرگ و میر و میزان آنژین صدری مقاوم به درمان و تکرار شونده در طی مدت ۱۴ روز پرداخته شده است. میزان مرگ و میر ۱۶/۶٪ در مقایسه با ۱۹/۸٪ (p=۰/۰۱۹) و میزان فراوانی آنژین صدری تکرار شونده ۱۹/۸٪ در مقایسه با ۱۷/۳٪ (p=۰/۰۱۶) به ترتیب در گروه های انوکسایپرین و UFH بوده است. همانطور که مشاهده می شود تفاوت بین دو گروه از نظر میزان فراوانی مرگ و میر و آنژین صدری مقاوم به درمان معنی دار بوده است. همچنین در مطالعه TIMI 11^۸ Antman و

از مطالعه ما مانند مطالعات قبلی^{۳-۵} نشان دهنده کاهش معنی دار در میزان دردهای آثربینی مقاوم به درمان و میزان نیاز به ریواسکولاریزاسیون در گروه انوکسپارین بود. با این تفاوت که در بررسی ما فقط به اختلاف در فراوانی متغیرهای مورد نظر در دوره بستری در بیمارستان بسته شده است. که با توجه به شرایط محیطی یکسان برای بیماران، یافته های مزبور می توانند از خطای آماری کمتری برخوردار باشند. همچنین اثر داروهای آنتی ترومبوتیک در کنترل یا پیشگیری از حوادث مزبور در دوره حاد بیماری است و از طرف دیگر در بیماران با گرفتاری کرونری شدید در دوره بستری ریواسکولاریزاسیون انجام خواهد شد و در بیماران بدون گرفتاری شدید، حوادث بعدی (پس از ترخیص) بستگی به میزان مستعد بودن به پلاکهای آترومویی و چگونگی رژیم درمانی (کنترل ریسک فاکتورها) و درمان پیشگیرانه خواهد داشت، لذا نمی توان آنچه را که در پیشگیری های طولانی مدت تر به دست می آید صرفا به اثر درمان کوتاه مدت آنتی ترومبوتیک (از هر نوع) نسبت داد. بدین لحاظ به نظر می آید یافته های دوران بستری برای مقایسه اثربخشی داروهای مذکور کافی بوده و می تواند از میزان خطای کمتری برخوردار باشد. بر اساس نتایج این مطالعه و اثرات قابل توجه LMWH در کاهش فراوانی آثربین صدری مقاوم به درمان و نیاز به ریواسکولاریزاسیون در مقایسه با UFH در بیماران UA/NSTEMI، این دارو را می توان به عنوان داروی جایگزین UFH در درمان این بیماران توصیه نمود.

References

- Antman E, Braunwald E. Acute myocardial infarction. Braunwald E, Fauci A, Kasper D, Editors. Harrison's principles of internal medicine. 16th ed. New York: Mc Graw Hill; 2005; p. 1434-55.
- Cannon CP, Braunwald E. Unstable angina. Braunwald E, Zipes DP, Libby P. Heart Disease. 7th ed. Philadelphia, PA: Saunders Company; 2001; p: 1243-65.
- Goodman SG, Cohen M, Bigonzi F, Gurinkel EP, Radley DR, Le Iouer V, et al. Randomized trial of low molecular weight heparin (enoxaparin) versus unfractionated heparin for unstable coronary artery disease: one-year results of the ESSENCE Study. Efficacy and Safety of Subcutaneous Enoxaparin in Non-Q Wave Coronary Events. *J Am Coll Cardiol* 2000; 36: 693-8.
- Antman EM, McCabe CH, Gurinkel EP, Turpie AG, Bernink PJ, Salein D, et al. Enoxaparin prevents death and cardiac ischemic events in unstable angina/non-Q-wave myocardial infarction. Results of the thrombolysis in myocardial infarction (TIMI) 11B trial. *Circulation* 1999; 100: 1593-601.
- Cohen M, Demers C, Gurinkel EP, Turpie AG, Fromell GJ, Goodman S, et al. Low-molecular-weight heparins in non-ST-segment elevation ischemia: the ESSENCE trial. Efficacy and Safety of Subcutaneous Enoxaparin versus intravenous unfractionated heparin, in non-Q-wave Coronary Events. *Am J Cardiol* 1998; 82: 19-24.
- Cohen M, Théroux P, Borzak S, Frey MJ, White HD, Van Mieghem W, et al. Randomized double-blind safety study of enoxaparin versus unfractionated heparin in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndromes treated with tirofiban and aspirin: the ACUTE II study. The Antithrombotic Combination Using Tirofiban and Enoxaparin. *Am Heart J* 2002; 144: 470-7.
- Fonarow GC, Ballantyne CM, Leizorowicz A, Verdun AS, Ahuad Guerrero RA, Elizari M, et al. Comparison of two treatment durations (6 days and 14 days) of a low molecular weight heparin with a 6-day-treatment of unfractionated heparin in the initial management of unstable angina or non Q-wave myocardial infarction. *Eur Heart J* 1999; 20: 1553-62.

Low molecular weight heparin versus Unfractionated heparin in patients with Non ST- elevation acute coronary syndrome: a randomaized clinical trial

Zand parsa A*
Jafari H
Tabatabai A

Department of Cardiology
Tehran University of Medical Sciences.

Abstract

Background: Despite the overwhelming progress that has been accomplished in the prevention of mortality due to cardiovascular disease, coronary artery disease (CAD) is the leading cause of death in the world.

The aim of this study was to compare of the effects of enoxaparin versus unfractionated heparin (UFH) on major clinical events, including mortality, myocardial infarction (MI), and recurrent angina, as well as bleeding in patients with non ST elevation acute coronary syndrome (NSTEACS). We also studied the need for coronary angiography and revascularization (PCI or CABG) in these patients.

Method: Two-hundred patients were enrolled in this study, 100 of whom received intravenous UFH (an initial bolus of 5000 U followed by continuous infusion of 1000 U/h) and 100 received enoxaparin subcutaneous injections of 1mg/kg twice daily for a minimum of 72 h. During their admission we recorded data regarding death, MI, recurrent angina, need for angiography and revascularization, and major and minor bleeding.

Results: The incidence of recurrent angina, total mortality and the need for revascularization were significantly lower in patients receiving enoxaparin compared to those receiving UFH, at 17% vs. 39% ($p=0.002$), 0% vs. 3% ($p=0.035$), 14% vs. 33% ($p=0.001$), respectively. However, there was no significant difference regarding the incidence of MI, major bleeding and cardiac death between the two groups.

Conclusions: This study showed that, in patients with NSTEACS, enoxaparin was superior to UFH regarding the prevention of major in-hospital clinical events, especially recurrent angina and the need for revascularization. We therefore recommend enoxaparin as an alternative antithrombotic agent to UFH in patients with NSTEACS.

Keywords: Enoxaparin, unfractionated heparin, low molecular weight heparin, non ST elevation acute coronary syndrome.

* Corresponding author, Imam Khomeini Hospital, Keshavarz Blvd., Tehran.
Tel: +98-21-66931999
email: zandparsa@tums.ac.ir