

## اثرات سیکلوفسفامید بر تکثیر و بقای سلول‌های رده سرطانی بدخیم HN5 و مقایسه آن با سلول‌های فیبروبلاست جنینی موشی

### چکیده

دریافت: ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ ویرایش: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ آنلاین: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

**زمینه و هدف:** سرطان از مهمترین عوامل مرگ و میر در دنیا می‌باشد و بنابراین هرگونه مطالعه در زمینه بیولوژی سرطان از اهمیت خاصی برخوردار است. سرطان‌های سروگردان ۲-۵٪ سرطان‌های بدن را در بر می‌گیرند که در برخی کشورها حتی بالاتر است. القای آپوپتوز یکی از مناسب‌ترین درمان‌های سرطان است. سیکلوفسفامید، ماده آکتیله‌کنده‌ای است که باعث توقف تکثیر DNA و در نتیجه توقف تکثیر و بقای سلولی می‌گردد. بنابراین سیکلوفسفامید برای درمان سرطان‌ها استفاده می‌شود. هدف از انجام این مطالعه مقایسه اثر ضد تکثیری سیکلوفسفامید بر بقای سلول‌های HN5 و فیبروبلاست‌ها بود.

**روش بررسی:** این مطالعه تجربی در آزمایشگاه سلولی تکوینی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز در بهار ۱۳۹۵ انجام گرفت و سلول‌های HN5 و فیبروبلاست‌های جنینی در محیط Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM) حاوی ۱۰٪ سرم و پنیسیلین/استرپتومایسین در ۳۷ درجه کشت و رقت‌های مختلف سیکلوفسفامید بر بقای سلول‌ها با روش MTT بررسی شد. رنگ DAPI برای تعیین هسته‌های پیکتوتیک در سلول‌های آپوپتوزی انجام گرفت. فیبروبلاست‌ها بر اساس روش‌های استاندارد از جنین‌های ۱۳ روزه موش‌های نژاد NMRI استخراج شدند. در این مطالعه سلول‌های HN5 و فیبروبلاست‌ها به مدت ۷۲ ساعت در معرض سیکلوفسفامید قرار گرفتند.

**یافته‌ها:** غلظت‌های مختلف سیکلوفسفامید بر مرگ سلول‌های HN5 و فیبروبلاستی اثرگذارند. غلظت ۱ µg/ml بیشترین درصد کاهش حیات سلولی را در روز سوم با میانگین ۵۰٪ و با  $P < 0.001$  در برداشت. به طور جالبی سیکلوفسفامید در غلظت‌های پایین تر اثرات توکسیک بیشتری در مقایسه با غلظت‌های بالاتر داشت. نتیجه‌گیری: به طور کلی سیکلوفسفامید اثرات سیتوتوکسیک پایینی بر سلول‌ها داشته اما به طور معناداری اثرات سیتوتوکسیک آن بر سلول‌های HN5 بیشتر از فیبروبلاست‌ها بود. این نتایج نشان می‌دهد که سیکلوفسفامید می‌تواند به عنوان عامل ضد سرطان استفاده شود.

**کلمات کلیه‌ای:** سرطان، سیکلوفسفامید، بقای سلولی، HN5.

\* الهام حویزی  
طیبه محمدی

گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

\* نویسنده مسئول: اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز،

دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی

تلفن: ۰۶۱-۳۳۳۳۱۰۴۵

E-mail: e.hoveizi@yahoo.com

### مقدمه

و مطالعات فراوانی در جهت شناسایی و ارایه داروهای مختلف در مورد این بیماری انجام شده است.<sup>۱</sup> سرطان‌های سر و گردن که در دهان، لب، بینی، سینوس‌ها، حنجره و گلو بروز می‌کنند. بیش از ۹۰٪ این سرطان‌ها از نوع کارسینومای سلول سنگفرشی هستند که از اپتلیوم می‌باشد.

یکی از مضلاعات جامعه بشری در قرن حاضر بیماری سرطان بد دلیل آمار بالای مرگ و میر انواع مختلف سرطان، پژوهش‌ها

سیکلوفسفامید یک داروی ضد سرطان است که در بدن به یک متابولیت فعال آلکیله‌کننده تبدیل می‌گردد و یک جز اساسی و مهم در بسیاری از ترکیبات دارویی موثر می‌باشد. سیکلوفسفامید به راحتی از دستگاه گوارش جذب می‌گردد و از سد خونی مغزی عبور کرده و به طور گسترش در بافت‌ها و مایعات بدن توزیع می‌گردد و در کبد به متابولیت‌های فعال تبدیل شده و سرانجام از طریق کلیه‌ها دفع می‌گردد.<sup>۶</sup>

سیکلوفسفامید به گروه داروهای سیتوتوکسیک (آلکیله‌کننده) تعلق دارد که تحت تاثیر آنزیم‌های کبدی به متابولیت‌های فعال فسفرآمید موستارد و آکرولین تبدیل می‌شود. فسفرآمید موستارد مسئول خواص ضدسرطانی سیکلوفسفامید است اما آکرولین با تداخل در سیستم دفاعی آنتیاکسیدانی بافت‌ها و تولید مقدار زیادی رادیکال آزاد اکسیژن دارای خواص موتاژنی است. سیکلوفسفامید دارویی پرصرف در درمان سرطان است که اولین بار در سال ۱۹۵۸ تولید شد و نمونه اولیه آن اکسازافسیرین بدون عمل آلکیله‌کننده مستقیم بود. آن یک پیش‌دارو از غیرموستاردها است که به تغییرات زیستی نیاز دارد تا به متابولیت‌های فعال تبدیل شود.<sup>۷</sup>

مکانیسم اثر این دارو به طور عمده ناشی از ایجاد اتصال بین دو رشته مولکولی DNA و شکستن RNA و نیز RNA و همچنین مهار سنتز پروتئین است. اثرات آنتی‌نوپلاستیکی سیکلوفسفامید مربوط به فسفرآمید موستارد است. درحالی که آکرولین از طریق تداخل با سیستم دفاع آنتیاکسیدانی بافت‌ها تولید رادیکال‌های آزاد اکسیژن کرده و مسئول پیدایش اثرات سمی مانند مرگ سلولی، آپوپتوز، تشکیل تومورهای گوناگون و نکروز می‌باشد.<sup>۸</sup>

دو هدفی که در سنتز داروهای شیمی درمانی در نظر می‌گیرند این است که دارو علاوه بر اینکه جنبه سایتوتوکسیکی داشته و سلول‌های سرطانی را از بین ببرد بر سلول‌های سالم فرد بیمار نیز کمترین تأثیر را داشته باشد. یکی از متداول‌ترین داروهایی که به طور گسترش در شیمی‌درمانی استفاده می‌شود سیسپلاتین است ولی برای سلول‌های سالم فرد بیمار بهویژه کلیه سمیت ایجاد می‌کند.

کاهش اثرات سمی داروهای شیمیابی بر سلول‌های سالم یکی از اهداف دانشمندان برای سنتز داروهای جدید و جایگزین کردن آنها با داروهای پیشین است تا ضمن حفظ و افزایش اثر سایتوتوکسیتی بر سلول‌های سرطانی، کمترین تأثیر را نیز بر دیگر بخش‌های سالم فرد

منشاً می‌گیرند. راه انتشار این سرطان‌ها به صورت کلی از غدد لنفاوی گردن است و بیشتر بدخیم هستند.

همانند سایر سرطان‌ها از سه روش جراحی، رادیوتراپی و شیمی‌درمانی جهت مداوا استفاده می‌شود. چون بیشتر این سرطان‌ها بدخیم هستند و در مراحل پیشرفته تشخیص داده می‌شوند در مجموع پیش‌آگهی بلندمدت بالا نیست. توده‌های خوش‌خیم شامل توده‌های التهابی، توده‌های مادرزادی، توده‌های چربی و غیره می‌باشند. توده‌های بدخیم شامل سرطان‌های مختلف مانند لنفوم، سرطان‌های تیروئید، سرطان‌های غدد برازی و غیره هستند. بر اساس آمار در آمریکا سالیانه حدود ۵۵۰۰۰ مورد جدید سرطان سر و گردن تشخیص داده می‌شوند که حدود ۱۳۰۰۰ مورد آن‌ها منجر به مرگ خواهد شد.<sup>۲</sup>

هنوز روند کامل فرآیند شکل‌گیری سرطان شناخته شده نیست ولی عوامل گوناگونی هستند که در سطح سلولی اثر می‌کنند و موجب صدمه ژن‌های کنترل‌کننده سلول می‌شوند که برآیند نهایی عملکرد آن‌ها تکثیر خارج از کنترل سلول‌ها است.<sup>۳</sup>

امروزه بیماری سرطان در جهان بهشدت در حال گسترش است، افزون بر شیوه زندگی، عوامل خطرآفرین ذاتی در عملکرد اندام‌های بدن خودمان نیز وجود دارد. محصولات جانی سوخت‌وساز بدن و خطاهایی که در طول همانندسازی DNA رخ می‌دهند در سرطان‌زایی دخیل هستند. متابولیسم هوایی، محصولات جانی رادیکال‌های اکسیژن تولید می‌کند که جهش‌زا هستند. چندین بیماری متابولیکی آرثی نیز، محصولات جانی جهش‌زا تولید می‌کنند.<sup>۴</sup>

توجه به مفهوم سلول‌های بنیادی سرطانی در طراحی و آزمایش داروهای جدید سرطان دارای اهمیت است. ازان‌جا که سلول‌های بنیادی سرطانی باعث رشد و مهاجرت تومور می‌شوند، داروهایی مورد نیاز است که این جمعیت سلولی کوچک در تومور را هدف قرار می‌دهند. بسیاری از داروهایی سنتی موجود، در ابتدا پاسخ‌های امیدوارکننده‌ای نشان می‌دهند که با بازگشت دوباره و عود بیماری همراه هستند، ممکن است بتوانند از بازگشت دوباره بیماری جلوگیری کرده و به طور واقعی سرطان متاستازی شده را درمان کنند. البته بهترین راه حل، یافتن داروهایی است که سلول‌های بنیادی سرطانی را بدون تأثیر بر سلول‌های بنیادی طبیعی همان بافت، هدف قرار می‌دهند.<sup>۵</sup>

رعایت شد. موش‌های باردار را در روز ۱۳ بارداری به طریق نخاعی کشته و جنین‌ها از رحم خارج شد و در یک ظرف حاوی PBS (Sigma, USA) قرار داده شد و سپس کیسه زرده، آمینون و جفت از آن‌ها جدا شد. با استفاده از یک جفت پنس ظریف سر قطع و کبد خارج گردید. تعداد ۵-۸ جنین قطعه قطعه شده و با Trypsin/EDTA (Gibco, USA) هضم آنزیمی انجام گرفت. جنین‌ها به همراه آنزیم به مدت ۱۵ دقیقه درون انکوپاتور انکوبه شد. برای شستن تریپسین از بافت، لوله به مدت دو دقیقه در ۱۲۰۰ دور در دقیقه (RPM) سانتی‌فوژ و محیط رویی دور ریخته شد. سپس سلول‌ها به یک فلاسک بزرگ T75 منتقل شد و ۲۰ ml DMEM محیط کشت در ۱۰٪ سرم به آن اضافه گردید و فلاسک به انکوپاتور منتقل شد. روز بعد تعویض محیط انجام شد تا ضایعات سلولی و قطعاتی که کف ظرف نچسبیده‌اند حذف شوند. به طور تقریبی مجموعه‌های سلولی به سرعت به فلاسک چسبیده و طی ۲-۳ روز سلول‌های فیبروبلاستی پیشتر ظرف را پوشانند و تا روز سوم، کف ظرف به طور کامل پوشیده شد.

میزان بقای سلول‌های کشت‌داده شده با غلظت‌های مختلف سیکلوفسفامید با استفاده از 2-yl)-2, 5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT, Sigma, USA) ۳-(4, 5-di-methylthiazol-5 mg/ml ارزیابی شد.

در این مطالعه دو گروه سلولی شامل سلول‌های سرطانی HN5 و سلول‌های غیرسرطانی فیبروبلاستی تحت تاثیر غلظت‌های مختلف سیکلوفسفامید قرار گرفتند و برای هر گروه سلول‌های بدون تیمار به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد.

تست MTT در روزهای یک، دو و سه پس از قرار دادن سلول‌های سرطانی HN5 و در روز اول پس از قرار دادن سلول‌های فیبروبلاستی در مععرض غلظت‌های مختلف سیکلوفسفامید انجام شد به‌این‌صورت که در زمان مناسب پس از کشت سلول‌ها در پلیت‌های ۲۴ خانه، محیط کشت خارج و به هر خانه حدود ۳۰۰ ml محیط تازه حاوی ۱ ml از محلول MTT اضافه شد، پس از سه تا چهار ساعت انکوپاسیون با دمای ۳۷ °C محلول MTT خارج و به هر خانه ۱ ml سپس جذب نمونه در طول موج ۵۷۰ با استفاده از دستگاه الیزاریدر خوانده شد.

بیمار گذاشته و روند بهبود را تسریع نماید.<sup>۹</sup>

در این پژوهش به بررسی خاصیت ضد سرطانی غلظت‌های مختلف سیکلوفسفامید بر میزان تکثیر و بقای رده سلولی سرطانی HN5 و مقایسه آن با تاثیر بر سلول‌های غیرسرطانی فیبروبلاست جنینی پرداخته شده است.

## روش بررسی

این آزمایش به صورت تجربی بر روی سلول‌های سرطانی سر و گردن، رده HN5 و سلول‌های غیرسرطانی فیبروبلاست‌های جنینی در آزمایشگاه سلولی تکوینی گروه زیست‌شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز در بهار ۱۳۹۵ و با رعایت کامل آینه‌های اخلاقی کار بر روی حیوانات آزمایشگاهی انجام شد. جامعه پژوهش رده سلولی سرطانی HN5 تهیه شده از انتیتوپاستور و سلول‌های فیبروبلاست‌های جنینی استخراج شده از جنین‌های ۱۳ روزه موش‌های نژاد NMRI بود. متغیرهای مطالعه دوز و زمان مصرف سیکلوفسفامید بود. بر اساس استاندارد برای گروه کنترل و ماده‌ی ارزیابی شونده حداقل سه چاهک باید تهیه شود که در پژوهش کنونی از شش چاهک استفاده شد.

سیکلوفسفامید (Endoxan, Baxter, USA) با غلظت‌های ۱، ۱۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ µg/ml در محیط کشت تهیه شد. سپس نمونه‌هایی با غلظت‌های مختلف جهت حذف آلوودگی‌های باکتریایی و قارچی با فیلتر ۰/۲۲ µm فیلتر شد و در شرایط دمایی مناسب نگهداری شدند. سلول‌های سرطانی رده سلولی HN5 از موسمسه پاستور تهران خریداری شد. سلول‌های HN5 در محیط کشت (Gibco, USA) با ۵٪ FBS در انکوپاتور (Galaxy, USA) حاوی ۰/۱٪ CO2 با ۹۰٪ رطوبت و در دمای ۳۷ °C نگهداری شد. پس از اینکه حدود ۸۰٪ فلاسک پر شد سلول‌ها پاساز و حدود  $5 \times 10^4$  cells/cm<sup>2</sup> سلول در ظروف کشت سلول ۲۴ خانه در محیط معمول قرار داده شد. پس از ۲۴ ساعت سلول‌ها با غلظت‌های مختلف سیکلوفسفامید تیمار و به مدت سه روز در این شرایط نگهداری شدند.

در این پژوهش از موش‌های نژاد NMRI به این منظور استفاده شد (خریداری شده از خانه حیوانات دانشگاه علوم پزشکی اهواز) و تمامی ملاحظات اخلاقی در ارتباط با کار با حیوانات آزمایشگاهی

متفاوتی شدن به طوری که در غلظت‌های پایین تر اثر توکسیک بیشتری مانند چروکیدگی، گردشدن، قطعه قطعه شدن کروماتین، برآمدن غشا و همچنین پرنگ شدن رنگ آبی فلورست در مورد سلول‌های آسیب‌دیده رخ داد در حالی که در غلظت‌های بالاتر سیکلوفسفامید اثرات توکسیک کمتر مشاهده شد (شکا، ۱).

برای بررسی تأثیر سیتو توکسیته غلظت‌های مختلف سیکلوفسفامید بر سلول‌های HN5 و فیروپلاستی، از روش MTT assay استفاده شد. نمودار ۱ نشان‌دهنده تأثیر سیکلوفسفامید با غلظت‌های مختلف بر رده سلولی سرطانی HN5 در سه بازه زمانی ۴۸، ۲۴ و ۷۲ ساعت و مقایسه بین سلول‌های سرطانی HN5 و سلول‌های فیروپلاستی پس از ۲۴ ساعت می‌باشد.

برای کترل از کشت سلول هم زمانی استفاده شد که هیچ تیماری ر روی آن صورت نگرفته بود. نتایج نشان داد که سیکلوفسفامید با غلظت های بالاتر تاثیر سیتو توکسیک چشمگیری بر سلول ها نداشته اما در غلظت های پایین باعث کاهش بقای سلولی در هر سه بازه زمانی نشد است. البته در بازه زمانی ۷۲ ساعت کاهش بقای سلولی نسبت به دو زمان دیگر شدیدتر بود و از نظر آماری معنادار بود. این نتایج نشان می دهد که سیکلوفسفامید در غلظت های پایین باعث القای فرآیند آپوپتوز در سلول های HN5 و سلول های فیبروبلاستی می شود و همچنین به طور معناداری اثرات سیتو توکسیک سیکلوفسفامید بر رده سلطانی HN5 بیشتر از رده سلول های فیبروبلاستی بوده است (جداوی ۱ و ۲).


برای بررسی مرگ سلولی، سلول‌های HN5 به مدت ۲۴ ساعت با محیط کشت حاوی غلاظت‌های مختلف سیکلولوفسافامید کشت شدند و پس محیط رویی سلول‌ها خارج و سلول‌ها با PBS شسته و سلول‌ها با استفاده از پارافرمالدهید ۴٪ ثبیت و با استفاده از رنگ 300 nM رنگ آمیزی شد.

برای شمارش سلولی در هر روز خاص سلول‌های ۲۰ منطقه (با عبارت اتفاقی انتخاب و شمارش و میانگین سلولی  $mm^2$ ) به صورت آمد. سلول‌های آپوپتوز شده با مورفولوژی هسته چروکیده، به دست آمد. سلول‌های آپوپتوز شده با مورفولوژی هسته چروکیده، قطعه قطعه شده و با شدت فلورسانس بالا به عنوان سلول‌های آپوپتوز شده گزارش شد.

نتایج با استفاده از SPSS software, version 12 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA) two-way analysis of variance (ANOVA) به صورت (Mean $\pm$ SE) مورد ارزیابی قرار گرفت. Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corp., Redmond, WA, USA) رسم نمودارها در نرم افزار Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corp., Redmond, WA, USA) نظیر معنادار در نظر آنچه باشد.

عافته‌ها

تغییرات مورفولوژی سلول‌های HN5 با استفاده از میکروسکوپ نوری و همچنین رنگ‌آمیزی فلئورسنت DAPI بررسی شد. سلول‌ها پس از تیمار با غلظت‌های مختلف سیکلوفسفامید، دچار تغییرات




شکل ۱: تصاویر میکروسکوپ معکوس و رنگ آمیزی فلوئورستن با رنگ DAPI برای سلول‌های رده سرطانی HN5 در مواجه با سیکلوفسفامید با غلظت‌های ۱، ۱۰، ۱۰۰ و ۲۰۰  $\mu\text{g}/\text{ml}$

جدول ۱: مقایسه میزان بقای سلول‌های HN5 کشتم داده شده با استفاده از روش MTT در روزهای ۱، ۲ و ۷ پس از تیمار با غلظت‌های مختلف سیکلوفسقامید

		گروه‌های آزمایش (غلظت)		درصد بقا
		روز ۱ پس از کشتم	روز ۷ پس از کشتم	
	روز ۳ پس از کشتم	۴۹±۳	۶۷±۲	۷۴±۱ ۱ µg/ml
	۶۶±۲	۷۵±۱	۸۲±۲	۱۰ µg/ml
	۸۹±۳	۹۶±۱	۱۰۰±۳	۱۰۰ µg/ml
	۱۰۰±۱	۱۳۳±۴	۱۴۲±۴	۲۰۰ µg/ml
	۱۱۰±۲	۱۴۰±۲	۱۴۸±۲	۴۰۰ µg/ml
(Mean±SE)				

جدول ۲: مقایسه میزان بقای سلول‌های HN5 و سلول‌های فیبروبلاست کشتم داده شده با استفاده از روش MTT در روز ۱ پس از تیمار با غلظت‌های مختلف سیکلوفسقامید

		گروه‌های آزمایش (غلظت)		درصد بقا روز ۱ پس از کشتم
		سلول‌های فیبروبلاست	HN5	سلول‌های فیبروبلاست
		۸۸±۲	۷۴±۱	۱ µg/ml
		۸۶±۲	۸۲±۲	۱۰ µg/ml
		۱۱۰±۱	۱۰۰±۳	۱۰۰ µg/ml
		۱۸۰±۱	۱۴۲±۴	۲۰۰ µg/ml
		۱۸۹±۲	۱۴۸±۲	۴۰۰ µg/ml
(Mean±SE)				



نمودار ۱: بررسی بقای سلول‌های HN5 و سلول‌های فیبروبلاستی با روش MTT  
الف- نمودار بقای سلول‌های HN5 در مواجه با سیکلوفسقامید با غلظت‌های ۱، ۱۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ µg/ml در روزهای ۱ (D1)، ۲ (D2) و ۳ (D3) پس از تیمار.  
ب- نمودار مقایسه بقای سلول‌های HN5 و سلول‌های فیبروبلاستی در مواجه با سیکلوفسقامید با غلظت‌های ۱، ۱۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ µg/ml پس از ۲۴ ساعت تیمار.

## بحث

بررسی اثر آپوپتوزی سیکلوفسقامید به همراه کورکامین بر رده سرطانی سلول‌های سرطانی رکتوم موش پرداختند و اعلام کردند که سیکلوفسقامید دارای خواص ضد سرطانی بوده و سبب القای آپوپتوز در این سلول‌های سرطانی می‌گردد.<sup>۱۲</sup>

نتایج پژوهش کنونی نشان داد که سیکلوفسقامید اثرات متفاوتی بر سلول‌های سرطانی و غیرسرطانی دارد. به نظر می‌رسد به دلیل مواجهه سلول‌های سرطانی با تنش‌های مختلف، بین سلول‌های سرطانی و سالم تفاوت اساسی در وضعیت فعال‌سازی کاسپاز، وجود دارد. تفاوت در این است که سلول‌های سرطانی دارای کاسپازهای فعال شده‌ای هستند که به واسطه افزایش بیان *IAP* (مهارکننده‌های

یافته‌های پژوهش کنونی نشان می‌دهد که سیکلوفسقامید سبب القای مرگ سلولی می‌گردد. همچنان که Zhang و همکاران اشاره کردند که سیکلوفسقامید به همراه برخی تعییرات در مسیرهای متابولیکی گلوکز در سلول‌های سرطانی پستان منجر به افزایش مرگ سلولی در این سلول‌های سرطانی می‌گردد.<sup>۱۰</sup> افزون بر این Trebunova و همکاران به بررسی اثر هم‌زمان سیکلوفسقامید و چند داروی دیگر بر رده سلول‌های سرطان سینه انسانی (سلول‌های MCF-7) پرداختند و اعلام کردند که سیکلوفسقامید با غلظت معین و به همراه داروهای دیگر به صورت موثری سبب کاهش فعالیت متابولیکی سلول‌های سرطان پستان در انسان می‌گردد.<sup>۱۱</sup> همچنین Bakirel و همکاران به

سلول‌های سرطانی می‌گردد.<sup>۱۶</sup> افرون بر این Majzner و همکاران سیکلوفسفامید را به عنوان دارویی مناسب بر علیه سلول‌های سرطانی معرفی کردند و اعلام داشتند تزریق این دارو به بیمارانی که تحت سلول درمانی می‌باشند از بروز سرطان در آن‌ها جلوگیری می‌کند.<sup>۱۷</sup> همسو با پژوهش کنونی مبنی بر تاثیر آپوپتوزی سیکلوفسفامید بر سلول‌های غیرسرطانی Kemp و همکاران اثرات منفی سیکلوفسفامید را روی تکثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی استخراج شده از مغز استخوان انسان گزارش کردند. آن‌ها همچنین بیان کردند که سیکلوفسفامید مهاجرت و جمعیت سلول‌های بنیادی خونساز در مغز استخوان را دستخوش تغییر می‌کند. البته آن‌ها اثر سیکلوفسفامید بر این سلول‌ها را با اثر آن بر سلول‌های غیرسرطانی مقایسه نکردند.<sup>۱۸</sup> بنابراین سیکلوفسفامید به صورت وابسته به غلظت می‌تواند به عنوان یک داروی ضد سرطانی در از بین بردن و القای مرگ سلولی در سلول‌های سرطانی در سرطان سر و گردن مفید واقع شود و با توجه به این که در سلول‌های غیرسرطانی اثرات توکسیک کمتری دارد پس اثرات مضر جانبی کمتری متوجه بیمار خواهد شد. البته به منظور تکمیل نتایج به دست آمده، مطالعه بر روی تعداد بیشتری از رده‌های سلولی سرطانی و غیرسرطانی و غلظت‌های متنوع تر پیشنهاد می‌گردد. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، سیکلوفسفامید با غلظت  $\mu\text{g}/\text{ml}$  ۱ نسبت به سایر غلظت‌ها تا حدودی فعالیت سایتو توکسیک بیشتری روی رده سلول سرطانی HN5 و سلول‌های فیبروبلاستی نشان داد و همچنین به طور معناداری اثرات سایتو توکسیک سیکلوفسفامید بر رده سرطانی HN5 بیشتر از رده سلول‌های فیبروبلاستی بوده است. سپاسگزاری: این مطالعه حاصل فعالیت پژوهشی نویسنده‌گان در بخش سلولی تکوینی گروه زیست‌شناسی می‌باشد که با حمایت دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده است.

آپوپتوزی)، مهار می‌گردد اما سلول‌های سالم نیازمند شکست پرتوتولیتیکی پیش کاسپازهای کاملاً غیرفعال هستند. بنابراین، سلول‌های سرطانی نسبت به سلول‌های سالم، در راهاندازی پاسخ آپوپتوزی در مرحله‌ی جلوتری قرار دارند. در حمایت از این مطلب کاسپاز سه پردازش شده در سلول‌های توموری شناسایی شده است. در فرآیند آپوپتوز در سلول‌های طبیعی دروزوفیلا، کاسپازهای فعال شده توسط IAP ها مهار شده و القای آپوپتوز، نیازمند رهایی از مهار IAP است، سلول‌های توموری در این ویژگی با سلول‌های طبیعی دروزوفیلا، وجه مشترک دارند. به عبارت دیگر پیام‌های آپوپتوزی، پردازش پیش کاسپازها را در سلول‌های سالم تحریک می‌کنند، در حالی که پیام‌های آپوپتوزی در سلول سرطانی، توقف اثر مهاری IAP بر کاسپازهای پردازش شده را فعال می‌کنند.<sup>۱۹</sup>

در پژوهش کنونی بررسی هسته با رنگ‌آمیزی DAPI نشان داد که سیکلوفسفامید به واسطه ایجاد آسیب در کروماتین سبب ایجاد آپوپتوز می‌گردد همچنان که مطالعات پیشین نیز تایید کننده این مهم می‌باشند. به طوری که Tsai-turton و همکاران در مطالعه‌ای اعلام کردند که سیکلوفسفامید افزون بر آسیب DNA سلول، باعث القای استرس اکسیداتیو نیز می‌شود، سیکلوفسفامید باعث تخلیه گلوتاتیون در سلول‌های توموری گرانولوزای انسان می‌شود که منجر به مرگ آپوپتیک این سلول‌ها می‌گردد.<sup>۲۰</sup>

همچنین Chakraborty و همکاران اعلام کردند که سیکلوفسفامید به همراه سایر داروها می‌تواند با ایجاد آسیب در DNA سلول‌های سرطانی سبب القای مرگ این سلول‌ها گردد و پیشهاد کردن این عامل احتمالاً به واسطه القای استرس اکسیداتیو می‌باشد که سبب آزادسازی ROS و فعالیت P53 که با افزایش بیان Bax و کاهش بیان Bcl-2 سبب آزادسازی سیتوکروم C از میتوکندری می‌گردد. در نهایت تولید کاسپاز سه به همراه سایر عوامل سبب القای آپوپتوز در این

## References

- Rundberg Nilsson A, Soneji S, Adolfsson S, Bryder D, Pronk CJ. Human and murine hematopoietic stem cell aging is associated with functional impairments and intrinsic megakaryocytic/erythroid bias. *PLoS One* 2016;11(7):e0158369.
- Welsh L, Panek R, Riddell A, Wong K, Leach MO, Tavassoli M, et al. Blood transfusion during radical chemo-radiotherapy does not reduce tumour hypoxia in squamous cell cancer of the head and neck. *Br J Cancer* 2017;116(1):28-35.
- Wang VE, Grandis JR, Ko AH. New Strategies in Esophageal Carcinoma: Translational Insights from Signaling Pathways and Immune Checkpoints. *Clin Cancer Res* 2016;22(17):4283-90.
- Wu C, Zhang J, Liu T, Jiao G, Li C, Hu B. Astaxanthin inhibits proliferation and promotes apoptosis of A549 lung cancer cells via blocking JAK1/STAT3 pathway. *Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi* 2016;32(6):784-8.

5. Ganz PA. Survivorship: adult cancer survivors. *Prim Care* 2009;36(4):721-41.
6. Janelsins MC, Heckler CE, Thompson BD, Gross RA, Opanashuk LA, Cory-Slechta DA. A clinically relevant dose of cyclophosphamide chemotherapy impairs memory performance on the delayed spatial alternation task that is sustained over time as mice age. *Neurotoxicology* 2016;56:287-293.
7. Mauro FR, Carella AM, Molica S, Paoloni F, Liberati AM, Zaja F, et al. Fludarabine, cyclophosphamide and lenalidomide in patients with relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia. A multicenter phase I-II GIMEMA trial. *Leuk Lymphoma* 2016;1-8.
8. Hill BT, Rybicki L, Carlstrom KD, Jagadeesh D, Gerds A, Hamilton B, et al. Daily weight-based busulfan with cyclophosphamide and etoposide produces comparable outcomes to four-times-daily busulfan dosing for lymphoma patients undergoing autologous stem cell transplantation. *Biol Blood Marrow Transplant* 2016;22(9):1588-95.
9. Oka N, Soeda A, Noda S, Iwama T. Brain tumor stem cells from an adenoid glioblastoma multiforme. *Neurol Med Chir (Tokyo)* 2009;49(4):146-50; discussion 150-1.
10. Zhang F, Aft RL. Chemosensitizing and cytotoxic effects of 2-deoxy-D-glucose on breast cancer cells. *J Cancer Res Ther* 2009;5 Suppl 1:S41-3.
11. Trebunova M, Laputkova G, Slaba E, Lacjakova K, Verebova A. Effects of docetaxel, doxorubicin and cyclophosphamide on human breast cancer cell line MCF-7. *Anticancer Res* 2012;32(7):2849-54.
12. Bakirel T, Alkan FÜ, Üstüner O, Çinar S, Yıldırım F, Erten G, et al. Synergistic growth inhibitory effect of deracoxib with doxorubicin against a canine mammary tumor cell line, CMT-U27. *J Vet Med Sci* 2016;78(4):657-68.
13. Wang Z, Zhang Y, Li Y, Banerjee S, Liao J, Sarkar FH. Down-regulation of Notch-1 contributes to cell growth inhibition and apoptosis in pancreatic cancer cells. *Mol Cancer Ther* 2006;5(3):483-93.
14. Kim S, Lee JH, Kang I, Hyun S, Yu J, Shin C. An amphiphilic peptide induces apoptosis through the miR29b-p53 pathway in cancer cells. *Mol Ther Nucleic Acids* 2016;5(7):e330.
15. Tsai-Turton M, Luong BT, Tan Y, Luderer U. Cyclophosphamide-induced apoptosis in COV434 human granulosa cells involves oxidative stress and glutathione depletion. *Toxicol Sci* 2007;98(1):216-30.
16. Chakraborty A, Kumar P, Ghosh K, Roy P. Evaluation of a Schiff base copper complex compound as potent anticancer molecule with multiple targets of action. *Eur J Pharmacol* 2010;647(1-3):1-12.
17. Majzner RG, Mogri H, Varadhan R, Brown P, Cooke KR1, Bolaños-Meade J, et al. Post-transplantation cyclophosphamide after bone marrow transplantation is not associated with an increased risk of donor-derived malignancy. *Biol Blood Marrow Transplant* 2017;S1083-8791(17)30065-4.
18. Kemp K, Morse R, Sanders K, Hows J, Donaldson C. Alkylating chemotherapeutic agents cyclophosphamide and melphalan cause functional injury to human bone marrow-derived mesenchymal stem cells. *Ann Hematol* 2011;90(7):777-89.

## Effects of cyclophosphamide on proliferation and viability of malignant HN5 cell line and comparing with embryonic fibroblast cells

Elham Hoveizi Ph.D.\*  
Tayebeh Mohammadi Ph.D.

Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

### Abstract

Received: 06 Sep. 2016 Revised: 07 Feb. 2017 Accepted: 17 Feb. 2017 Available online: 18 Feb. 2017

**Background:** One of the major causes of death in the world is cancer and therefore any study in the field of cancer biology is of great importance. Head and neck cancers represent approximately 2-5% of neoplasms which is higher in some countries. The most appropriate therapy for various cancers is identifying effective and efficient ways that contribute to initiation of apoptosis. Cyclophosphamide is an alkylating agent that stops the replication of DNA and then, it stops the cell proliferation and viability. Therefore, cyclophosphamide is used to treat various types of cancer. In this study we evaluate the cytotoxic effects of cyclophosphamide on viability of (head and neck cancer cells) HN5 cell line and compare it with fibroblast cells as noncancerous cells.

**Methods:** This experimental study was done in cell and developmental laboratory in faculty of science, Shahid Chamran University of Ahvaz in Spring of 2016. HN5 cell line and embryonic fibroblast cells were grown in DMEM supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS), penicillin/streptomycin (100 U/ml, 100 µg/ml) at 37 °C, then the effects of different concentrations of cyclophosphamide on cell viability was evaluated by 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide (MTT) assay. 4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) staining was performed to determine the proportion of apoptotic cells by manually counting pyknotic nuclei. According to standard procedures from day 13 embryos of outbred strains naval medical research institute (NMRI), fibroblast cells were isolated. In this study HN5 cell line and fibroblasts were exposed to cytostatics for 72 hours.

**Results:** Various concentrations of cyclophosphamide were effective in cytotoxicity of HN5 cancer and fibroblast cells. A significant cytotoxicity was observed with the examined concentration of 1 µg/ml of cyclophosphamide with 50% in 3th day and P< 0.001. Interestingly, at low concentrations, cyclophosphamide was more toxic than at higher concentrations.

**Conclusion:** Totally cyclophosphamide had low toxicity effects on both of the cell lines but the toxicity effects of cyclophosphamide on HN5 were significantly greater than fibroblast cells. These results indicate that cyclophosphamide can be a potential anticancer agent.

**Keywords:** cancer, cell viability, cyclophosphamide, HN5.

\* Corresponding author: Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.  
Tel: +98 61 33331045  
E-mail: e.hoveizi@yahoo.com