

## بررسی عفونت‌های قارچی ریوی در بیماران با ایمنی در معرض خطر

### چکیده

دریافت: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ آنلاین: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

**ازمینه و هدف:** با افزایش بیماران با ایمنی در معرض خطر، عفونت‌های قارچی به‌ویژه عفونت دستگاه تنفسی نیز افزایش یافته است. در پژوهش کنونی آلدگی قارچی دستگاه تنفس بیماران با ایمنی در معرض خطر در نمونه‌های برونوکرآلوئولار لواز (BAL) مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی ریه بیمارستان امیرالمؤمنین شهر اراک مورد ارزیابی قرار گرفت.

**روش بررسی:** این مطالعه توصیفی-مقطوعی از اردیبهشت ۱۳۹۶ تا خرداد ۱۳۹۷ بر روی بیماران با ایمنی در معرض خطر مشکوک به عفونت ریوی مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی ریه بیمارستان دانشگاه امیرالمؤمنین (ع) شهر اراک انجام گرفت. از بین این بیماران، ۶۴ بیمار شامل ۳۵ زن و ۲۹ مرد انتخاب شدند. نمونه برونوکرآلوئولار لواز (BAL) توسط پزشک از این بیماران تهیه و به سرعت به آزمایشگاه قارچ‌شناسی دانشکده پزشکی ارسال گردید. نمونه‌های برونوکرآلوئولار لواز با رنگ‌آمیزی (GMS) و روش کشت مورد بررسی قرار گرفتند.

**یافته‌ها:** از ۶۴ بیمار، ۹ (۱۴٪) بیمار آلدود به عفونت‌های قارچی ریوی بودند. در بین بیماران آلدود به عفونت قارچی، ۹ بیمار (۱۰٪) در آزمایش کشت و ۸ بیمار (۷٪) با رنگ‌آمیزی GMS مثبت شدند. در بین افراد آلدود ۷ (۷٪) نفر زن و ۲ (۲٪) نفر مرد بودند. شایع ترین قارچ‌های جداشده شامل کاندیسیا آلبیکتس، آسپرژیلوس فومیکاتوس و گونه‌های موکور (هر کدام ۲ مورد) بودند. بین آلدگی قارچی با جنس، سن، شغل و نوع بیماری رابطه معنادار مشاهده نگردید.

**نتیجه‌گیری:** نتایج پژوهش کنونی نشان داد، بیماران با ایمنی در معرض خطر مستعد عفونت‌های قارچی به‌ویژه کاندیدیازیس و آسپرژیلوزیس هستند.

**کلمات کلیدی:** عفونت‌های قارچی ریه، بیماران با ایمنی در معرض خطر، ایران.

علی آرش انوشیروانی<sup>۱</sup>\*

عبداللطیف معینی<sup>۱</sup>

رضاحاجی حسین<sup>۲</sup>

عباس علیرادیان<sup>۳</sup>

مجتبی دیده‌دار<sup>۳</sup>

۱- گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علم پزشکی اراک، اراک، ایران.

۲- گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علم پزشکی ایران، تهران، ایران.

۳- گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

۴- گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

\* نویسنده مسئول: اراک، سردشت، میدان بیج، مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص)، دانشکده پزشکی، گروه قارچ شناسی و انگل شناسی پزشکی

کدپستی: ۳۸۴۸۱۷۹۴۱

تلفن: ۰۶۴۱۳۵۰۲  
E-mail: didehdar\_m@arakmu.ac.ir

### مقدمه

فرصت طلب مانند گونه‌های آسپرژیلوس، کاندیدا، موکورال‌ها، کرپیتوکوکوس، فوزاریوم و پنوموسبیتیس می‌باشد که می‌توانند از طریق انتشار، تماس مستقیم پرسنل بیمارستان و دستگاه‌های تنفس مصنوعی به بیماران منتقل شده و باعث ایجاد عفونت‌های قارچی ریوی در بیماران با ایمنی در معرض خطر می‌شوند.<sup>۱-۳</sup> در سال‌های اخیر با افزایش بیماران در معرض خطر شامل بیماران نوتروپنیک، بدخیمی‌های خونی، دریافت‌کنندگان پیوند، بیماران مصرف‌کننده داروهای ضعیف‌کننده

عفونت‌های قارچی ریوی توسط دو گروه از قارچ‌ها ایجاد می‌شوند. قارچ‌های دوشکلی حرارتی حقیقی مانند هیستوپلاسمای پسولاروم، کوکسیلایوپیاس ایمیتیس، پاراکوکسیلایوپیاس برازیانسیس و بلاستومایسیس درماتیتیدیس قارچ‌های بیماری‌زای اولیه هستند که در افراد سالم می‌توانند عفونت ریوی ایجاد کنند. گروه دیگر قارچ‌ها شامل قارچ‌های

کلرامفنیکل (Merck KGaA, Darmstadt, Germany) تحت شرایط استریل انجام گرفت و پس از آن در دمای  $27^{\circ}\text{C}$  به مدت حداقل ۷ روز نگهداری گردید. جنس و تا حد ممکن گونه قارچ رشد کرده با کمک روش اسالید کالچر شناسایی گردید. در صورت رشد کلنی‌های محمری، جهت تشخیص قارچ مخمری از محیط‌های کشت کورن میل آگار (Merck KGaA, Darmstadt, Germany) همراه با تویین ۸۰ و کروم آگار (bioMerieux, Marcy l' Etoile, France) و همچنین آزمایش تولید لوله زایا با استفاده از سرم انسانی و نگهداری در دمای  $37^{\circ}\text{C}$  به مدت ۲ ساعت استفاده شد. از نتایج آزمایشات و داده‌های پرسشنامه‌ها با SPSS software, version 16 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA) تجزیه و تحلیل گردید.

## یافته‌ها


در پژوهش کنونی ۶۴ بیمار با اینمی در معرض خطر مشکوک به عفونت قارچی ریوی مورد بررسی قرار گرفتند. این بیماران شامل ۳۵ زن و ۲۹ مرد بودند. میانگین سنی بیماران مورد مطالعه ۴۶/۱ سال بود. از ۶۴ نمونه برونکوآلتوئلار لاواز تهیه شده، ۷ (۱۰/۹٪) نمونه از نظر وجود عناصر قارچی در رنگ‌آمیزی اختصاصی GMS مثبت گردید (شکل ۱).

همچنین تمام ۶۴ نمونه‌ها نیز در محیط سابرو دکستروز آگار کشت داده شد که ۹ (۱۴٪) نمونه مثبت گردید. شایع‌ترین ارگانیسم جدا شده در این بررسی، گونه کاندیدا آلبیکنس (۲۲/۲٪)، آسپرژیلوس فومیگاتوس (۲۲/۲٪) و گونه‌های موکور (۲۲/۲٪) بودند. جدول ۲ دیگر قارچ‌های جدا شده را نشان می‌دهد. در بین بیماران آلوده (۷/۷۷٪) نفر زن و ۲ (۲۲/۲٪) نفر مرد بودند. بیشترین آلودگی در گروه سنی >۶۰ (۳۳/۳٪) دیده شد. آلودگی در بین افراد بیکار (۶/۷٪) و در بین گروه‌های با شغل آزاد، کارگر و کارمند هر کدام ۱۱/۱٪ مشاهده گردید. مهمترین فاکتورهای زمینه‌ای در ایجاد عفونت‌های قارچی ریوی در بیماران مورد بررسی عبارت بودند از: بدخیمی‌های خونی ۵ مورد (۳۳/۳٪)، مصرف کورتیکواستروییدها ۲ مورد (۳٪)، سل ۱ مورد (۲٪) و دیابت ۱ مورد (۱۱/۲٪) (جدول ۱). بین آلودگی قارچی با جنس، سن، شغل، تأهل و نوع بیماری رابطه معنادار مشاهده نگردید.

سیستم اینمی و کورتیکواستروییدها و آنتی‌بیوتیک‌های گسترده‌طیف طولانی مدت، بیماران مبتلا به گرانولوماتوز مزمن و مبتلایان به ایدز، عفونت‌های ریوی ناشی از قارچ‌های فرست‌طلب رو به افزایش است.<sup>۴</sup> در این مطالعه عفونت‌های قارچی ریوی در نمونه‌های برونکوآلتوئلار لاواز (Bronchoalveolar lavage, BAL) به دست آمده از بیماران دچار نقص سیستم اینمی مورد ارزیابی قرار گرفت.

## روش بررسی

این مطالعه توصیفی-مقطوعی از اردیبهشت ۱۳۹۶ تا خرداد ۱۳۹۷ که دارای کد اخلاق از کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اراک بوده، بر روی بیماران با اینمی در معرض خطر مشکوک به عفونت ریوی مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهر اراک انجام گرفت. معیارهای ورود به مطالعه شامل بیماران مبتلا به سرطان خون و دیگر سرطان‌های، دریافت‌کنندگان پیوند عضو و مغز استخوان، مصرف کنندگان داروهای استروییدی و آنتی‌بیوتیک‌های گسترده‌طیف طولانی مدت، بیماران مبتلا به ایدز، بیماران نوتروپنی شدید، بیماران مبتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی (COPD) و بیماران دیابتیک که پنومونی آن‌ها توسط پزشک متخصص ریه با عالیم بالینی و سی‌تی اسکن تأیید شده بود. بیمارانی که داروهای ضد قارچی مصرف می‌کردند و یا پنومونی آن‌ها توسط پزشک متخصص تأیید نشد، از مطالعه خارج شدند. پس از ثبت داده‌های دموگرافیکی و بالینی شامل سن، جنس، بیماری زمینه‌ای و داروهای مصرفی، نمونه برونکوآلتوئلار لاواز از این بیماران توسط پزشک متخصص ریه گردآوری شد. پس از نمونه‌گیری، نمونه‌ها در عرض کمتر از یک ساعت در شرایط استریل و رعایت زنجیره سرد به آزمایشگاه قارچ‌شناسی دانشکده پزشکی منتقل گردید. نمونه‌های برونکوآلتوئلار لاواز به مدت ۱۵ دقیقه در ۱۵۰۰۰ RPM سانتریفیوژ شدند و مایع روبی دور ریخته شد و از تهشیش برای انجام آزمایشات مشاهده مستقیم، رنگ‌آمیزی و کشت استفاده شد. پس از تهیه گسترش، نمونه‌ها با رنگ (Grocott-Gomori's methenamine silver (GMS) براساس دستورکار شرکت سازنده رنگ‌آمیزی گردید. لامهای رنگ‌آمیزی شده زیر میکروسکوپ نوری از نظر وجود یا عدم وجود عناصر قارچی مورد بررسی قرار گفتند. کشت نمونه‌ها در محیط‌های سابورو دکستروز آگار حاوی



شکل ۱: نمونه‌های برونکوآلوئولار لاواز رنگ‌آمیزی شده با GMS  
الف: سلول‌های مخمری با و بدون جوانه (بزرگنمایی  $\times 40$ )، ب: رشته‌های میسیلیوم با دیواره عرضی (بزرگنمایی  $\times 40$ )، ج: میسیلیوم‌های پهن و عرضی بدون دیواره عرضی (بزرگنمایی  $\times 40$ )، کیست‌های پنوموسیستیس جیروسی (بزرگنمایی  $\times 100$ ).

جدول ۱: فراوانی گونه‌های قارچی جدادشده در این مطالعه با توجه به فاکتور زمینه‌ای

گونه قارچی	کاندیدا آلبیکتس	آسپرژیلوس فومیگاتوس	گونه‌های موکور	کاندیدا تروپیکالیس	آسپرژیلوس فلاووس	پنوموسیستیس جیروسی	جمع کل
فاکتور زمینه‌ای	بدخیمی‌های خونی	صرف کورتیکواستروییدها	دیابت ملیتوس	سل	فراآنی (درصد)		
(٪۲۲/۲) ۲				۱	۱		
(٪۲۲/۲) ۲					۲		
(٪۲۲/۲) ۲						۲	
(٪۱۱/۱) ۱			۱				
(٪۱۱/۱) ۱				۱			
(٪۱۱/۱) ۱					۱		
(٪۱۰۰) ۹			۱	۱		۲	۵

## بحث

فومیگاتنوس به راحتی در این فضای قرار گرفته و باعث ایجاد آسپرژیلوس  
یا توب قارچی می‌کند.

در مطالعات مروری که در ایران انجام شده است، شایع‌ترین  
فاکتورهای زمینه‌ای این بیماری به ترتیب شامل بیماران دیابتی،  
بدخیمی‌ها، پیوند معزز استخوان و عضو سخت، درمان با دسفریوکسامین  
بودند.<sup>۱۳،۱۴</sup> مشابه نتایج پژوهش کنونی، موکورو-مایکوزیس ریوی بیشتر  
در بیماران بدخیمی‌های خونی یا گیرندگان پیوند معزز استخوان اتفاق  
می‌افتد و میزان مرگ‌ومیر در این فرم بیماری ۷۶٪ گزارش شده  
است.<sup>۱۵</sup>

در بررسی کنونی یک مورد پنوموسیستیس جیروسی از بیمار پیوند  
کلیه مبتلا به پنومونی که داروهای سرکوب‌کننده اینمی مصرف می‌نمود،  
جدا شد. بر خلاف این مطالعه، در مطالعه Aboualigalehdari و  
همکاران، ۲۷٪ بیماران مبتلا به اختلالات ریوی از نظر قارچ  
پنوموسیستیس جیروسی مثبت بودند که می‌تواند به دلیل محدود بودن  
بیماران مطالعه کنونی باشد.<sup>۱۶</sup>

با توجه به یافته‌های این مطالعه، می‌توان نتیجه گرفت که بیماران  
با اینمی معرض خطر مستعد کلوبیزاسیون قارچ‌های ساپروفت در  
قسمت ریه بوده که می‌تواند زمینه‌ساز بیماری‌های قارچی تهاجمی در  
این گروه از بیماران باشد.

سپاسگزاری: این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی تحت عنوان  
"بررسی عفونت‌های قارچی ریوی در بیماران دچار نقص اینمی  
مراجهه کننده به کلینیک‌های فوق تحصصی دانشگاه علوم پزشکی  
اراک" مصوب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک  
در سال ۱۳۹۵ به کد ۲۶۵۱ می‌باشد که با حمایت دانشگاه علوم  
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک اجرا شده است.

در این مطالعه شایع‌ترین قارچ جدا شده کاندیدا آلبیکنس،  
آسپرژیلوس فومیگاتنوس و گونه‌های موکور (هر کدام ۲ مورد) بودند،  
که با نتایج مطالعات انجام‌شده پیشین همخوانی دارد.<sup>۱۷</sup> در بررسی  
کنونی، یکی از گونه‌های کاندیدا آلبیکنس از بیمار مبتلا به سرطان  
خون دچار نوتروپنی و دیگری از بیمار پیوند کلیه که داروهای  
کورتیکواستروئید مصرف می‌کرد جدا شدند، که با یافته‌های مطالعات  
اجام‌شده در ایران همخوانی داشت.<sup>۱۸</sup>

آسپرژیلوس در گیرندگان پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز  
آلورژنیک و بیماران مبتلا به لوسومی دارای نوتروپنی با میزان بالایی از  
مرگ‌ومیر همراه است. با توجه به اینکه بیشتر بیماران با اینمی در  
معرض خطر در بیمارستان‌ها بستری هستند، آلودگی این بیماران به  
آسپرژیلوس از طریق عملکرد نادرست سیستم‌های تهویه مطبوع،  
ساخت‌وساز در داخل و اطراف بیمارستان، گل و گیاهان زیستی و  
آلودگی سقف‌های کاذب اتفاق می‌افتد.<sup>۱۹</sup> در این مطالعه بیشترین  
آلودگی به آسپرژیلوس در بیماران دچار بدخیمی خونی دیده شد،  
به طوری که هر دو گونه آسپرژیلوس فومیگاتنوس از این بیماران جدا  
شدند. نتایج این بررسی با مطالعه Nucci و همکاران که بر روی  
بیماران مبتلا به بدخیمی خونی انجام گرفت، همخوانی داشت،  
به طوری که ۶۵ تا ۹۲٪ مرگ‌ومیر در این بیماران به دلیل آلودگی به  
آسپرژیلوس گوارش شد.<sup>۲۰</sup> یک مورد آسپرژیلوس فلاووس در این  
مطالعه از بیمار مبتلا به سل جدا گردید. بیماران مبتلا به سل به دلیل  
نکروزی که در بافت ریه ایجاد شده کوئیدی آسپرژیلوس به ویژه  
آسپرژیلوس فلاووس به خاطر اندازه کوچک کوئیدی نسبت به گونه

## References

- Georgiadou SP, Sipsas NV, Marom EM, Kontoyiannis DP. The diagnostic value of halo and reversed halo signs for invasive mold infections in compromised hosts. *Clin Infect Dis* 2011;52(9):1144-55.
- Liu ZY, Sheng RY, Li XL, Li TS, Wang AX. Nosocomial fungal infections, analysis of 149 cases. *Zhonghua Yi Xue Za Zhi* 2003;83(5):399-402.
- Rolston KV. The spectrum of pulmonary infections in cancer patients. *Curr Opin Oncol* 2001;13(4):218-23.
- Vazquez JA, Miceli MH, Alangaden G. Invasive fungal infections in transplant recipients. *Ther Adv Infect Dis* 2013;1(3):85-105.
- Pfaller MA, Diekema DJ. Epidemiology of invasive mycoses in North America. *Crit Rev Microbiol* 2010;36(1):1-53.
- Meersseman W, Lagrou K, Maertens J, Wilmer A, Hermans G, Vanderschueren S, et al. Galactomannan in bronchoalveolar lavage fluid: a tool for diagnosing aspergillosis in intensive care unit patients. *Am J Respir Crit Care Med* 2008;177(1):27-34.
- Basiri Jahromi Sh, Khaksar AA. Respiratory fungal infections in specimens referred to the Pasteur Institute of Iran, 1994-2001. *Res Med* 2004;28(4):265-8.
- Hajialiakbar V, Emami M, Eskandari A. Frequency of fungal pathogens in bronchoalveolar lavage and biopsy specimens of

- patients hospitalized in Chamran and Amir al Momenin Hospitals. *J IRIAF Health Admin* 2007;10(2):21-5.
9. Khodavaisy S, Badali H, Rezaie S, Nabili M, Moghadam KG, Afhami S, et al. Genotyping of clinical and environmental *Aspergillus flavus* isolates from Iran using microsatellites. *Mycoses* 2016;59(4):220-5.
  10. Mosayebi M, Eslamirad Z, Hajihossein R, Ghorbanzadeh B, Shahverdi M, Didehdar M. Evaluating of fungal contamination in hospital wet cooling systems in Markazi province, Central Iran. *J Mycol Med* 2017;27(3):334-8.
  11. Nucci M, Marr KA, Queiroz-Telles F, Martins CA, Trabasso P, Costa S, et al. Fusarium infection in hematopoietic stem cell transplant recipients. *Clin Infect Dis* 2004;38(9):1237-42.
  12. Vaezi A, Moazeni M, Rahimi MT, Hoog S, Badali H. Mucormycosis in Iran: a systematic review. *Mycoses* 2016;59(7):402-15.
  13. Roden MM, Zaoutis TE, Buchanan WL, Knudsen TA, Sarkisova TA, Schaufele RL, et al. Epidemiology and outcome of zygomycosis: a review of 929 reported cases. *Clin Infect Dis* 2005;41(5):634-53.
  14. Marr KA, Carter RA, Crippa F, Wald A, Corey L. Epidemiology and outcome of mould infections in hematopoietic stem cell transplant recipients. *Clin Infect Dis* 2002;34(7):909-17.
  15. Aboualigehchdari E, Zarei-Mahmoudabadi A, Fatahnia M, Idani E. The prevalence of *Pneumocystis jirovecii* among patients with different chronic pulmonary disorders in Ahvaz, Iran. *Iran J Microbiol* 2015;7(6):333-7.

## Investigation of pulmonary fungal infections in immunocompromised patients

Ali Arash Anoushiravani  
M.D.<sup>1,2</sup>  
Abdollah Moini M.D.<sup>1</sup>  
Reza Hajihosseini M.Sc.<sup>3</sup>  
Abbas Alimoradian Ph.D.<sup>4</sup>  
Mojtaba Didehdar Ph.D.<sup>3\*</sup>

1- Department of Internal Medicine,  
School of Medicine, Arak University  
of Medical Sciences, Arak, Iran.  
2- Department of Internal Medicine,  
School of Medicine, Iran University  
of Medical Sciences, Tehran, Iran.  
3- Department of Medical  
Parasitology and Mycology, School  
of Medicine, Arak University of  
Medical Sciences, Arak, Iran.  
4- Department of Pharmacology,  
School of Medicine, Arak University  
of Medical Sciences, Arak, Iran.

### Abstract

Received: 23 Jan. 2019   Revised: 30 Jan. 2019   Accepted: 12 Aug. 2019   Available online: 22 Aug. 2019

**Background:** With increasing immunocompromised patients, fungal infections especially lung infection, have also increased. In this study, fungal contamination of the respiratory system in immunocompromised patients was evaluated.

**Methods:** This descriptive cross-sectional study was conducted in immunocompromised patients suspicious of pulmonary infections referring to specialized lung clinic of Amir-Al-Momenin University Hospital in Arak City, Iran, from April 2017 to June 2018. Of these 64 patients, including 35 women and 29 men, were selected. After recording the demographic information, a bronchoalveolar lavage (BAL) sample was prepared by the physician from these patients and was immediately sent to the medical mycology laboratory, school of medicine. Bronchoalveolar lavage specimens were investigated by Grocott-Gomori's methenamine silver (GMS) staining and culture method. Data were analyzed by SPSS software, version 16 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA).

**Results:** Of 64 patients, 9 (14%) were infected with pulmonary fungal infections. Among the patients infected with fungal infection, 9 (100%) were positive in the culture examine and 8 (72%) by GMS staining. Among infected people, 7 (77.8%) were female and 2 (22.2%) were male. The most common isolated fungi were *Candida albicans*, *Aspergillus fumigatus* and *Mucor* species (2 cases). The highest infection was seen in the age group of less than 60 (33.3%). 66.7% of infections were among the unemployed persons and 33.3% of other cases of infection were seen in people with free jobs, workers and employees. The most important factors in the development of pulmonary fungal infections in the patients were: 5 cases of malignancy (33.3%), corticosteroid use in 2 cases (33.3%), tuberculosis in 1 case (22.2%) and diabetes mellitus in 1 case (11.2%). There was no significant relationship between fungal contamination with sex, age, occupation, marriage and type of disease.

**Conclusion:** The results of this study showed that immunocompromised patients are prone to fungal infections, especially Candidiasis and Aspergillosis. Therefore, the use of control methods to reduce the probability of such patients to fungal infections should be considered.

**Keywords:** fungal lung infections, immunocompromised patients, Iran.

\* Corresponding author: Department of Medical Parasitology and Mycology, School of Medicine, Payambar Azam Educational Complex, Basij Sq., Sardasht, Arak, Iran.  
Tel: +98 86 34173502  
E-mail: didehdar\_m@arakmu.ac.ir