

گزارش ۱۴ مورد هیپوکالمی در اسهالهای ودرمان از راه خوراکی

*دکتر سید جلال الدین شریفی

علاوه بر مقدار کل پتاسیم بدن نسبت پتاسیم داخل سلولی به پتاسیم خارج سلولی بعلت اثر آن در "پتانسیل استراحت" (Resting membrane potential) سلولهای عصبی و عضلانی فوق العاده مهم است (۱۵ و ۱۶). کاهش پتاسیم پلاسمای شدت "پتانسیل استراحت" را افزایش داده نتیجتاً "موجب افزایش پولازیزاسیون" جدار سلول می‌شود.

بالعکس افزایش پتاسیم پلاسمای شدت پتانسیل جدار سلولی را کم کرده، موجب تحریک پذیری بیشتر سلول می‌شود.

دو عامل در تغییرات اثر پتاسیم موثرند (۱۵).

۱- سرعت تغییر غلظت پتاسیم سرم.

۲- تحریک پذیری جدار سلول با عوامل دیگری غیر از پتاسیم از قبیل یونهای کلسیم، منیزیم، سدیم و هیدرژن ارتباط دارد.

خلاصه:

در تابستان ۱۴۰۹ تعداد ۱۴ مورد هیپوکالمی شدید بعلت اسهال و استفراغ بستری شدند. متوسط پتاسیم سرم بیماران ۲/۴ (حداقل ۱/۸ و حداکثر ۲/۹) میل اکیوالان در لیتر بوده. همگی از راه خوراکی بدون استفاده از سرمهای تزریقی با موفقیت درمان شدند. این گزارش اولین موارددارمان اسهال با هیپوکالمی شدید از راه خوراکی است (۱ تا ۵ و ۷ تا ۹ و ۱۸ و ۲۰).

پتاسیم

برخلاف سدیم، که تقریباً تمام آن خارج سلولها است، پتاسیم تقریباً محدود بداخل سلولها است. پتاسیم در تنظیم تعداد زیادی از اعمال سلولی اثر مهمی دارد.

درمان تزریقی (۱۱۱۰۱۵۰۱۰۱۲۰)

درمان اصلی تجویز پتاسیم است. از آنجایی که سلولها با سرعت محدودی می‌توانند پتاسیم داخل سلولی را بحد طبیعی بازگردانند، تجویز سریع پتاسیم داخل رودی، حتی در بیمارانی که هیپوکالمی شدید دارند، فوق العاده خطرناک است و ممکن است منجر به دیسربیتمی های کشنده شود. مقدار پتاسیم و سرعت تجویز و غلظت آن در مایعات داخل وریدی باید دقیقاً "محاسبه شود.

از زیابی دائمی بیماریا الکتروکاردیوگرافی و اندازه گیری مکرر غلظت پتاسیم سرم در درمان بیماران هیپوکالمی شدید، از کارهای اساسی است.

برای جایگزین کردن پتاسیم، انفوژیون کمتر از ۶٪ میلی اکیوالان بازاء کیلوگرم وزن در ساعت و غلظت کمتر از ۸۰ میلی اکیوالان در لیتر کافی است (۱۵).

معضی متابع به شناهداری کنند مقدار پتاسیم ۳ میلی اکیوالان بازاء کیلوگرم در شباهه روز و غلظت آن از ۴۰ میلی اکیوالان در لیتر در شباهه روز تجاوز نکند (۱۶).

روش خوراکی

درمان هیپوکالمی شدید بعلت اسهال و استفراغ از راه خوراکی ناکنون گزارش نشده است (۱۷ و ۱۸).

در تابستان ۱۳۵۹ تعداد ۳۱۶ بیمار بعلت اسهال و استفراغ شدید یا متوسط در بیمارستان بهرامی بستره شدند، همگی با روش خوراکی بدون استفاده از محلولهای وریدی با موفقیت درمان شدند. از ۱۱۶ مورد دیگر پتاسیم پلاسما اندازه گیری شد، ۱۴ مورد پتاسیم کمتر از ۳ میلی اکیوالان در لیتر داشتند.

مشخصات بیماران بشرح زیر است:

جنس پسر ۱۵ دختر ۴

فونتانل فرورفتہ ۸ - کمی فرورفتہ ۲ - بسته ۱ - نامعلوم ۳
تورگور کم شده ۷ - کمی کم شده ۲ - طبیعی ۴ نامعلوم ۱
چشمها گود رفتہ ۱۰ - کمی گود رفتہ ۱ طبیعی ۱ نامعلوم ۲
مخاط دهان خشک ۴ - کمی خشکی ۲ - طبیعی عنامعلوم ۲
قوام مدفوع آبکی ۱۳ - نامعلوم ۱
درجهدریدرانتاسیون، شوک ۱ - شدید ۷ - متوسط عمورد

علل هیپوکالمی

علل هیپوکالمی را می‌توان به شرح زیر تقسیم بندی کرد (۱۵).

* علل مربوط به کمبود مقدار پتاسیم تجویز شده.

* علل مربوط به افزایش حرکت پتاسیم بداخل سلولها از قبیل الکالوز و افزایش ترشح انسولین.

* علل مربوط به افزایش دفع پتاسیم از راه ادرار مثل افزایش الدوسترون، تجویز دیورتیکها و سیدوز توبولر کلیوی.

* علل مربوط به افزایش دفع پتاسیم از راه گوارش از قبیل کشیدن متواالی ترشحات معده و روده ها و اسهال و استفراغ. بحث این مقاله مربوط به دفع پتاسیم بعلت اسهال و استفراغ است.

دفع پتاسیم بعلت اسهال و استفراغ

در شخص طبیعی بالغ، تقریباً ۳ تا ۶ لیتر شیره معده و پانکراس و صفا و ترشحات گوارشی در هر روز وارد روده های شود. تمام این مایعات جذب شده فقط ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر آب و ۵ تا ۱۰ میلی اکیوالان پتاسیم در مدفع دفع می شود.

از آنجایی که هر کدام از ترشحات گوارشی پتاسیم دارند، دفع هر کدام آنها موجب کاهش پتاسیم بدن می شود. بنابراین در اسهال و استفراغ پتاسیم از دستگاه گوارش دفع می شود (۲۱ و ۲۶).

در بیمار بالغ و بائی دفع روزانه ممکن است حدود ۸ لیتر آب، ۱۰۰۰ میلی اکیوالان سدیم و ۱۳۰ میلی اکیوالان پتاسیم باشد (۲۱).

هیپوکالمی تغییرات اختصاصی در الکتروکاردیوگرام ایجاد می کند، که ناشی از تأثیر ریولازیوسیون بطنها است (۱۹).

در نتیجه قطعه ST پائین افتاده ارتفاع موج T کم می شود.

با کاهش شدید تر پتاسیم سرم، ارتفاع موج P زیاد شده، فاصله P-R زیاد شده، و کمیکس QRS ممکن است بهن شود (۱۹) بعلاوه، انواع دیس ریتمی ها ممکن است ایجاد شود.

حداکثر	متوسط	حداقل	
۱۰/۵	۶	۴	وزن بسته بر حسب کیلوگرم
۱۸	۶	۱	مدت بسته بر حسب روز
۱۱	۷	۴/۲۵۰	وزن مرخصی بر حسب کیلوگرم
%۱۵	%۱۰	%۳	درصد افزایش وزن
۲۴	۱۰	۵	سن بر حسب ماه
۴۰/۵	۳۸/۴	۲۶/۴	درجه حرارت رکتوم
۱۶۰	۱۱۷	۱۱۰	" " نیض در دقیقه
۴۴	۲۲	۲۲	" " تنفس در دقیقه
۱۴	۷	۱	مدت استفراغ بر حسب روز
۹۰	۱۱	۱	مدت اسهال بر حسب روز
۱۳	۱۰	۳	دفعات اسهال در شبانه روز
۸	۶	۳	دفعات استفراغ در شبانه روز
۱۵۲	۱۳۷	۱۲۰	سدیم پلاسمای میلی اکیوالان / لیتر
۲/۹	۲/۴	۱/۸	پتاسیم پلاسمای میلی اکیوالان /
۲۰۰	۴۲	۲	سدیم اولین نمونه ادرار "
۲۱	۱۴	۰/۴	پتاسیم اولین نمونه ادرار "
۴۵	۲۲	۰	سدیم اولین نمونه مدفوع "
۶۰	۳۰	۰/۸	پتاسیم اولین نمونه مدفوع "

درمان خوراکی

درمان با محلولی با فرمول زیر بنام الکترولیت A (EA)

Concentration	A	mmol/L
Na		80
K		20
HCO ₃ ⁻		35
Cl		65
Dextrose		70
OSMOLALITY		270 mosmol/Kg

نتیجه کاملاً "موقتیت آمیز بود. در این گروه مرگ و میر نداشتیم.

تركیب الکترولیت B (EB)

Concentration	mmol/L
Na	40
K	30
HCO ₃ ⁻	25
Cl ⁻	45
Dextrose	130

OSMOLALITY	270 mosmol/Kg
------------	---------------

نتیجه:

الکترولیتهای خوراکی A، B بطور کاملاً "موئثر و بی ضرر هیپوکالمی را بر طرف می کند و برخلاف روش تزریقی که مشکلات زیادی برای تجویز پتاسیم و درمان هیپوکالمی (قبل از اینکه بیمار ادرار کند) موجود است با روش خوراکی می توان از ابتدا پتاسیم تجویز کرد.

بنظر مرسد جذب انتخابی در دستگاه گوارش و عبور تقریباً ۹۵ درصد پتاسیم جذب شده ازوریدباب. و مجاورت با سلولهای کبد و اعمالیکه کبد انجام می دهد، خطراتی که با تجویز پتاسیم از راه تزریقی وجود دارد از راه خوراکی موجود نیست.

از راه لوله نازوگاستریک (پس از تخلیه معده در صورتیکه ترشح یا موادی در آن باشد) شروع می کنیم سرعت قطرات را طوری تنظیم می کنیم که مقدار مایع ۴۰ میلی لیتر بازه کیلوگرم در ساعت باشد.

میزان احتیاج معمولاً حدود ۲۵۰ میلی لیتر بازه کیلوگرم وزن است که در حدود ۶ ساعت طول می کشد. برای تهیه محلول EA یک پاکت پودر EA در ۲۵۰ میلی لیتر آب نوشیدنی حل می شود. (بنابراین یک پاکت پودر برای یک کیلوگرم وزن در مدت ۶ ساعت تجویز می شود).

در مدت ۶ ساعت پتاسیم بمقدار ۵ میلی اکیوالان / کیلوگرم به بدن میرسد.

پس از برطرف شدن درعیدراتاسیون (وگاهی شوک) و سایر علائم مالیتی با الکترولیت B (EB) کمدين کمتر و پتاسیم بیشتری دارد بمقدار ۲۵۰ میلی لیتر بازه کیلوگرم وزن در ۲۴ ساعت درمان بیمار ادامه می یابد (یک پاکت در یک کلیوان ۲۵۰ میلی لیتری برای یک کیلوگرم وزن در یک شبانه روز) ترکیب محلول EB بشرح زیر است:

و بدین طریق پتاسیم حدود ۷ میلی اکیوالان بازه کیلوگرم در شبانه روز تجویز می شود. با توضیح اینکه در ۲۴ ساعت اول پتاسیم بمقدار ۱ میلی اکیوالان بازه کیلوگرم وزن تجویز شده است.

پتاسیم پلاسمای بیماران بهبودی یافت.

References:

- Barzgar, M.A., et al: Evaluation of the effectiveness of Oral rehydration in gastro-enteritis in children under 3 years of age, west Azerbaijan Iran, 1977. Presented to the Regional Scientific Meeting on the Epidemiology of Enteric Infections of the International Epidemiology Association. (Alexandria, May 27-31, 1978). WHO Document. Ent. Inf.WP.No.18.

- 2- Chatterjee, A. et al, Oral rehydration in infantile diarrhoea controlled trial of a low sodium-glucose electrolyte solution Arch Dis. Child, 53:284-289, 1978.
- 3- Colle, E. et al: Hypertonic dehydration (Hypernatremia), the role of feedings high in solutes. Pediatrics: 22:5-12, 1958.
- 4- Darrou, D.C. et al: Disturbances of water and electrolytes in infantile diarrhoea, Pediatrics 3:129-156, 1949.
- 5- Field, M.: New Strategies for treating watery diarrhoea, editorial, N Engl J. Med. 279: 1121-1122. 1977.
- 6- Fordtran, J.S., and J.M. Dietschy: Water and electrolyte movement in the intestine, Gastroenterology, 50: 263, 1966.
- 7- Harrison, H.E.: The treatment of diarrhoea in infancy. Pediat. Clin. North Am. 1:335-384, 1954.
- 8- Harrison, H.E.: et al: Hypernatremic dehydration. Pediatrics clin. North Am. 6: 193-199, 1959.
- 9- Hirschhorn, N.: et al: Oral fluidotherapy of Apache Children with acute infectious diarrhoea, Lancet, 2:15-18. 1972.
- 10-Hogg, R.J.: Acute renal failure. In Levin, D.L. Morrissey C., and Moore, G.C. (eds). A Practical Guide to Pediatric Intensive Care, St. Louis, C.V. Mosby Co., 1979, PP. 70-77.
- 11-Howie, A.D., and R.W. Strachan: Slow release Potassium chloride treatment, Br. Med. J., 2:176, 1975.
- 12-Hutchesson, D.E.: Benefit-risk factors associated with supplemental potassium therapy, J. Clin. Pharmacol., 16:85, 1976.
- 13-Kahn, C.R., A.G. Levy, J.D. Gardner, J.V., Miller, P. Gordon, and P.S. Schein: Pancreatic cholera and hypokalemia, Am. J. Med., 25:374, 1958.
- 14- Mahalanabis, D. et al., Oral fluid therapy of cholera among Bangladesh refugees, Johns Hopkins Med. J. 132:197-205, 1973.
- 15- Perkin, R.M., and D.L. Kevin. Common Fluid and Electrolyte Problems in the Pediatric Intensivs Coreunit. Pediat. Clin. North Am. 27/3-567-585. 1980.
- 16- Robson, A.M.: The Pathophysiology of Body Fluids. In Nelson textbook of Pediatrics, Saunders, Co. London, P. 274., 1979.
- 17-Rose, B.D.: Clinical Physiology of acid-Base and Electrolyte Disorders. 1977. McGraw-Hill Inc. London.
- 18- Sack, R.B., et al.: The Current Status of oral therapy in the treatment of acute diarrhoeal illness. Am. J. Clin. Nutr. 31:2251-2257, 1978.

- 19- Surawicz, B.: Relationship between electrocardiogram and electrolytes. Am. Heart J., 73:814-830, 1967.
- 20- Villamil, M.F., E.C. Deland, R.P. Henney, and J.V. Moloney: Anion effects on cation movements during correction of potassium depletion, Am. J. Physiol., 229: 161, 1975.
- 21- Wotten, R.H., F.M. Morgan, Y.N. Songkhla, B. Vanikiati, and R.A. Phillips: Water and electrolyte studies in cholera, J. Clin. Invest., 38:1879, 1959.
- 22- Weil, W.B., and Baile, M.D.(eds): Fluid and electrolyte metabolism in infants and children: A Unified Approach. New York, Grune and Stratton, Inf., 1977. PP. 151-199.
- 23- WHO Scientific Working Group, Clinical management of acute diarrhoea, unpublished document. WHO DDC/79.3, 1979.
- 24- A Manual for the treatment of Acute Diarrhoea. Control of Diarrhoeal Diseases. WHO/CDD/SER/80.2.
- 25- Oral Rehydration therapy. An. Annotated Bibliography. Bull. WHO.1983.