

دکتر پرندهان

سوراخ شدن زخمهای معده و دوازدهه و درمان جراحی آنها

کولیک ناحیه صفاق کوچک راجستجو کرد
چه بسا زخمهای هستند که در سطح
خلفی معده و در این ناحیه سوراخ
میشوند.

تشخیص - تشخیص پارگی
زخمهای معده و دوازدهه گاهی اوقات
بسیار ساده و گاهی بسیار مشکل است
معهداً با دردهای شدید و ناگهانی که
مانند اینست با چاقو بشکم مريض ضربه
وارد می‌آید شخص رامیتواند باین بیماری
راهنمایی نماید و از وسائل مختلف
لابراتواری و رادیوگرافی Ray X تقریباً
۸۰ تا ۹۰ درصد تشخیص قطعی را بدهد.
بیماریکه سالها برای اولسر تحت

درمان طبی بوده و در نیمه شب درد
شکم ناگهانی پیدا میکند و تمام علائم
پریتونیت حاد در او متظاهر میباشد در
رادیوگرافی شکم در حال نشسته و یا
خوابیده هوای آزاد در زیر دیافراگم
دیده میشود تشخیص بیماری را مسلم
میدارد. معهداً با بیماریهای مهم زیر

یکی از عوارض زخمهای معده یا
دوازده سوراخ شدنشان میباشد و
بایستی پس از تشخیص فوری بدرمان
آن پرداخت زیرا هرچه دیرتر تشخیص
داده شود دیرتر درمان میشود و نسبت
مرگ و میر آن بالاتر خواهد بود (۱۵)
در صد).

۱ - بطور کلی ۶-۳ در صد زخمهای
معده و دوازدهه سوراخ میشوند که
۹۵ در صد آنها در سطح قدامی معده
و سه سانتیمتری قسمت اول دوازدهه
مشهود و قسمت اعظم زخمهای معده
هم در طول خمیدگی کوچک و در ناحیه
پیاویر بوجود میآیند.

زخمهایی که در قسمت خلفی
دوازدهه قرار دارند سوراخ شدن آنها
 بصورت سوراخ شدن در اعضاء خلفی
Penetration بوده و دارای درد شدید
و همراه خونریزی شدید میباشد. اگر
در لایه اپاتومی در نواحی فوق پارگی پیدا
نشد بایستی با باز کردن لیگامان گاسترو-

- قابل افتراق است و بایستی همیشه قبل از اینکه تصمیم عمل جراحی برای مریض گرفته شود در نظر گرفت :**
- ۱ - التهابهای حاد پانکرآس : در این بیماری اگر همراه خونریزی داخل باشد حالت عمومی بیمار فوق العاده خراب است .
 - ۲ - مریض سابقه طولانی نوشیدن مشروبهای الکلی داشته بخصوص در روز شروع درد .
 - ۳ - آمیلاز سرم خون فوق العاده بالا رفته و کلسیم سرم خون پائین می‌آید . این بیماری در اشخاص که دارای التهاب حاد کیسه صفراء میباشند بطور ثانویه دیده میشود . عواقب پانکرا-تیت های الکلی بعلت سیروزی شدن خود غده مانند کبد خیلی و خیم تر از نوع دوم است .
- التهاب حاد کیسه صفراء . مریضی است که معمولاً چاق و در سابقه زندگیش از غذاهای چرب و سرخ کردنی ناراحت میشده است درد دارد که به شانه راست تیر میکشد (این علائم در سوراخ شدن زخم‌هادرحالیکه مقدار هوای زیر دیافراگم زیاد بشد نیز دیده میشود) در دنایه مورفی او (علامت مورفی) جلب توجه میکند .**
- در رادیوگرافی ساده‌از شکم مریض گاهی اوقات سنگهای کیسه صفراء دیده میشود و آمیلاز خون قدری بالاتر از حد معمول رفته پانکراتیت ثانویه و بالاخره در رادیوگرافی با ماده حاجب Cholangiogram کیسه صفراء بهیچوجه دیده نمیشود در حالیکه در سوراخ شدن اولسپیتیک این رادیوگرافی معمولاً عادی است .**
- ۲ - انفارکتوس حاد میوکارد :** بیمارانی دیده شده‌اند که به بخش‌های جراحی نیمه شب بعلت درد شدید ناحیه بالای شکم مراجعه کرده‌اند که در معاینه دارای تمام علائم پریتونیت حاد بوده‌اند در حالیکه یک الکتروکاردیوگرام و زیاد بودن ترانس آمیناز سرم خون یک انفارکتوس میوکارد را ثابت کرده‌است .
- ۴ - بالاخره بیماریهای دیگری از قبیل پنومونی طرف راست و یا ترمبوز شریان مزانتریک فوکانی در بیماران مسن و قلبی باید در نظر گرفته شود .**
- چون محتویات معده یا دوازدهه پس از سوراخ شدن رخ به بن بست طرف راست سرمازیر میگردد گاهی اوقات تشخیص آپاندیسیت حاد نیز مطرح میشود .**

- ۳ - بالاخره تعیین و نگهداشتن آب و الکترولیتهای خون بحال عادی این درمان تازمانیکه تمام علائم پریتونیت باقی است بایستی ادامه داشته باشد.
- ب - سوراخ این پارگی بسیار کوچک بوده و بوسیله طبیعت بسته شده و حالت عمومی بیمار رو به بهبودی است در این صورت عمل جراحی مجازی نداشته و باید درمان فوق را تازمانیکه بیمار بهبودی کامل پیدا نماید ادامه داد.
- چه نوع عمل جراحی باید برای بیماران نمود؟
- بعضی از جراحان عقیده دارند بایستی برای آنها عمل اساسی یعنی گاسترکتومی نمود.
- و منظور آنها برداشتن قسمت اعظم معده است حال آنکه عده زیادی از جراحان در سالهای اخیر عقیده دارند که زخمهای معده و دوازدهه را باید با عمل یا برداشتن ^۱ معده و اعصاب دهم درمان نمود و امروزه طرف داران آنها بخصوص در درمان زخمهای دوازدهه زیاد میباشد و بنابراین چون برای بریدن عصب دهم باید وارد مدیاستن بشوند و در این مورد بخصوص خطر مدیاستنیت زیاد است و باضافه این عمل وقت زیاد
- ۵ - بیماریهای فریاد دیگری هم از قبیل پارگیهای آنوریسم آئورت و هپاتیتهای حاد ویروسی نیز وجود دارند که بحث آنها از حوصله این مبحث خارج است.
- درمان : باید دانست که درمان پارگی زخمهای معده و یا دوازدهه جراحی است مگر اینکه :
- ۱ - حال بیمار بقدرتی خراب باشد که بهیچوجه نتواند عمل جراحی را تحمل کند.
 - ۲ - بیمار دیر مراجعه کرده باشد
 - ۴۸ - (ساعت) و در این حال دو اتفاق میافتد.
 - ۳ - حال مریض فوق العاده بد و دارای تمام علائم پریتونیت همگانی و آبسه زیر دیافراگم بوده و دارای تب شدید و حالت شک میباشد در این صورت عمل جراحی نه تنها مفید نخواهد بود بلکه بیمار را زود تر بطرف مرگ میکشاند در این صورت درمان عبارت است از.
 - ۱) - گذاشتن یک لوله لاستیکی از راه بینی به معده و وصل کردن به یک پمپ و انگن - استین Wongen. Steen برای خالی نگهداشتن معده یا عمل آسپیراسیون متناوب.
 - ۲) - آنتی بیوتیک بمقدار فراوان از راه ورید

زیر دیافراگم بیشتر خواهد شد . و بالاخره دوران نقاوت را طولانی مینمایند . در زخمهای معده که سوراخ شده‌اند اشکال دیگری هم وجود دارد و آن اینست که آیا این زخم معده که سوراخ شده است یک زخم ساده یا زخمهای سرطانی شده میباشد .

در این عمل نباید هیچگونه اثری از متاستاز در کبد و غدد لنفاوی وجود داشته باشد در این صورت درمان تسکین بخشی یا موقتی Palliative برداشتن قسمتی از معده بوده و عمل بیلروت یا چون ۱۰ تا ۱۵ درصد بیماران بعد از برداشتن معده مجدداً دچار میگردند Gastero - Jejunostomy آناستوموز معده نباید در وحله اول تصمیم شدید در باره و اگر چنانچه نشانه متاستازی وجود ندارد با برداشتن کمی از اطراف

سوراخ شدگی برای بیوپسی Frozen section مباردت میکند و اگر چنانچه جواب صحیحی در این مورد گرفته نشد شکم را بعد از دوختن سوراخ بطريق گفته شده بسته منتظر جواب پاتولوژی برای تصمیم میباشیم .

تری برای این بیماران لازم دارد اینست که فقط به بستن سوراخ بوسیله نخ ابریشم و گذاشتن مقداری اپیپلاؤن Omentum در روی آن که عملی فوق العاده سریع است اکتفا نموده و عمل اساسی را بمرحله دیگر واگذار کرد . باید دانست که بعد از این عمل

ساده اگر بیماران تا چند روز پس از عمل تحت رژیم طبی و غذائی قرار گیرند ۳۰ درصد آنها دیگر احتیاج بعمل ندارند و زندگی خود را بخوبی میگذرانند ثانیاً چون ۱۰ تا ۱۵ درصد بیماران بعد از برداشتن معده مجدداً دچار میگردند آناستوموز معده آنها اتخاذ کرد .

چیزی که فوق العاده در عمل ساده فوق مورد بحث است شستن کامل حفره صفاقی یا حفره عمومی پریتوان Frozen section با محلول Peritoneal Cavity سرم فیزیولزی است . زیرا در تمام موارد که از سوراخ زخم موادی وارد حفره صفاق میشود خطر ایجاد دملهای

- 1 - THE SURGICAL CLINIC OF NORTH AMERICA FEB 1961 P: 37
- 2 - OPERATIVE TECHNIC BY WARREN. H. COLE P: 690, 692, 698 - 701 1956
- 3 - TEXTBOOK OF FRDERICK. CHRISTOPHER APRIL 1953 P: 1007 970