

بررسی نتایج تحریک تخمک‌گذاری همراه با IUI در بخش ناباروری بیمارستان شریعتی طی سالهای ۷۰-۷۴

دکتر مرضیه آفاحسینی، متخصص زنان و زایمان و نازایی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر اشرف آل‌باین، متخصص زنان و زایمان و نازایی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر افسانه خادمی، متخصص زنان و زایمان و نازایی، فلوشیپ نازایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حجت‌الله سعیدی، PHD بیوشیمی بالینی، ریاست آزمایشگاه IVF بیمارستان شریعتی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

A Survey of Four Years Intrauterine Insemination at Shariati Hospital ABSTRACT

Intrauterine insemination (IUI) has been practiced since the late 1800's primarily for idiopathic infertility, and in men with deficient semen parameters. The procedure is done by placing washed sperm in uterus a few hours before ovulation.(2)

The records of 427 couples receiving IUI for treatment of infertility at Shariati hospital in 1370-74 were reviewed retrospectively. These patients had IUI in 574 cycles. Eighty patients became pregnant and delivery rate was 14% per cycle. Pregnancy rate is impressive when ovulation induction is combined with insemination timed just before ovulation.

The success rate in Shariati hospital is comparable to other infertility centers in the world and cost of a cycle of IUI with HMG superovulation is approximately one third the cost of IVF-ET or GIFT cycle and avoids invasive oocyte retrieval and extracorporeal fertilization. So we suggest that women with refractory infertility without anatomic distortion of pelvis can have at least 3-6 cycles of IUI before IVF or GIFT.

Key Words: Intrauterine insemination; Infertility; Ovulation

چکیده

بیمارستان شریعتی تقریباً با سایر مراکز ناباروری دنیا مطابقت می‌نماید و با توجه به اینکه IUI یک روش ساده، ارزان و آسان نسبت به IVF، GIFT و ZIFT که به ترتیب نتایج بهتری در درمان نازایی با عمل غیرلوله‌ای دارند (۲)، می‌باشد، بنظر می‌رسد صلاح در این باشد که برای بیماران نازاکه شرایط انجام IUI را دارند، حداقل قبل از پرداختن به سایر روش‌های درمانی ۳ تا ۶ سیکل IUI انجام شود.

واژه‌های کلیدی : IUI؛ ناباروری؛ تخمک‌گذاری

مقدمه

استفاده از اسپرم شوهر و تلقیح آن به همسر در نازایی یک روش نسبتاً شایع در درمان نازایی می‌باشد

(Intrauterine Insemination) IUI ناباروری می‌باشد که در آن از اسپرم‌های متحرک شوهر جهت تلقیح استفاده می‌شود. این عمل طی چند ساعت قبل از تخمک‌گذاری انجام می‌گیرد (۲). در طی مطالعه گذشته‌نگر که در بخش ناباروری بیمارستان شریعتی در طی بیش از سه سال انجام شد، ۴۲۷ پرونده از بیماران تحت درمان مورد بررسی قرار گرفت. در بیماران فوق، ۵۷۴ سیکل IUI انجام شد.

در کل ۸۰ مورد حاملگی اتفاق افتاد، یعنی میزان حاملگی به ازای هر سیکل IUI برابر ۱۰٪ بوده است. هرچقدر تعداد سالهای نازایی کمتر و تعداد سیکلهای درمانی بیشتر باشد شانس حاملگی افزایش می‌یابد. میزان موفقیت IUI در مقالات مختلف از ۳٪ تا ۴٪ گزارش شده است (۳). بنابراین میزان موفقیت در بخش نازایی

بررسی شامل اندازه‌گیری FSH، LH، استرادیول و پروژسترون در روز ۱-۳ شروع قاعده‌گی بوده است. در این مرحله بیمارانی که استرادیول سرم بیشتر از ۱۰۰، و یا پروژسترون بیشتر از ۱ داشتند، حذف شدند. نتیجه مثبت تحریک تخمک‌گذاری به شکل دیده شدن فولیکول با اندازه بزرگتر از ۱۶ میلی‌متر به همراه LH surge و تأیید بعدی آن با افزایش پروژسترون بوده است.

روش آماده‌سازی اسپرم روش up-Swim بود. تزریق داخل رحمی با استفاده از کاتتر مخصوص بلا فاصله بعد از آماده شدن اسپرم انجام شد و بیماران به مدت ۱۵-۲۰ دقیقه در حالت دراز کشیده باقی ماندند. حاملگی با انجام تست HCG- β بعد از تأخیر قاعده‌گی نشان داده شد و پی‌گیری آن با سونوگرافی انجام شد.

آنالیز آماری

مسایل مورد بررسی در این مطالعه شامل موارد زیر بود: شیوع سنی، مدت نازایی، علت نازایی، تعیین میزان حاملگی به ازای هر سیکل (Cycle fecundity) در گروههای سنی مختلف، تعیین میزان حاملگی به ازای هر سیکل IUI در رابطه با علل مختلف نازایی، موقوفیت روش به ازای هر سیکل درمان با توجه به دفعات انجام آن، بررسی عاقبت حاملگی و تعیین میزان حاملگی ترم، سقط، زایمان زودرس و حاملگی خارج از رحم.

اطلاعات به شکل mean گزارش شدند. برای بررسی آماری از آزمون کای دو و T-test و آزمون اختلاف نسبت در دو گروه استفاده شد.

نتایج

در این مطالعه، بیماران به گروههای سنی مختلف تقسیم شدند. جوانترین بیمار در این مطالعه ۱۸ ساله و مسن‌ترین آنها ۴۰ ساله بود. میانگین سنی ۲۸/۵ سال و بیشترین تعداد ۲۶-۳۰ ساله بودند (جدول ۱).

جدول ۱: توزیع فراوانی مطلق و نسبی بیماران بر اساس سن

گروه سنی	فراوانی مطلق	فراوانی نسبی
۱۶-۲۰	۱۰	%۲/۵
۲۱-۲۵	۱۳۱	%۳۰/۵
۲۶-۳۰	۱۷۵	%۴۱
۳۱-۳۵	۸۹	%۲۱
۳۶-۴۰	۲۲	%۵

و در بیماران با فاکتور مردانه (احتلال اسپرم)، اختلالات دهانه رحم، عمل ایمونولوژیک و نازایی با علت نامعلوم مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این روش (Artificial insemination of husband) AIH شوهر و تلقیح آن به همسر) گفته می‌شود. تلقیح در قسمتهای مختلف شامل دهانه رحم (ICI)، داخل پریتوان (Intracervical insemination) IUI، داخل رحم (Intrauterine insemination) DIPI (Direct intraperitoneal insemination)، TUTI (Trans uterotubal insemination)، انجام می‌شود (۵). انتخاب تکنیک و روشن آماده‌سازی اسپرم بستگی به علت و شدت نازایی دارد و از میان روش‌های فوق IUI بیشتر مورد استفاده و توجه قرار گرفته است (۶-۸).

روش آماده‌سازی اسپرم، تعداد سیکلهای درمانی، روشن تحریک تخمک‌گذاری و زمان تلقیح در مراکز درمانی متفاوت می‌باشد و نتیجه آن به صورت حاملگی شیمیایی، بالینی و قرم بیان می‌شود. اگرچه تلقیح داخل رحمی نسبت به تلقیح داخل دهانه رحم ارجح می‌باشد، ولی در موارد اختلال آناتومیکی مثل هیپوسپادیازیس، ناتوانی جنسی، اختلال در مقاریت مثل واژینیسموس یا دیس‌بارونی، ICI نیز نتایج خوبی دارد و انجام می‌شود (۴).

روش و مواد

این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و غیرتجربی است و به صورت گذشته‌نگر می‌باشد.

مطالعه بر روی بیمارانی که در فاصله سالهای ۱۳۷۰-۷۴ در مرکز ناباروری بیمارستان شریعتی تحت درمان IUI قرار گرفته‌اند صورت پذیرفته است. از میان بیماران مراجعه کننده در مدت مذکور ۴۲۷ زوج که بررسی نازایی را بطور کامل انجام داده بودند، انتخاب شدند. معیار ورود به مطالعه موارد زیر بود:

(۱) مدت نازایی بیشتر یا برابر یک سال

(۲) سن خانم کمتر یا برابر ۴۰ سال

(۳) نازایی با علت غیرلوهای

سیکل تحریک تخمک‌گذاری

بیماران تحت سیکل تحریک تخمک‌گذاری قرار گرفتند. در شروع سیکل ابتدا بررسی هورمونی برای بیمار انجام شد. این

آندو متريوزيس از نوع minimal، عامل لگني به شكل بسته بودن يك لوله يا چسبندگيهای ظريف لگني، پرولاكتين بالا و موارد ناشناخته بود. (جدول ۳) يайд توجه داشت که بسته بودن هر دو لوله و چسبندگيهای شدید لگني علت نازابي نبوده است.

جدول ۲ : توزيع فراوانی مطلق و نسبی طول بیماران بر اساس علت نازابي

فراوانی نسبی	فراوانی مطلق	فاکتور نازابی
%۲۶	۱۱۰	فاکتور مرد
%۳۰	۱۲۹	فاکتور زن
%۱۰	۴۴	نازابي با علت ناشناخته
%۳۴	۱۴۴	مشكل زن و مرد با هم

از نظر سن خاتم، میزان حاملگي به ازاي هر سپيل در گروه سنی ۱۶-۲۰ سال بيشترین و در گروه سنی ۳۱-۳۵ سال و ۳۶-۴۰ سال كمترین مقدار است. البته اين اختلاف از نظر آماري معنی دار نبود. (جدول ۴).

در میان بیماران ۳۳۴ نفر (٪۷۸) نازابي اولیه و ۹۳ نفر (٪۲۲) نازابي ثانويه داشتند. در این برسی كمترین طول مدت نازابي يك سال و بيشترین مدت ۲۰ سال بود و عمدهاً طول مدت ۱۰-۱۵ سال و میانگین آن ۷/۵ سال برآورد شد (جدول ۲).

جدول ۲ : توزيع فراوانی مطلق و نسبی طول مدت نازابي بر حسب سال

طول مدت نازابي	فراوانی نسبی	فراوانی مطلق
۱-۵	۱۵۵	%۳۶
۶-۱۰	۱۸۱	%۴۲/۵
۱۱-۱۵	۷۹	%۱۸/۵
۱۶-۲۰	۱۲	%۳

علل نازابي در بیماران شامل مشکلات اسپرم که به مواردي اطلاق می شود که تعداد اسپرم زير ۲۰ ميليون با اشكال غيرطبقيعی بيش از ٪۷۰ و تحرك كمتر از ٪۳۰ باشد، اختلال تخمرگذاري به صورت تحمدان پلي كيسيك و آمستوره هيپوتالاميك،

جدول ۴ : ارتباط سن خاتم با نتیجه IUI

سن	تعداد بیمار	تعداد سپيل	تعداد حاملگي	حامليگي به ازاي سپيل	حامليگي به ازاي بیمار	فراوانی نسبی
۱۶-۲۰	۱۱	۴	۱۱	۰/۳۶	۰/۴۰	
۲۱-۲۵	۱۲۱	۲۸	۱۷۴	۰/۱۶	٪۱۶	
۲۶-۳۰	۱۷۵	۳۴	۲۲۴	۰/۱۴	٪۱۳	
۳۱-۳۵	۸۹	۱۰	۱۲۵	۰/۱۸	٪۱۱	
۳۶-۴۰	۲۲	۴	۳۰	۰/۱۲	٪۱۸	
جمع	۴۲۷	۸۱	۵۷۴	۰/۱۴	٪۱۹	

کيم کاهش اثر IUI به شكل کاهش میزان حاملگي به ازاي هر سپيل از ۰/۱۹ به ۰/۱۱، کشف می شود. اين کاهش اثر از نظر آماري معنی دار است ($P < 0.05$). جهت بررسی از آزمون اختلاف نسبت در دو گروه (Z-test) استفاده شد ($Z = 2/57 = 2.07$) که بيشتر از ۱/۹۶ است.

از نظر طول مدت نازابي بيشترین موفقیت در نازابي ۱-۵ سال (Cycle fecundity: ۰/۱۹) بدست آمد و با افزایش طول مدت نازابي میزان موفقیت کاهش یافت، بطوريکه کمترین موفقیت در بیماران با طول مدت نازابي ۱۶-۲۰ سال (Cycle fecundity: ۰/۰۷) دیده شد (جدول ۵). اگر بیماران را از نظر مدت نازابي به دو گروه کمتر از ۵ سال و بيشتر از ۵ سال تقسیم

جدول ۵ : رابطه مدت نازابي و نتیجه IUI

مدت نازابي	تعداد بیمار	تعداد سپيل	تعداد حاملگي	حامليگي به ازاي سپيل	حامليگي به ازاي بیمار	فراوانی نسبی
۱-۵	۱۵۵	۲۱۳	۴۰	۰/۱۹	٪۲۵	
۶-۱۰	۱۸۱	۲۴۱	۳۱	۰/۱۳	٪۱۷	
۱۱-۱۵	۷۹	۱۰۷	۸	۰/۰۷۵	٪۱۰	
۱۶-۲۰	۱۲	۱۴	۱	۰/۰۷	٪۸	
جمع	۴۲۷	۵۷۴	۸۰	۰/۱۴	٪۱۹	
بیشتر از ۵ سال	۱۵۵	۲۱۳	۴۰	۰/۱۹	٪۲۵	
بیشتر از ۵ سال	۲۷۲	۲۶۱	۴۰	۰/۱۱	٪۱۵	

(٪۰.۵)، و ۲۹ مورد حاملگی در مواردی بوده است که زن و مرد با هم عامل نازابی بودند (٪۰.۳۶). از ۸۰ بیمار حامله ۱۰ مورد سقط شده که متعادل ٪۱۲/۵ می‌باشد. یک مورد زایمان زوردرس (ولی در سنی که جنین قابلیت حیات داشته) و ۴۷ مورد زایمان ترم (٪۰.۶۰) رخ داده است. ۲۲ مورد، بیمارانی بودند که بعد از ۸ هفتگی به شهرستان رفته‌اند و اطلاعی از عاقبت حاملگی آنها در دست نیست. در بیماران فوق موردي از مرگ داخل رحمی و حاملگی خارج از رحم گزارش نشد. در بیماران فوق یک مورد دوقلویی و یک مورد سه قلویی (٪۰.۲/۵) وجود داشت.

بحث

IUI یک روش درمان نازابی می‌باشد که معمولاً در بیمارانی که اسپرم طبیعی دارند ولی به علل جراحی، تروما یا بیماری، برگشت اسپرم به داخل مثانه دارند (رتروگرید اجاكولاسیون)، در نازابی به علت دهانه رحم (تنگی دهانه رحم، یا کمی موکوس)، در اختلال در مقایسه و ناتوانی جنسی، در فاکتور مردانه (اسپرم غیرطبیعی مثل آستنواسپرمی، اختلال حجم اسپرم، یا وجود آنتی‌اسپرم آنتی‌بادی)، در آندومتریوز از نوع minimal، در نارسایی فاز لوتئال و در نازابی با علت نامعلوم استفاده می‌شود (۵).

جهت انجام کار ابتدا خانم تحت درمان با داروهای تحریک تخمک‌گذاری (کلومیفن سیترات، HMG، یا هر دو با هم) قرار می‌گیرد و توسط سونوگرافی واژینال کنترل می‌شود.

تلقیح ۲ ± ۱۶ ساعت بعد از حداکثر ترشح LH یا در صورت عدم وجود تخمک‌گذاری، ۱۸-۳۰ ساعت بعد از تزریق HCG انجام می‌گیرد. در سیکلهای خودبخودی تلقیح قبل از تخمک‌گذاری انجام می‌شود (۲۰-۲۱).

مایع تلقیح شده، اسپرم همسر بیمار می‌باشد که توسط روشهای مختلف شامل Minipercoll، Percoll، Washing-up، Swim-up... آماده شده است و نهایتاً سبب جداسازی اسپرم‌های زنده و متحرک فاقد سمنیمال پلاسمای دبری می‌شود، بنظر می‌رسد تفاوت عمدی بین روشهای روتین وجود نداشته باشد (۹). در هر حال روش ایده‌آل شستشوی اسپرم روشنی است که سریع و ارزان باشد و سبب جداسازی اسپرم‌های متحرک و سالم بدون صدمه زدن به آن شود. حداقل تعداد اسپرم تلقیح شده نباید از یک میلیون کمتر باشد و هرچه تعداد اسپرم افزایش یابد شناسن حاملگی افزایش می‌یابد، ولی بنظر نمی‌رسد تلقیح تعداد بیشتر از ۲۰ میلیون در افزایش نتیجه مؤثر باشد (۵).

از عوارض انجام IUI عفونت (۱۱-۱۲)، درد و کرامپ، و ایجاد آنتی‌اسپرم آنتی‌بادی ذکر شده است، ولی مطالعاتی که تاکنون انجام شده افزایش تیتر آن پس از چند دوره تلقیح تراشان نمی‌دهد (۱۳-۱۴)، که البته این موضوع نیاز به مطالعات بیشتری دارد (۵).

در صد موفقیت به ازای هر سیکل IUI با در نظر گرفتن علت نازابی در جدول ۶ آورده شده است، بر اساس این جدول بهترین پاسخ در بیماران با آمنوره هیپوتalamیک (٪۰.۴۴/۵) و کمترین پاسخ در بیماران با فاکتور لگنی (٪۰.۸/۵) و علت ناشناخته (٪۰.۵/۵) بدست آمده است. (جدول ۶) از نظر آماری این یافته معنی دار بود ($P < 0.005$). برای این بررسی از آزمون اختلاف نسبت در گروه یا Z-test استفاده شد. Z = ۲/۸۲ برای فاکتور لگنی و Z = ۳/۶۸ برای فاکتور نامعلوم که هر دو از ۱/۹۶ بیشتر هستند.

جدول ۶: رابطه علت نازابی و نتیجه IUI

علت نازابی	تعداد سیکل تعداد حاملگی حاملگی به ازای سیکل	تعداد سیکل
خدمان پلی کیستیک	٪۰.۱۴۵	۲۱
پرولاکتین بالا	٪۰.۱۲	۱۴
آمنوره هیپوتalamیک	٪۰.۴۴۵	۴
فاکتور لگنی	٪۰.۱۸۵	۴
عدم تخمک‌گذاری	٪۰.۱۴	۱۸
اشکال غیرطبیعی اسپرم	٪۰.۱۲	۲۷
حرکت مختلف اسپرم	٪۰.۱۲۵	۴۲
تعداد کم اسپرم	٪۰.۱۳	۵
علت تامعلوم	٪۰.۰۵۵	۴
حداقل دو فاکتور مردانه	٪۰.۱۲	۲۶
حداقل دو فاکتور زنانه	٪۰.۱۶۵	۹
فاکتور مردانه و زنانه	٪۰.۱۲	۲۹

چون در تعدادی از بیماران بیش از یک عامل کشف شده ولی در این جدول جداگانه آورده شده است، تعداد سیکلها از ۵۲۷ سیکل بیشتر می‌باشد.

از علل موفقیت IUI تعداد دفعات IUI می‌باشد. بالاترین میزان موفقیت در بیمارانی بوده است که برای بار ششم IUI شدند (٪۰.۵۰). پس از آن بیشترین موفقیت مربوط به بیمارانی است که پنج بار IUI شدند (٪۰.۲۵) (جدول ۷).

جدول ۷: موفقیت IUI به ازای دفعات انجام آن

تعداد دفعات IUI	میزان موفقیت
۱	٪۱۰/۵
۲	٪۱۰
۳	٪۹/۵
۴	٪۶/۵
۵	٪۲/۵
۶	٪۵

از ۸۰ مورد حاملگی ایجاد شده، ۱۹ مورد با عامل مرد (٪۰.۲۴)، ۲۸ مورد نازابی با عامل زن (٪۰.۳۵)، ۴ مورد نازابی با علت ناشناخته

($P < 0.05$) (جدول ۵). در اینجا نیز از T-test استفاده شد.

جدول ۹: توزع فراوانی سیکلاتهای منجر به حاملگی با IUI بر

اساس نوع نازایی

	نوع نازایی	جمع	غیرحامله	حامله	جمع
۴۵۴	۲۹۰	۶۴	اولیه		
۱۲۰	۱۰۴	۱۶	ثانویه		
۵۷۴	۴۹۴	۸۰			جمع

البته فاکتورهای سن و مدت نازایی فاکتورهای کاملاً محدود کننده انجام IUI نیستند. ولی بر این اساس توصیه می‌شود برای بیماران با نازایی طولانی مدت این کاهش اثر IUI توضیح داده شود و سیکلاتهای متعدد IUI انجام نشده، سریعتر تصمیم برای استفاده از سایر روشهای درمان ناباروری گرفته شود.

در این مطالعه دیده شد که بیشترین نتیجه در آمنتوره هیپوتالامیک بدست آمد و بیمارانی که مشکل لگنی (مشکل یک لوله یا چسبندگی ظرف لگنی) داشتند، کمترین نتیجه مثبت از IUI را گرفتند ($P < 0.05$).

در دو مطالعه دیگر (۳۰، ۱۶) نیز کمترین آمار IUI مربوط به وجود چسبندگیهای آدنکسی بوده است. نتیجه می‌گیریم که وجود فاکتور لگنی حتی به شکل خفیف اثر منفی بر روی نتیجه IUI دارد. در نازایی با اعلت نامعلوم نیز نتیجه IUI کم است ($P < 0.05$). همانطور که در جدول ۷ دیده می‌شود، تعداد عمدات از حاملگی‌ها در سه سیکل اول IUI رخ می‌دهد. بنابراین عاقلاته است که تعداد دفعات IUI به ۶ یا کمتر محدود شود. در اکثر مطالعات نیز دیده شده که در سه یا چهار سیکل اول بیشترین تعداد حاملگی رخ می‌دهد. در مطالعه‌ای که Dodson و همکارانش انجام داده‌اند که یک مطالعه کلاسیک است، نیز در ۴ سیکل اول بیشترین تعداد حاملگی رخ داده است. البته تعداد بیمارانی که سیکل پنجم و ششم برای آنها انجام شده، کم می‌باشد. در این مطالعه ما آمار خوبی از IUI نوبت پنجم و ششم بدست آوردیم. بنظر می‌رسد این مسئله با توجه به تعداد بیمار کافی، نیاز به مطالعه جدیدتری داشته باشد. نتیجه حاملگی بدست آمده از IUI در جدول ۱۰ در مقایسه با آمار موجود در متون کلاسیک (۳۰، ۱۶) آورده شده است.

جدول ۱۰: نتیجه حاملگی با IUI

text	مطالعه	نتیجه حاملگی
(۱۱)	(۱۲/۵)	سقط
(۹)	(۰)	حامله خارج از رحم
(۲۳)	(۱/۲/۵)	چندقولی
(۸۱)	(۰/۶۰)	زایمان جنین قابل حیات**

* از سرنوشت ۲۲ بیمار که بعد از ۸ هفتگی مراجعت نکردند اطلاعی در دست نبست.

** زایمان مجموعه زایمانهای بک تلو و چندقول است.

این مطالعه در مرکز ناباروری بیمارستان شریعتی روی ۴۲۷ زوج انجام شد. برای هر یک از این بیماران ۱-۶ سیکل IUI انجام شد که در مجموع ۵۷۴ سیکل مورد مطالعه قرار گرفت. در کل در مطالعه بعمل آمده میزان موقوفیت IUI در بیماران تحت درمان در بیمارستان شریعتی با سایر مراکز نازایی دنیا مطابقت دارد (جدول ۸).

جدول ۸: میزان موقوفیت IUI و بررسی آن بر اساس نوع نازایی

نوع نازایی	اولیه	ثانویه
تعداد بیماران حامله	۶۴	۱۶
تعداد کل بیماران	۳۳۴	۹۳
درصد حاملگی به ازای هر بیمار	٪۱۹	٪۱۷
IUI تعداد سیکلاتهای	۴۵۴	۱۲۰
درصد حاملگی به ازای هر سیکل IUI	٪۱۴	٪۱۲/۵

در بررسی رابطه سن خانم با اعلت نازایی برای بررسی همبستگی سن و نتیجه درمان با IUI، از جدول ۹ که معادل ۹/۰۴ محسوبه شده است، استفاده شد. چون این رقم از ۹۵/۰٪ که برابر ۹/۴۹ است کمتر می‌باشد، بنابراین می‌توان اظهار کرد که بین سن بیمار و نتیجه درمان با IUI ارتباطی وجود ندارد و این دو وضعیت مستقل از یکدیگر می‌باشد ($P > 0.05$).

بر اساس جدول ۴ می‌بینیم که خانمهای در گروه سنی ۱۶-۲۰ سال بیشترین میزان حاملگی به ازای هر سیکل را داشتند (٪۳۶) و کمترین مقدار حاملگی در خانمهای در دهه چهارم زندگی دیده شد (میزان حاملگی به ازای سیکل ٪۸ برای ۳۱-۳۵ و ٪۱۳ برای ۴۰-۴۶ سال).

البته همانطور که گفته شد حتی با استفاده از آزمون برابری نسبت (T-test) نیز اختلاف معنی‌داری بین گروههای سنی مختلف پیدا نشد. همانطور که می‌دانیم با افزایش سن به بالای ۳۵ سال اثر درمانی هر روش کمک باروری کاهش می‌یابد (۲). ولی بیشتر بنظر می‌رسد این مربوط به خصوصیت تخدمان و کاهش رزو آن باشد نه درمان. در یک مطالعه نیز نشان داده شده است که عامل سن وقتی از ۳۹ سال بیشتر باشد باعث کاهش نتیجه مثبت IUI می‌شود (۱۵). این مطالعه با یافته مطالعه‌ای مطابقت دارد.

وجود یا عدم وجود همبستگی میان نوع نازایی و نتیجه درمانی IUI در جدول ۹ بررسی شده است که مطابق جدول فوق ٪۵۵ محاسبه شده برابر ۱۸/۰ بود. به این دلیل که ٪۲۰ محاسبه شده از ۰/۹۵٪ با ۰/۸۴٪ برابر یک که برابر ۳/۸۴ است کمتر می‌باشد، بنابراین بین نوع نازایی و نتیجه درمانی IUI ارتباطی وجود ندارد ($P > 0.05$).

در بررسی اثر طول مدت نازایی با نتیجه IUI دیده شد که هرچه طول مدت نازایی بیشتر شود نتیجه مثبت IUI کاهش می‌یابد، طوری که در نازایی بیش از ۵ سال آمار مثبت IUI کاهش می‌یابد

حاملگی خارج از رحم و چند قلویی رد شده است. پس احتمالاً آمار ۶۰٪ بدست آمده در مورد حاملگی رسیده به سن قابلیت حیات جنین، باید کمتر از مقدار واقعی باشد و ظاهراً این آمار نیز می‌تواند به ارقام موجود در متون تزدیکتر بوده باشد.

با توجه به میزان حاملگی پس از ۳ تا ۶ دوره IUI، توصیه می‌شود که قبل از انجام IUI در افراد دارای اندیکاسیون، به روشهای گرانقیمت و مشکلی مثل IVF و GIFT نیز پردازیم.

IUI افزایش سقط خودبخودی در بیماران نازاکه تحت درمان با قرار گرفته‌اند تا حدود ۲۶٪ که حدود ۲ برابر افراد معمولی است، گزارش شده است (۵) ولی بر اساس متون کلاسیک این افزایش می‌تواند در اثر مجموعه فاکتورهای سن خانم، روش تحریک تخمک‌گذاری و IUI باشد و تنها مربوط به IUI نیست. در هر حال در مطالعه‌ما مشابه مطالعه کلاسیک Dodson افزایش سقط دیده نشد.

در ۲۲ بیماری که تا ۸ هفتگی تحت کترول بوده‌اند سقط

منابع

- ۱- بررسی نتایج IUI در بخش نازی بیمارستان شریعتی از سال ۱۳۷۲-۷۵. دکتر آذین صابری
- 2- Scibel M, Blackwell RE. Ovulation induction New York Raven Press. 1994.
- 3- Dodson WC, Haney AP. Controlled ovarian hyperstimulation and intrauterine insemination for treatment of infertility. *Fertil Steril* 1991; 55: 457-67.
- 4- Peterson CM, Hatasaka HH, Jones KP, Poulson AMJr, Carell DT, Urry RL. Ovulation induction with gonadotropins and intrauterine insemination compared with in vitro fertilization and no therapy: a prospective, nonrandomized, cohort study and meta-analysis. *Fertil Steril* 1994; 62: 535-44.
- 5- Keye WR, Chang RJ, Rebar RW, Soules MR. Infertility evaluation and treatment. Sanders Co. 1995.
- 6- Rips BA, Minhas BS, Carson SA, Buster JE. Intrauterine insemination in infertile women delivers larger number of sperm to the peritoneal fluid than intracervical insemination. *Fertil Steril* 1994; 61: 398-400.
- 7- Le-lannou-D. 1995 evaluation of the CECOS Federation: Use of different methods of assisted reproductive techniques. *Contracept Fertil Sex* 1996 Sep 24(9): 688-90.
- 8- Oei ML, Surrey ES, McCaleb B, Kerin JF. A prospective, randomized study of pregnancy rates after transuterotubal and intrauterine insemination *Fertil Steril* 1992; 58: 167-71.
- 9- Remohi J, Gastaldi C, Parrizzi P, et al. Intraterine insemination and controlled ovarian hyperstimulation in cycles before GIFT. *Human Reprod* 1989; 4: 918-920.
- 10- Martinez AR, Bernardus RE, Vermeiden JPW, Schoemaker J. Basic questions on intrauterine insemination: an update. *Obstet Gynecol Surv*. 1993; 48: 811-27.
- 11- Corson SL, Batzer FR, Gocial B, Maislin G. Intrauterine insemination and ovulation stimulation as treatment of infertility. *J Reprod Med* 1989; 34: 397-406.
- 12- Horvatta O, Kurunmaki II, Titinen A, et al. Direct intraperitoneal or intrauterine insemination and superovulation in infertility treatment: a randomized study. *Fertil Steril* 1990; 54: 339-341.
- 13- Moretti - Rojas I, Rohas FJ, Leisure M, et al. Intrauterine insemination with washed human spermatozoa dose not induce formation of antisperm antibodies. *Fertil Steril* 1990; 53: 180-182
- 14- Horvath PM, Beck M, Bohrer MK, et al. A prospective study on the lack of development of antisperm antibodies in women undergoing intrauterine insemination. *Am J Obstet Gynecol* 1989; 160: 631-637.
- 15- Campana A, Sakkas D, stalberg A, Blanchi PG, et al. Intrauterine insemination and evaluation of the results according to the woman's age, sperm quality, total sperm count per insemination and life table analysis. *Hum Reprod* 1996; 11(4): 732-6.
- 16- Hurst BS, Tjaden BL, Kimball A, et al. Superovulation with or without intrauterine insemination of the treatment of infertility. *J Reprod Med* 1992; 37: 237-241.
- 17- Behrman SJ, Patton GW. Progres in infertility 4th edition. New York little.